

Н-8°

89 Ш.

С: К: П:

Монаху Иосифу. 2.

Спитров. *Спитров.*


Схи Монаху Израилу,

Спитров.

№ 167
/

2-й экз.

Ист. Худ. и Быт. Музей
Библиотека
МУЗЕЯ
СИСТ. 15
ИНВЕНТ. № 6299



ИЛИ
НАСТАВЛЕНІЯ,

СОЧИНЕНИЯ

Докторомъ,

Ж О Ш О Р Ы Ы

При ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ Университетѣ Меди-
цинскаго Факультета

С т у д е н ш ъ М. Г.

ЧАСТЬ I.



МОСКВА

ВЪ университетской Типографіи,
у Н. Новикова.

1 7 8 9.

ОДОБРЕНІЕ

По приказанію Императорскаго Московскаго Уни-
верситета Господь Кураторовъ я читалъ книгу подъ
заглавіемъ: Лечебникъ Г. Штерка Часть I. и не
нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, дан-
ному жиѣ о разсматриваніи печатаемыхъ въ Уни-
верситетской Типографіи книгъ; поему она и напе-
чатана быть можетъ. — Коллежскій Совѣтникъ,
Красноярскій Профессоръ и Ценсоръ печатаемыхъ въ
Университетской Типографіи книгъ,

АНТОНЪ БАРСОВЪ.



ЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДІЮ

НАДВОРНОМУ СОВѢТНИКУ

МЕДИЦИНЫ ДОКТОРУ,

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ Уни-
верситетѣ Химіи и Практической Меди-
цины Публичному ординарному Профессору,
ИМПЕРАТОРСКОЙ Россійской Академіи и
Вольнаго Россійскаго собранія

Ч Л Е Н У,

МИЛОСТИВОМУ ГОСУДАРЮ

СЕМЕНУ ГЕРАСИМОВИЧУ

ЗЫБЕЛИНУ.

THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

OF THE BROTHERHOOD OF THE ORDER

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Превосходныя качества, какими одаренъ знаменитый сочинитель сея книги, и тѣ самыя, достойныя всякія похвалы, намѣренія, какія онъ имѣлъ при изданіи многихъ изящныхъ своихъ сочиненій, заключающихъ въ себѣ наставленія касающіяся до врачебнаго знанія и искусства, произвели во мнѣ непремѣнное желаніе предложить сію книгу свѣту и на Россійскомъ языкѣ.

Но какъ сія книга есть та самая, которую Вы, Милостивый Государь! изволили мнѣ одобрить, то я, будучи симъ еще болѣе побужденъ, положилъ точно исполнить мое предпріятіе

тіе, и избраеѣ свободныя часы отѣ обыкновенныхѣ моихѣ упражненіи, перевелѣ ее на нашѣ природной языкѣ; окончивши же таковое дѣло, не имѣя нужды много размышлять, кому бы приличнѣе было оную посвятить.

Вы были побужденіемѣ къ продолженію моего труда въ переложеніи сего книги, въ честь Вашего имени ее и посвящаю; но не могу подлинно вѣдать, равна ли исправность перевода моему къ Вамѣ усердію? Почему оставляю оную судить Вашему знанію.

Я много счастливымѣ себя въ томѣ почитаю, что сіе самое доставило мнѣ
бла-

благопристойной случай показать опытъ усерднаго почитанія и уваженія, какое питаю я въ душѣ моей къ Вамъ какъ и къ прочимъ моимъ наставникамъ, ревностнымъ назидателямъ просвѣщенія и благополучія, которое имѣютъ получить юноши порученные общему вашему наставленію.

Милостивый Государь! будучи я довольно удвѣржденъ въ моемъ къ Вамъ почитеніи и благодарности, осмѣливаюсь Васъ увѣрить, что и сія жертва мною Вамъ приносимая, не что иное есть, какъ неложное доказательство тѣхъ

чувствованій, какія обитаютъ въ благодарномъ сердцѣ.

Примите жъ сіе приношеніе воссидѣтельство моей преданности и въ знакъ того почтенія, съ каковымъ жъ Вамъ всегда пребываю.

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Вашъ покорный слуга

МАРКЪ ГОРАХОВСКІЙ.

ПРЕДИСЛОВІЕ

Отъ издашеля.

Хотя случай и позволялъ мнѣ, при изданіи сія книги, говорить о пользѣ, какая изъ оной слѣдуешь; но сіе оставилъ по тому, что бы не подумалъ кто, что я дѣлаю съ нѣмъ же самымъ намѣреніемъ, съ какимъ обыкновенно дѣлають желающіе какую маловажную вещь представить въ величественномъ видѣ, и на сей конецъ употребляющіе опмѣнныя вышесказанныя слова или обоюдныя описанія, которыми не рѣдко заслаивающіе читателя долго объ ней думать, и такимъ своимъ превратнымъ представлениемъ иногда выигрываютъ: предмѣтъ таковой оборотовъ кажется извѣстенъ; однако несправедливосць рано или поздно должна получишь достойную мзду, истина же напропавъ, хотя иногда недослапачнымъ изображеніемъ и обезобразивается; но существенной своей цѣны не теряетъ и ошѣ ищущихъ ея никогда не скрывается.

По чему за излишнее почитаю изъяснять здѣсь пользу сея книги. Развѣ только скажу, что причина побудившая меня, предпринять трудъ въ передоженіи оной на Россійской языкъ, есть всегдашняя моя склонносць быть полезнымъ моему отечеству, и что сія книга споль-

ко же превосходна, сколько превосходны дарованія ея сочинителя, который, своими трудами жертвуя общесивенной пользѣ, выпустилъ въ свѣтъ многія свои сочиненія, кои довольно похваляются опѣ всѣхъ славныхъ въ учености мужей. Что самое явно доказываетъ какую пользу можно почерпнуть и изъ сей книги.

Сей знаменитый мужъ, будучи спрогой наблюдашель природы, не пропускалъ безъ внимательнаго примѣчанія ничего, что только было достойно разсмаириванія, и изъ чего могъ онъ вывести истинныя правила врачевсва.

Онъ при всемъ шомъ, желая учинить сѣе сочиненіе полезнымъ для другихъ, помѣстилъ въ немъ все шю, чю служило къ исполненію похвальнаго его намѣренія, и спарался сколько возможно яснѣе описывать болѣзни, особливо, шѣкоторыя чаще другихъ приключаются всякаго сосиоянія людямъ, кои въ разсужденіи различныхъ причинъ иногда неизбѣжныхъ, бывающъ принуждены въ жизни своей подвергаться многимъ безпокойствамъ, бѣдствіямъ и прочимъ разнымъ болѣзненнымъ приключеніямъ.

И шакъ учинивъ онъ подробное описаніе каждой болѣзни представляеть ея происхожденіе и достовѣрные признаки, по которымъ оная узнаеться; а симъ самимъ предохранаетъ опѣ ошибки могущей легко случиться, еспли не будутъ довольно извѣсны ближайшіе знаки опѣ
лича-

личающіе одну болѣзнь отъ другой (*signum pathognomicum*); потомъ означаетъ припад-
ки знаменующіе напряженіе болѣзни или
уменьшеніе; показываетъ ея продолженіе,
перемѣны и ея переломы (*crysis*) или шѣ-
дни, въ которые каждая болѣзнь либо лег-
чайшею и сноснѣйшею спановится, либо
приходитъ еще въ большую жестокость
и усиливается гораздо противу прежняго,
или перемѣняется въ иную болѣзнь, или
оканчивается смертію; наконецъ совѣ-
туетъ, какъ долженъ больной содержать
себя во время своей болѣзни, и какой поря-
докъ должны наблюдать его прислужники;
потомъ предлагаетъ приличныя лекарства
и опредѣляетъ какимъ образомъ и въ како-
рое время надлежитъ оныя употреблять.

Сверхъ сего, дабы, желающіе слѣдо-
вать его правиламъ, не имѣли трудностей
въ выборѣ лекарствъ, и не могли погрѣ-
шить въ пристойномъ ихъ расположеніи
и предписаніи, почелъ онъ за необходимость
приложить въ концѣ книги *рецепты* или
предписанія (*formulae medicales*), по кото-
рымъ приготавливаются лекарства, и каж-
дой изъ нихъ означилъ особеннымъ числомъ
упомянутымъ при описаніи болѣзни.

Чтожъ касается до *пріемовъ ле-
карствъ* или *мѣры* (*dosis*), въ какой над-
лежитъ давать больнымъ, то онъ въ
такомъ случаѣ примѣнялся вообще къ лѣ-
тамъ возрастныхъ людей, исключивъ толь-
ко тѣ пріемы, въ которыхъ предписыва-
ются

ются лекарствъ для младенцовъ и прочихъ малолѣтнихъ дѣтей, и въ сходствен-
ность ихъ возраста поставилъ оныя въ
меньшихъ пріемахъ. Но искусный Лекаръ,
смотря на время, положеніе мѣста и со-
стояніе больного, при наблюденіи глав-
ныхъ правилъ и наставленіи предписан-
ныхъ въ сей книгѣ, или слѣдуя другимъ
славнымъ Авторамъ, можетъ по своему
разсужденію и по общепользову бо-
лѣзни перемѣнить какъ мѣру лекарствъ,
такъ и порядокъ въ леченіи.

Также призналъ онъ за нужное предло-
жить на одну болѣзнь и на одинъ и тотъ
же ея припадокъ различные рецепты ле-
карствъ одинакаго рода и одинакихъ дѣй-
ствій; дабы такимъ образомъ удобнѣе оп-
равить скуку, какую не рѣдко наносятъ
больнымъ, особливо страдающимъ про-
должительными болѣзнями (*morb. chro-*
nica), долговременное употребленіе одина-
кихъ лекарствъ, къ которымъ они чув-
ствуютъ иногда такое отвращеніе, что
не взирая ни на предлагаемую пользу и
увѣреніе врачей, ни на совѣты своихъ
родственниковъ и друзей, не хотятъ во
вся оныхъ принимать, и симъ самымъ
долгое время не оправляются отъ болѣ-
зни, которыя закончивши въ ихъ шѣлѣ
часто упорствуютъ противу дѣйстви-
тельныхъ лекарствъ.

На послѣдокъ Г. Сочинитель не опу-
ская ничего, что въ состояніи увели-
чить

чишь пользу его книги, раздѣлилъ еще всѣ помѣщенные въ рецептахъ лекарства на нѣкоторые классы, и означилъ при нихъ тѣ самыя числа, которыя посвящены надѣ каждымъ порознь рецептомъ отнесеннымъ къ своему классу. Таковое расположеніе лекарствъ послужитъ тою выгодною, особливо для упражнявшихся уже нѣсколько времени во врачебной наукѣ, что они по проченіи сея книги и узнавъ точное ея содержаніе, могутъ при случаѣ легко и скоро отыскать по числамъ приложеннымъ къ каждому классу тѣ самыя рецепты и тѣ лекарства, какія имъ потребны. Для желающихъ же имѣть нѣкоторое понятіе о общихъ лекарствахъ, сдѣлалъ я еще себя краткое оныхъ описаніе съ изъясненіемъ дѣйствій производимыхъ ими въ человѣческомъ тѣлѣ.

Но многіе, думаю, скажутъ, что и вся сія книга писанна почти для врачей, а не для простаго народа, почему не могутъ ею иные пользоваться, какъ развѣ тѣ, которые довольно уже разумѣютъ сію науку: слѣдовательно не было никакой нужды издавать ее на Россійскомъ языкѣ. Таковое мнѣніе; хотя съ одной стороны и справедливымъ кажется, однако оно должно быть ограничено по тому, что въ ней все понимать можно и показанное производить въ дѣйство, только бы была наблюдаена осторожность и въ оной предписанный порядокъ. При томъ
мно-

многимъ случается жить въ столь отдаленныхъ отъ большихъ городовъ мѣстахъ, гдѣ во время крайнихъ обстоятельствъ своего здоровья съ великою трудностію или и во вся не лѣзя сыскать врача; въ такомъ случаѣ необходимостъ великъ или самимъ искать средствъ для опвращенія своихъ болѣзней, или повѣряя себя людямъ, отъ коихъ не можно взлскивать ни довольнаго знанія ни довольнаго искуства, какое имѣютъ врачи.

Изъ сего явствуетъ, сколько полезно и сколько нужно, еснли не лѣзя имѣть другихъ средствъ, то по крайней мѣрѣ запасись нѣкоторымъ числомъ книгъ, въ копорыхъ обстоятельно описываются какъ самыя болѣзни, такъ и извѣсняющія прошивъ оныхъ средства.

Правда, что многія болѣзни есть столь трудны, копорыя лечитъ самому очень опасно да почши и не возможно, а пребуется неопмѣнно совѣтъ и помощь ученаго и опыннаго лекаря или врача, копорые по своей наукѣ знаютъ какія мѣры и средства употребитъ при леченіи столь злыхъ и опасныхъ болѣзней. Въ таковыхъ трудныхъ обстоятельствахъ не премѣнно надлежитъ положиться на знаніе врача, отъ копорого можно надѣяться гораздо большаго пособія, нежели какого можно ожидать отъ людей не имѣющихъ ни какого свѣдѣнія о сей спасительной наукѣ.

По сей самой причинѣ я долженъ былъ напоминать въ переводѣ во многихъ мѣстахъ

спасу́, чтобы совѣтовались съ врачами либо лскарями о болѣзняхъ, особливо шѣхъ, копорыя имѣюпѣ хотя малѣйшій видѣ сомнѣнїя. Поелику неоспорожностъ или незнанїе не рѣдко наносяпѣ больнымъ великую опасностъ, и часно обращаюпѣ въ смертоносный ядѣ найполезнѣйшїя лекарспва.

Не смотря на всѣ попеченїя, употребленныя мною въ переложенїи сея книги, не могу ласкать себя, чтообѣ всѣ были онымъ довольны, и чтообѣ не нашлась какая неисправностъ по причинѣ трудности выраженїя многихъ словъ еще неизвѣспныхъ на нашемъ языкѣ, копорыя спарался я сколько возможно переводить исправиѣ, примѣняясь въ томъ болѣе къ народному употребленїю и шочному ихъ знаменованїю; но какъ я, въ шѣхъ наипаче мѣспяхъ, копорыя казались къ выраженїю весьма не удобны, сносился съ мнѣшїями мужей признанныхъ публикою довольно знающими науку врачеванїя, коихъ совѣшны и насшавленїя охотно принимаю, а пришомъ имѣю свободной случай видѣпѣ больныхъ спраждущихъ описываемыми здѣсь болѣзнями: то и думаю, что я въ переводѣ не удалился отъ насшоящей истинны. Вкравшїйся же не примѣпно и при лпечатанїи погрѣшности, изъ коихъ нѣкопорыя хотя особенно означены въ обыкновенномъ мѣспѣ, осшавляю до втораго изданїя сея самыя книги, при копоромъ обѣщаюся тщательнѣе разсмотрѣпѣ и исправипѣ.

ВЪ

Въ прочемъ скажу еще и то, что сія книга, прочитанная однажды или хотя и нѣсколько разъ, не составляетъ совершенства; и такъ пусть никто себя не льститъ, чтобъ изъ нея могъ сдѣлаться столько знающимъ и столько искуснымъ въ врачеваніи сколько тѣ, кои въ такой полезной наукѣ много времени шудились.

Однако при всѣхъ моихъ изъясненіяхъ вѣдаю, что существуютъ охотники и мой переводъ толковать въ разные стороны и цѣнишь его по мѣрѣ своего вкуса; но какъ я, могу признаться, въ такомъ случаѣ безпристрастенъ, то и не стану въ помѣ имъ препяшествовать, зная, что охуданъ чужія дѣла, сколько бы оныя полезны и правы ни были, гораздо легче, нежели самому ихъ исполнять.

А еслили я шакowymъ моимъ шрудомъ могу сдѣлать услугу обществу и принесу пользу, особливо юношесству посвятившему себя врачебной наукѣ, показывающей прямой путь къ сохраненію и поправленію здоровья, которое составляешь первѣйшее для человѣка въ жизни его блаженство: то сіе самое подаетъ мнѣ справедливую причину радоваться о успѣхѣ моихъ предприятий и послужитъ пріятнѣйшимъ поощреніемъ стараться впродъ показать обществу лучшіе и совершеннѣйшіе моихъ упражненій плоды.

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

Каждая часть человѣческаго тѣла, какъ внутренняя такъ и вѣшняя имѣетъ свое собственное употребленіе, приличное дѣйствию и пользу.

Если всѣ сїи части суть совершенны и ихъ собственныя дѣятельности спекутъ безпрепятственно, свободно и непрѣменно, то такое тѣло называется здоровымъ,

Кто совершенно здоровъ, тотъ имѣетъ духъ бодрой и къ отправленію своихъ должностей и тѣлесныхъ упражненій всегда есть способенъ и скоръ; всѣ части его тѣла имѣютъ надлежащую теплоту и гибкость, лице его спокойно и по различію климата показываетъ приличной цвѣтъ, глаза его живы и свѣтлы, языкъ влаженъ, красенъ и чистъ; внутреннія чувства порядочны и совершенны, тѣлесныя изпражненія совершаются надлежащимъ образомъ; при томъ дыханіе имѣетъ легкое, свободное и ровное, бѣненіе въ жилахъ свободное, чувствительное, тихое и постоянное, спитъ спокойно и вставши отъ сна чувствуетъ въ своихъ

Часть I.

А

при-

природныхъ силахъ нѣкоторую бодрость и живость.

А какъ только какое нибудь изъ сихъ дѣйствій опсупитъ онъ своего естественнаго порядка, или опправляенся не съ надлежащею скороспїю, живоспїю и поспоянствомъ, или явно ослабѣваетъ и повреждается, то такое состояніе шѣла уже называется болѣзнію.

И такъ никто не будетъ имѣть истиннаго и совершеннаго познанія о болѣзни, и никогда не узнаетъ какое дѣйствіе и сколь далеко оно опсупило онъ своего естественнаго и здраваго состояніи, или которая часть повреждена и какимъ образомъ, ежели прежде не прїобрѣнетъ себѣ довольнаго познанія о состояніи здороваго шѣла. А кто не можетъ точно и справедливо узнать болѣзни, тотъ гораздо меньше знаетъ опразнѣ оную.

Слѣдовательно не благоразумно шѣ поступающъ и жизнь свою подвергающъ великой опасности, которые опваживаясь оную ввѣряшъ побродягамъ.

Чѣмъ больше находишся въ дѣйствїяхъ препятствїей, чѣмъ сильнѣйшее поврежденіе, чѣмъ множащїя и нужнѣйшія для сохраненія жизни повреждающїя дѣйствїя, чѣмъ жесточайшія тому причины и чѣмъ худшіе припадки, шѣмъ болѣзнь жесточе и опаснѣе.

Бо-

Болѣзни скоротечныя или острыя и весьма опасныя не могушъ въ своей жестокости чрезъ долгое время продолжаться; но всегда въ скоромъ времени переменяются, либо въ лучшее состояніе и здоровье, либо въ худшее и въ самую смерть.

И по тому въ сихъ обстоятельствахъ врачъ долженъ пошъ часъ употребляшь лекарства самыя дѣйствительнѣйшія, дабы можно скорѣе поддержать ослабѣвающія естественныя силы; ибо въ иномъ случаѣ медлительность очень вредитъ, легкіяжъ лекарства ничего не пособляютъ, то въ важныхъ обстоятельствахъ лучше согласишься должно на сомнительныя лекарства, нежели оставитъ больного на произволъ судьбы, или мучитъ его слабо дѣйствующими лекарствами.

Еслили такія легкія болѣзни будутъ пользованы крѣпкими лекарствами съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы скорѣе и въ одинъ разъ оныя прогнать или прекратить, то не рѣдко изъ сего происходитъ противное; по тому что чрезъ то природа приводится въ замѣшательство, болѣзни спаниваются жеспочаѣ и продолжительнѣе, или такимъ способомъ большой приходитъ въ полъ худое состояніе, что часно отъ того приключается ему смерть.

Равнымъ образомъ очень много вредитъ и многихъ преждевременно умерщ-
А 2
вляешъ

вляеть то предразсужденіе, по которому нѣкоторые утверждаютъ, что должно всякую болѣзнь шомъ часъ начинать ле- чишь лекарствами рвошными, проносны- ми, пошowymi или кровопусканіями, но прежде должно порядочно разсмотрѣть припадки и причину болѣзни, а по шомъ начинать пользоваться лекарствами сораз- мѣрными шиковымъ припадкамъ и ихъ причинамъ.

Ибо ни для какой болѣзни или болѣз- неннаго припада еще не найдено общаго способа въ леченіи, по которому бы мож- но было поступать и всегда одинаковымъ порядкомъ оной употребляшь, по шому что всякой почти больной имѣеть въ се- бѣ нѣчто особенное и отличное отъ про- чихъ больныхъ, въ разсужденіи природ- ныхъ своего шѣла свойствъ и припадковъ, хотя онъ шакую же болѣзнию сшраждеть.

Болѣзнь производить отъ поврежденія часшей шѣла нашего или жидкихъ или швер- дыхъ; или вмѣстѣ отъ поврежденія обоихъ.

Ибо шѣло наше состоитъ изъ жид- кихъ и швердыхъ часшей.

Жидкія часши содержатся внутри швердыхъ часшей и помощію сихъ движущ- ся и пріуштовляются, однако порядочное движение швердыхъ часшей зависитъ отъ особеннаго состава и расположенія жид- кихъ часшей.

И такъ, дабы въ шѣлѣ нашемъ всѣ дѣйствія и должности были отправляемы надлежащимъ образомъ, то не обходимо нужно, чѣобъ части какъ твердыя такъ и жидкія находились въ хорошемъ расположении и соспояніи. Ибо есѣли въ кошорой нибудь изъ нихъ сдѣлается хотя малѣйшій безпорядокъ, то не ошмѣино должна послѣдовать болѣзнь.

Какъ сосуды въ нашемъ шѣлѣ въ разсужденіи своей крѣпости, величины, вмѣстительности, вида и гибкости суть между собою различны; то изъ сего видно, чѣо и жидкости, кошорымъ надлежитъ проходитьъ чрезъ оныя, должны быть различныхъ свойствъ.

Большіе сосуды ведущіе свое начало отъ сердца и оканчивающіеся въ сердцѣ, содержащіе въ себѣ всѣ жидкости шѣла нашего имѣющія весьма различные виды. И такъ когда съ оными перемѣшавшаяся кровь исходитъ изъ сердца во всѣ прочія части шѣла, то необходимо потребно, чѣобы оныя жидкости, кошорыя должны проходитьъ чрезъ шончайшія сосуды, могли удобно отъ прочихъ отдѣлиться и занимать опредѣленные свои мѣста; ибо естѣли сіе отдѣленіе не будетъ совершаемо по законамъ предписаннымъ природою, то кругообращеніе жидкости приходить въ замѣшательство, отъ чего рождаются различные болѣзни.

Также сіе случается, когда соки тѣла нашего будутъ клейки, густы и вязки.

А естли соки въ тѣлѣ будутъ тонки, водяны и разжиженны, то удобно и въ великомъ количествѣ могутъ разлитися по самымъ мелкимъ сосудамъ и при томъ могутъ смѣшаться съ такими жидкостями, которыя должны только проходитьъ чрезъ большія сосуды; отъ чего часто случающагося истеченія влажностей въ различныя мѣста нашего тѣла, такимъ образомъ бываетъ сильной поитъ, разлипіе воды по всему тѣлу, опухоли, завалы, занвердѣнія, и напоследокъ опасныя воспаления, которыя легко превращающагося въ ангіновъ огонь и мерзвенность какой ни естъ части тѣла или въ гниль, и почти всегда причиняющъ смерть; что многократно случается видѣти въ гнилыхъ и злыхъ лихорадкахъ, въ моровой язвѣ, цынги и въ французскихъ болѣзняхъ.

Для того потребно, чтобы соки наши были хорошаго въ составѣ своемъ расположения и не имѣли бы никакой оспропы, иначе тѣло наше не будетъ въ состояніи получать для себя нужнаго питанія, и такимъ образомъ соки наши по малу переродятся въ другія свойства.

Острые же соки развѣдающъ части нашего тѣла какъ внутренныя такъ и внѣшніе и причиняющъ не рѣдко поврежденія

жденія самыя опаснѣйшія и не излечимыя.

А хотя подобное сему не всегда случается, однако швердыя часпи приводяпся въ безпорядокъ и сильное движеніе, ошѣ чего раждаются весьма жестокія боли, судорги, корчи, воспаленія и лихорадки, различнаго и худаго свойства болѣзни или чрезвычайно упорныя.

Каждая оспропа порознь взятая повреждаетъ наше шѣло собственнымъ своимъ и особеннымъ дѣйствіемъ; такимъ образомъ оспропа воспинная возбуждаетъ особливаго своего рода лихорадку и производитъ оспу, иная оспропа раждаетъ корь, а иная кровопивную сыпь, иная причиняетъ сиптишковую сыпь, а иная сыпь похожую на пишено или тилые пашна, яная приключаетъ чесотку, а иная цынготинную болѣзнь и иная французскую и проч. Изъ сего явствуетъ, что болѣзни раждающіяся ошѣ жидкостней нашихъ суть безчисленны.

Но не менѣе находится болѣзней, которые и ошѣ швердыхъ часпей нашего шѣла производятъ.

Твердыя часпи суть орудія, помощію которыхъ производяпся всѣ движенія нашего шѣла и всѣ дѣйствія.

Слѣдовательно естѣли сѣи орудія будутъ очень жески или очень мягки, велики или малы тѣсны или пространны, чрезмѣрно раздражительны или во все нечувствительны, не гибки, худо составлены или совсѣмъ повреждены: то въ то время и дѣйствія тѣла нашего могутъ имѣть прѣпятствіе, замедленіе и поврежденіе, отъ чего не рѣдко слѣдуютъ многія болѣзни.

Болѣзни частей органическихъ и необходимыхъ для жизни часно бываютъ неизлѣдимы и по большей части гораздо съ большимъ трудомъ вылечиваются нежели болѣзни происшедшія отъ поврежденія жидкостей.

Дабы точно узнать великость и опасность всякой болѣзни, то надлежитъ порядочно разсмотрѣть и изслѣдовать всѣ признаки, сравнивая случающіеся припадки съ припадками и дѣйствіями здороваго состоянія; а по учиненіи такого сравненія можно будетъ судить о болѣзни и узнать сколь далеко отступила болѣзнь отъ здороваго состоянія, какое находится поврежденіе и сколь велика слѣдуетъ опасность?

Познаніе будущихъ слѣдствій въ острыхъ и скоротечныхъ болѣзняхъ по большей части бываетъ сомнительно и неизвѣстно, по тому что въ сихъ болѣзняхъ

ча.

часто случаются внезапные и скоропостижные перемены, чрезъ которые больные иногда выздоравливаютъ, о выздоровленіи коихъ многие опсчаевались по причинѣ весьма жестокихъ и опасныхъ припадковъ. Напротивъ иныя нечаянно умираютъ, о которыхъ выздоровленіи не было никакого сомнѣнія.

По чему въ такихъ болѣзняхъ очень осторожно надлежитъ поступать въ разсужденіи предсказанія; ибо не надобно наоное очень полагаться, также и безъ довольной причины во все опсчаеваться не должно.

Если находятся многіе припадки угрожающіе опасностію, то во первыхъ должно стараться вспомошествовать тому припадку, который болѣе вредитъ жизненнымъ дѣйствіямъ, слѣдовательно и соединенъ всегда съ великою опасностію.

Если же въ какой нибудь болѣзни еще не извѣстно свойство какъ причины такъ и болѣзни, то необходимо должно припадки, которые случаются въ сихъ обстоятельствѣхъ, сравнивать съ припадками другихъ извѣстныхъ болѣзней, и надлежитъ пользоваться такимъ же способомъ, какой приписывается въ подобныхъ болѣзняхъ.

Всякая та физическая вещь называется причиною болѣзни, которая приключаетъ неестественную перемену или по-

врежденіе либо въ жидкихъ либо въ твердыхъ частяхъ нашего тѣла; такъ что, когда чрезъ то дѣйствіе оныхъ частей повреждается, приходятъ въ беспорядокъ и не могутъ быть свободно продолжаемы.

Чѣмъ силнѣе и вредительнѣе бываетъ такая причина, тѣмъ жесточе и хуже будутъ припадки оной болѣзни.

Между прочимъ не рѣдко самыя тяжелыя и неизлечимыя болѣзни рождаются отъ легчайшихъ причинъ, особливо есѣли такія причины въ началѣ, когда ихъ еще было можно легко прекратить, не были точно и вѣрно разсмотрѣны, или починаемы будучи за маловажныя, запущены и оставлены безъ всякаго вспоможенія.

Воздухъ, который для сохраненія жизни всякому живому необходимо нуженъ, чѣмъ будетъ чище и свѣжѣе, тѣмъ болѣе способствуеѣтъ и къ соблюденію здоровья.

Внезапныя перемѣны воздуха чрезвычайно вредны, и по тому есѣли послѣ долговременной и продолжительной теплоты вдругъ наступитъ стужа особливо сопряженная съ сыростію, то рождаются тяжелыя и опасныя болѣзни; какова есѣли простуда, жаба въ горлѣ, воспаленіе, кашель, насморкъ, колотье въ бокахъ и въ легкомъ, ломъ въ соснавахъ, горячки и проч: есѣли послѣ великой спужи вдругъ

вдругъ сдѣлается теплота, то приключается ломъ и боль въ головѣ, круженіе, поспрѣль, кровотеченіе изъ горшани и проч. Мокрая теплота ослабляетъ твердыя части, разжижаетъ соки и располагаетъ ихъ къ гнилости, отъ чего часто рождаются гнилыя злыя лихорадки, цынготная болѣзнь и проч.

Люди живущіе на мѣстахъ мокрыхъ и болотистыхъ по большей части спржнуты трудными лихорадками, цынгою, водяною болѣзнію и проч.

Воздухъ запертый чрезъ долгое время, особливо въ такомъ мѣстѣ, куда вѣперъ ни мало не проходитъ, часто скоропоспжнно умерщвляетъ; отъ чего не рѣдко случается намъ видѣть печальныя произшествія, когда не осторожно открываются склепы, кладбища, глубокія ямы, винныя погреба, колодцы и проч.

Также весьма вредитъ и потъ воздухъ въ погребахъ находящійся, въ которыхъ много спожитъ молодого пива, которое еще киснетъ и не очистилось, равнобрно дымъ сѣрной и изхожденіе испареній изъ подземныхъ мѣстъ.

Всякому извѣстно, что здоровье безъ пищи и пипья не можетъ долго продолжаться; ибо помощію сихъ все то, что чрезъ непрестанныя дѣйствія тѣла и ежеминутныя отдѣленія изъ жидкостей
теря-

теряется, должно въ шѣлѣ нашемъ быть возобновляемо.

Слѣдовательно требуется, чтобы каждой день для не обходимаго питанія шѣла были употребляемы пища и пишье въ довольномъ количествѣ.

А какъ скоро обременится желудокъ чрезмѣрною пищею, хотя самую здоровѣйшею для человѣка и къ варенію способнѣйшею, то вареніе въ желудкѣ повреждается, отъ чего рождаются различныя болѣзни, какъ то отъращеніе отъ пищи, рвота, тошота, ломъ въ головѣ, круженіе и проч.

Суровая пища и къ варенію мало способная можетъ полезно быть для крѣпкихъ людей или упражняющихся въ великихъ шѣлодвиженіяхъ и въ трудахъ; а для шѣхъ, которые по слабости своего шѣла не имѣютъ довольнаго движенія, и коихъ званіе принуждаетъ сидѣть на одномъ мѣстѣ, есть всегда вредительна.

Слѣдовательно смотря на шѣлесныя силы, упражненіе и сложеніе должно употреблять приличную пищу и въ пристойномъ количествѣ.

Людямъ сложенія холоднаго, мокротнаго и избылующимъ густыми соками прилична пища горячительная, приправленная пряными и душистыми кореньями
или

или зелїями; но оная же вредна для людей горячаго сложенїя и многокровныхъ.

Однако въ разсужденїи количества и качества пици не всегда должно препяшествованїе привычкѣ людей здоровыхъ и крѣпкихъ, ибо въ семъ случаѣ всякая пища и питье пользуется, которая по долговременному навику и съ умѣренностію и при шомъ какъ безвредно такъ и охотно, или съ аппетитомъ употребляется.

Холодная чистая текучая вода служивъ общимъ и здоровѣйшимъ питьемъ, однако есѣли она будетъ очень студеная, и напьется кто се съ великою жадностію очень много во время разгоряченнаго шѣла, то многократно причиняетъ колотье въ груди и въ легкомъ, воспаление желудка, или водяную болѣзнь либо въ груди либо въ животѣ.

Вода стоячая, болопистая, гнилая причиняетъ весьма опасныя, перемѣжающїяся и гнилыя лихорадки; и такъ естѣли заставитъ нужда пить такую нечистую воду, то прежде употребленїя, должно ее опварить, и во время варенїя положить въ нее корня называемаго ирѣ (*salamus aromaticus*) или можжевеловыхъ ягодъ, или уже въ опваренную примѣшавъ уксусу.

Вода смѣшенная съ двенадцатою частию простаго горячаго вина очень полезна
въ

въ усталости или изнеможеніи послѣ великихъ и долговременныхъ движеніи шѣла, ибо ослабѣвшіе кровеносные сосуды и силы отъ великаго попу, посредствомъ сей воды получаютъ пріятное укрѣпленіе, при томъ такая вода не такъ скоро выходитъ изъ шѣла мочою и потомъ.

Хмѣльные или крѣпкіе напитки людямъ холоднаго и мокростнаго сложенія, или кои ихъ безвредно сносятъ, могутъ быть полезны, а какъ только оныя будутъ не умѣренно употребляемы, то шѣло отъ нихъ приходишь въ слабость и раждаются прясенія во всемъ шѣлѣ, сильныя запердѣнія и разнаго рода смершельныя водяныя болѣзни.

Излишній покой или праздность всегда вредитъ, ибо препяисивуетъ варенію ежедневно употребляемой пищи и пинья, кругообращенію соковъ, нужному ихъ смѣшенію, приготовленію и опдѣленію разныхъ жидкостей, дѣлаетъ швердыя части слабыми; отъ чего раждаются различныя опухоли, неповоротливостъ въ членахъ, слабость внутреннихъ чувствъ и сонливостъ.

И такъ каждой долженъ имѣть движеніе соразмѣрное своимъ шѣлеснымъ силамъ, однако такое движеніе не должно быть очень продолжительно и до шѣхъ поръ, пока шѣло придетъ въ усталость,
чио-

чтобы чрезмѣрнымъ движеніемъ не произвѣсти очень сильнаго поту, кошорой можешъ привести тѣло въ великое разслабленіе.

Великое и долгоевременное упражненіе тѣла вредитъ больше людямъ молодымъ, нежели взрослыхъ лѣтъ, особливо естли послѣдніе привыкли къ понесенію великихъ трудовъ.

Умѣренныя и не очень долго продолжаемыя, при томъ съ частымъ отдыхомъ, упражненія умножаютъ какъ тѣлесныя такъ и душевныя силы, равно какъ въ молодомъ такъ и въ возрастномъ челоѣкъ, а неумѣренныя и излишнія приводятъ обоимъ въ слабость; ибо всякая излишность вредна и не можешъ долгое время продолжаться.

Слабые и нездоровые люди или имѣющіе худой составъ своего тѣла гораздо чаще и удобнѣе подвергаются болѣзнямъ, нежели крѣпкіе, здоровые и снабжденные хорошимъ расположеніемъ тѣла, ибо весьма часто самая легчайшая причина возбуждаетъ въ слабомъ тѣлѣ великіе безпорядки, отъ кошорой причины здоровое и крѣпкое тѣло не чувствуетъ въ себѣ ни малѣйшаго поврежденія.

Не свойственно природѣ расположенная какая нибудь часть, кошорая естественна къ совершенному здоровью, сама по себѣ уже естъ болѣзнь, и часто
бы-

бываштъ неизлечимою и неизбежною причиною смерти.

Однако и тѣ, которые слабы, безпрестанно не здоровы и имѣющъ худое расположеніе въ своемъ тѣлѣ, могутъ жить до глубокой старости, еслили только будучи осторожно располагать свои упражненія душевныя и тѣлесныя, и вести порядокъ въ своей жизни согласно и соразмѣрно своимъ силамъ и своему тѣлу, такъже остерегаться отъ всего того, отъ чего только можетъ приключиться вредъ, и рачительно наблюдать, все то, что служишь имъ въ пользу.

При чемъ изъ опытовъ извѣстно, что слабые и немощные не столько удобно заражаются отъ повѣтрія происходящими и другими опасными болѣзнями, какъ здоровые и крѣпкіе люди, особливо многокровные.

Природа снабдила человѣческое тѣло многими проходами, чрезъ которые могла бы она выгонять излишніе соки и бесполезную или вредительную матерію, то есть:

Чрезъ мочу, испраженія низомъ, испареніе, а у многокровныхъ чрезъ кровотеченіе изъ носу или печеніе почечуя, чрезъ кровоочищенія мѣсячныя въ женскомъ полѣ.

Есть-

Естьли сїи естественныя и обыкновеныя тѣлесныя испражненія задержатся въ тѣлѣ или не порядочно сиванутъ исходить, то рождаются различныя и нерѣдко весьма опасныя болѣзни.

Взрослые и всеѣмъ тѣломъ здоровые люди обыкновенно одѣтъ разъ въ сутки ходятъ на низъ, однако многіе изъ сихъ находящіяся, которые также пользующіяся совершеннымъ здоровьемъ, хотя черезъ двой сутки или и черезъ шрое имѣютъ сие испражненіе.

Количество мочи, которое выпускаютъ здоровые люди всегда почти бываетъ соразмѣрно количеству принятаго пища. Моча имѣющая цвѣтъ желтой или соломенной почтиается за природную; однако различные виды пищи, пища, употребляемыхъ лекарствъ, годовыхъ временъ, упражненій душевныхъ и тѣлесныхъ, весьма часто бывающъ причиною, что моча здороваго человека въ разсужденіи количества, цвѣта и запаха много перемѣняется.

Изъ всей поверхности тѣла, когда оно здорово, должно безпрестанно исходить нечувствительное испареніе; но и сие, въ разсужденіи перемѣны годовыхъ временъ и погоды, бываетъ не одинаково, также оно перемѣняется въ разсужденіи

сложенія различныхъ людей и различнаго ихъ рода жизни.

Здоровые люди по большей части шестъ или семь часовъ спокойно спятъ, копорые, когда вспанутъ отъ сна, чувствуютъ въ своихъ силахъ бодрость и оживленіе и находятъ себя способнѣйшими и охотнѣйшими къ ошправленію своихъ должностей и обыкновенныхъ трудовъ, а излишній сонъ столько же вреденъ какъ и не умѣренное бдѣніе.

Во всякомъ больномъ должно во первыхъ разсмотрѣть сложеніе или составленіе тѣла, по томъ его силы, глаза, языкъ, дыханіе, бѣненіе жилъ; по томъ надлежитъ изслѣдовать, какое дѣйствіе въ его тѣлѣ повреждено или совсѣмъ испорчено, и что сего причину; напоследокъ смотрѣть, всѣ ли у него тѣлесныя изпраженія порядочно ошправляются или много отступающъ отъ своего естественнаго сосоянія, или нѣтъ?

Естли съ начала болѣзни больной много похудѣлъ или перемѣнился въ лицѣ, при томъ буденъ очень слабъ, то худой знакъ.

Напротивъ въ великой опасности находится больной естли онъ непрестанно брѣдишь, очень шоскуетъ, не лежишь спокойно

койно въ постели и часто переворачивается то на спинѣ то на другой бокъ, ноги корчитъ, стремительно силится соскочить съ постели, безпрестанно оцѣпывается и руками по воздуху водить какъ бы мухъ ловить; или естли безпрерывно жалуется, что онъ чувствуетъ въ себѣ безпреспанной жаръ и жженіе; естли языкъ сухъ, нечислѣ и почернѣлъ; естли дыханіе у него тяжелое, неровное и часто дышетъ; естли выпускаетъ мало мочи и то очень красную или во все водяную; на послѣдокъ когда больной совсѣмъ позабывается и въ такомъ забытіи испускаетъ низомъ.

Въ тѣлахъ людей возрастныхъ и здоровыхъ обыкновенно щипается шестьдесятъ и семьдесятъ удареній или биеній (pulsus) въ жилахъ въ одну минуту, а по принятіи пищи, также и къ вечеру жилы всегда почти бьются скорѣе; у малыхъ дѣтей биеніе въ жилахъ бываетъ всегда скорѣйшее, нежели у возрастныхъ.

И такъ чѣмъ болѣе биеніе въ жилахъ отступаетъ отъ своей надлежащей скорости и ровности: тѣмъ болѣе не походитъ на природное, и тѣмъ самимъ показываетъ большую опасность.

Однако многіе напротивъ сего находятъ, кошорые наслаждаясь совершеннымъ

нымъ здоровьемъ, но имѣютъ бѣненіе въ жилахъ по своему воиспву скорѣйшее противъ обыкновеннаго, неровное и протспанавливающееся; изъ сего слѣдуетъ что у такихъ, еспли бѣненіе въ жилахъ ощущается ровное и подобное обыкновенному или всѣмъ свойственному, то можно справедливо заключить, что они тогда больны.

Дабы вѣрнѣе узнать, сколь далеко бѣненіе въ жилахъ отступаетъ отъ своего естественнаго состоянія, то еспль, находится ли оно слишкомъ скоро, крѣпко, слабо, возвышенно, полно, туго, швердо, сжато, медленно, не ровно и съ остановкою? по сему удобнѣе можно научиться изъ опытовъ, нежели изъ описаній.

ГЛАВА I

О лихорадкѣ.

Весьма многія болѣзни находятся, которыя либо соединены съ лихорадкою, либо сами по себѣ суть лихорадочныя.

Если бѣненіе въ жилахъ въ разсужденіи времени ощущается скорѣйшее, нежели какъ обыкновенно бываеиъ въ натуральномъ состояніи, и сверхъ сего примѣчаются въ нѣлѣ нѣкоторыя перемѣны и безпокойства, или иные необыкновенныя припадки; то сіе состояніе называется *лихорадкою*.

Нѣкоторыя лихорадки или лучше сказать лихорадочныя волнованія крови произходяиъ оиъ легкихъ причинъ, и не будучи сопряжены ни съ какою опасностію, не болѣе одного или двухъ дней продолжаются; по чему шакія лихорадки называются *однодневными*, понеже въ скоромъ времени покидаюиъ и болѣе не приходяиъ.

Сіи лихорадки чаще нападаюиъ на людей слабѣлыхъ и на дѣтей, и не рѣдко окончиваюиъ легкимъ и облегчающимъ потомъ или мутною и густою мочою; однако иногда въ концѣ сихъ лихорадокъ больше испущаюиъ мочу подобную натуральной, которая въ стеклянномъ сосудѣ

оказываеиъ на днѣ осадку, состоящую изъ многихъ красныхъ пещинокъ.

Часто такія лихорадки приключаются отъ легчайшей простуды или разгоряченія шѣла, отъ излишняго опягощенія желудка или отъ сильной душевной страсти и проч.

Находясь какъ взрослые такъ и престарѣлые люди, которые всякую весну и осень чрезъ одинъ или два дни жалуются на расслабленіе членовъ съ усипалоспію, на несносную жажду, не имѣютъ позова на ѣду, безпокойно спятъ, ощущаютъ въ шѣлѣ часпной ознобъ и попеременно за онымъ жаръ; а какъ только начнутъ много потѣпъ, то чувспвуютъ въ себѣ облегченіе и подъ конецъ испущаютъ много мутной и густой мочи, напослѣдокъ приходяиъ въ силы и совершенно выздоравливаютъ.

Такіе люди къ симъ лихорадочнымъ волнованіямъ такъ привыкли, что безпресипанно хвораютъ, еспли оныя не случаются въ обыкновенное время; они по справедливости ощущаюиъ въ самихъ себѣ, что чрезъ сіи дѣйствія шѣла ихъ очищаются и получаютъ новыя силы споспбспвующія къ удобнѣйшему перенесенію разныхъ перемѣнъ бываемыхъ зимою и лѣпомъ.

Сіи легкія лихорадки всегда почти бываюиъ спасительны и полезны, когда онѣ не произходяиъ ни отъ какой наружной

жной причины, при томъ имѣютъ и не большіе припадки; то по сей причинѣ, не употребляя никакихъ лекарствъ или очень мало, надлежитъ все дѣло поручить природѣ, однако при семъ требуется, чтобы больной былъ спокоенъ и содержалъ себя въ умѣренной и одинакой теплотѣ, къ тому же воздерживался бы отъ разгорячающихъ напитковъ и пищи, которая очень питательна, а употреблялъ бы мясную жиденькую похлебку и питье подѣ №. 13. означенное.

Еслилижъ по опущеніи лихорадки находишься въ рошу еще не чисто, больной жалуется на тяжесть въ желудкѣ и не имѣетъ никакого позова на ѣду; то надлежитъ дать ему легкое слабительное лекарство подѣ №. 38. или вмѣсто сего велѣть больному чрезъ одинъ или два дни по утрамъ и по вечерамъ принимать порошокъ подѣ №. 3. предписанной.

Но иногда полнокрое приключаетъ одностороннюю лихорадку, особливо тѣмъ, у которыхъ обыкновенное кровотеченіе изъ носу, или шекучій почечуй не порядочно и долго не приходили, въ такомъ случаѣ должно отворить кровь.

Напротивъ горячки и оспры или жестокія лихорадки всегда суть опасны и не рѣдко смертельны, которыя рѣдко одною натурою излечиваются, но всегда почти требуютъ пособія искуснаго врача.

Однако легкія и простыя острыя горячки весьма часто проходятъ безъ великой опасности, естли только они произошли отъ легчайшихъ причинъ и не имѣютъ жестокихъ припадковъ; припомъ находясь въ шѣлахъ, которыя въ прочемъ здоровы и хорошо расположены.

Осипрая безпрерывная лихорадка такъ называется, которая чрезъ многие дни безъ всякой перемѣжки продолжается.

Чѣмъ болѣе въ осипрой безпрерывной лихорадкѣ припадки умножаются, и спазмовишя худшими, или одинаково жестокими пребывающъ; шѣмъ сомнительнѣе окончаніе болѣзни, и думать тогда можно, что болѣзненная маперія еще не переработанна.

А какъ скоро начнутъ нѣкоторыя припадки униматься и болѣзнь явно уменьшаться, то есть, когда языкъ, которой прежде былъ сухой и жесткой, спазмовишя мокрымъ, біеніе въ жилахъ оказывается не такъ твердое, жаръ дѣлается умѣреннѣе съ легкимъ испареніемъ, естли моча не столь красна и не огненнаго цвѣту, скоро опсѣдается и проч. тогда болѣзнь утихаетъ, перелаывается, маперія причиняющая болѣзнь начинаетъ вариться и можно надѣяться, что горячка щастливо окончится. Изъ сего слѣдуетъ, что чѣмъ скорѣе таковыя хорошіе знаки показываются, чѣмъ болѣе оныя увеличиваются и умножаются, и такъ продолжаются, шѣмъ скорѣе болѣзнь прекратится.

А естли въ продолженіи болѣзни припадки спановятся часъ онѣ часу жесточе или еще къ нимъ присоединятся опаснѣйшіе и нѣтъ никакихъ признаковъ вренія или послабленія въ болѣзни, то больной въ великой опасности находится, и мало надежды оспается, чтобъ онѣ скоро выздоровѣлъ.

Еслилижъ усмотрѣно будетъ, что припадки еще болѣе усиливаются или въ одинакомъ состояніи пребываютъ, и болѣзнь упорствуешь, то всемѣрно должно спарашься унять жестокость и силу болѣзни, облегчить припадки и возбудить ослабѣвшія естественныя силы. Въ семъ случаѣ естли пошребно будетъ сдѣлать кровопущеніе, употребить рвотное или слабительное лекарство, то оное пошѣ часъ и заблаговременно надлежитъ учинить, когда болѣзнь еще не совсѣмъ глубоко вкоренилась.

Еслилижъ припадки уже утихаютъ и находящіяся признаки, изъ которыхъ можно видѣть, что болѣзнь уже уменьшается и показывается изпращеніе какихъ нибудь жидкостей, то осторожно надобно поступать; дабы вышепомянутыми сильными лекарствами не помѣшать напурѣ въ сядѣйствіи, въ которомъ наипаче ей пособлять и спосѣшествованіе надобно.

Когда такія лихорадки сунъ порядочны и напурѣ никакого помѣшательства не сдѣлано ни погрѣшностію каковою ли-

бо больного или его прислужниковъ, ни непорядочнымъ леченіемъ, ниже отъ чрезвычайно жестокихъ припадковъ, то по большей части тогда въ извѣстные и опредѣленные дни незапныя случаются перемѣны, при которыхъ болѣзнь явно либо поправляется, либо хуже становится.

Время, въ которое сїи перемѣны бываютъ, называется переломными днями; ибо посредствомъ сихъ перемѣнъ можно иногда опредѣлить и предсказать, выздоровѣетъ ли больной или умретъ.

Обыкновеннѣйшіе дни, въ которые случаются такіа перемѣны, починаются четвертый, седьмой, девятой, одиннадцатой, четырнадцатой, семнадцатой, двадцать первой день и проч.

И по сей причинѣ сїи дни называются днями переломными (*dies critici*) или днями, въ которые можно судить либо о выздоровленіи, либо о смерти больного.

При началіи сихъ перемѣнъ больной всегда почти чувствуетъ тоску и безпокойство, лихорадка умножается и всѣ припадки кажутся бытъ жестокае. Но еслили кто будетъ старательно примѣчать изъ прежде бывшихъ знаковъ, что такое безпокойство предзнаменуетъ наступленіе перелома дня, слѣдовательно дѣйствіе природы, чрезъ которое она силится преодолѣть таковую болѣзнь и се-
бя

бя отъ оной освободить, то конечно никакой пустой боязни имѣть не будетъ.

И такъ естли припадки не очень жестоки, ни очень опасны или непродолжительны и соразмѣрны болѣзни, то тогда въ леченіи ничего не должно перемѣнять; но продолжать шѣ же самыя лекарства съ наблюденіемъ только, не открываешся ли еще что важнѣйшее, а прочее все надлежитъ поручить природѣ.

Естлижъ усмотрѣно будетъ, что сіи припадки становятся хуже, или не перестаютъ продолжаться, и больной подвергается явной опасности, тогда оные должно по разсмотрѣнію привести въ умѣренность шѣмъ же способомъ и тѣмъ же лекарствами, какія въ началѣ болѣзни были употреблены, не смотря ни мало на бывшія между тѣмъ обстоятельства.

Послѣ чего вскорѣ откроются признаки, по которымъ извѣстно будетъ, коимъ путемъ природа намѣреваетъ выгнать матерію болѣзни причиняющую.

А узнавъ подлинно сію дорогу, надлежитъ избирать и приличной тому способъ леченія.

Сіи изъ тѣла болѣзненной матеріи изпражненія всегда почти бывають мочою, низомъ, потомъ, рвою, кровопеченіемъ изъ носу, печеніемъ почечуя или печеніемъ мѣсячныхъ кровей въ женскомъ полѣ

Рѣдко природа для сего избираетъ одну дорогу, но по большей части чрезъ многія вмѣсѣ дѣисвуешъ.

Оныя испраженія естѣли умѣренны, при томъ съ облегченіемъ болѣзни и уменьшеніемъ припадковъ, то не требуется много лекарствъ. А естѣли будущъ очень сильны и приводящъ больного въ слабость, то надлежитъ ихъ удерживать приспособными лекарствами; естѣлижъ напрошивъ они не досытачны, то должно ихъ по разсмотрѣнію умножить.

Однако не столько должно смотрѣть на количество сихъ испраженій сколько на перемѣну и облегченіе болѣзни оныхъ того происходяща, ибо очень часто не многое и сдѣ примѣтное испраженіе матери приноситъ великое облегченіе, а иногда и прошивъ и изобильное испраженіе мало, или и никакой пользы не дѣлаешъ.

Не рѣдко сѣ переломныя испраженія случаются не въ свой обыкновенной, но въ иной день. Тогда надлежитъ только наблюдать, были ли признаки варенія предъ сими испраженіями, и имѣетъ ли больной оныхъ того облегченіе? Есть ли что нибудь такое примѣчается, то сѣ перемѣны полезны, въ определенной ли свой день они случились или нѣтъ; а естѣли оныхъ того болѣзнь сдѣлается худшею, то испраженія такія вредны и весьма опасны.

Ча-

Часто болѣзненная матерія выгоняется изъ тѣла не чрезъ обыкновенныя естественныя дороги, но незапно переходя въ другую часнь тѣла.

Естьли такая матерія перейдетъ въ ту часнь тѣла, копорая весьма нужна для жизни, на пр. въ голову, легкое и пр. то не рѣдко ошъ того жизнь подвергается великой опасности или и самой скоротечной смерти.

А естьли сія болѣзненная матерія засидѣвъ въ часняхъ не столько важныхъ и особливо въ наружныхъ на пр. въ желѣзахъ околоушныхъ, въ пахахъ, въ рукахъ, ногахъ, тогда легко можно излечить, хотя и такія переходенія той матеріи могутъ причинить долговременныя и жестокия болѣзни.

Къ наружнымъ симъ переходеніямъ могутъ ошнесены бытъ всѣ почти сыпи.

Естьли сіи сыпи служатъ больному облегченіемъ, уменьшаютъ и унимаютъ припадки, то оныя можно почесть сколько же спасительными, какъ и прочія порядочныя и совершенныя переломныя изъ тѣла изпраженія.

Естьлиже такія сыпи не дѣлаютъ никакого облегченія; но болѣзнь еще болѣе увеличиваютъ, то оныя должно почитать за вредныя и опасныя припадки.

Однако въ острыхъ непрерывныхъ лихорадкахъ или въ горячкахъ очень часто видѣшь случается, что безъ всякаго примѣш-

мѣтнаго испражненія и безъ всякаго переходенія болѣзненной матеріи, больной въ скоромъ времени и щасливо выздоравливаетъ.

Сіе по большей части случается, когда способъ леченія употребленъ былъ надлежащимъ порядкомъ, матерія болѣзни не была острая или ѣдкая, припадки легкіе, силы въ тѣлѣ довольные, и болѣзненная матерія шакъ переработана, что удобно въ природныя тѣлу нашему соки могла превратиться и по тому не въ состояніи была произвести въ тѣлѣ никакихъ важныхъ слѣдствій, то въ такихъ случаяхъ болѣзнь не рѣдко нечувствительнымъ образомъ чрезъ испареніе благополучно оканчивается.

ГЛАВА II.

О острыхъ горячкахъ или огневицахъ.

Острая горячка всегда начинается съ ознобомъ и нѣкопорымъ подираніемъ по кожѣ, а спустя не много времени бросаетъ больного въ жаръ. Иногда одержимые сею болѣзнію прежде, нежели начнутъ зябнуть и ощущать дрожь въ тѣлѣ, чувствуютъ съ начала жаръ, также жалуются на ломъ въ головѣ, разслабленіе, сжиманіе и жаръ въ своемъ тѣлѣ; всегда почти брѣдятъ, кожа на тѣлѣ становится
суха,

суха, горяча, языкъ сухъ же или бѣлой, сильная жажда, прерывистой и неспокойной сонъ, шрудное и скорое дыханіе, моча красная или огненнаго цвѣту, бѣеніе жилъ скорое, полное, шугое, твердое, иногда не ровное и какъ бы ошанавливающееся. Чѣмъ болѣе будешъ такихъ припадковъ и чѣмъ они жесшоче, тѣмъ болѣзнь опаснѣе.

Сии лихорадки обыкновенно рождаются послѣ частыхъ и скоропостижныхъ воздуха переменъ, послѣ сильной и продолжительной простуды, послѣ разгоряченія или усшалости, послѣ нешорядковъ учиненныхъ въ пищу и пищу, послѣ жестокихъ душевныхъ страстей, отъ многокровоія, отъ сгустившейся горячей крови, отъ неизвѣстной оспропы, копорая кровь разгорячаешъ, и приводитъ въ волнованіе, раздражаешъ твердыя частя, усугубляешъ бѣеніе жилъ и ускоряешъ обращеніе соковъ.

Разсмошрѣвъ надлѣжащимъ образомъ причину болѣзни и узнавъ подлинно все находящіяся припадки, немедленно надлежитъ приступать къ леченію.

Легкія и простыя горячки, часто въ четвершой, но чаще въ седьмой день проходяшъ, и болѣе одиннашати дней ниюгда не продолжаются.

Сихъ горячихъ лихорадокъ припадки суть шихи и не многіе, больные только ощущающъ легкую въ головѣ боль, имѣющъ

ютъ небольшую жажду, слегка зябнутъ и горятъ, языкъ у нихъ бѣлой, глаза довольно ясны, дыханіе мало различествующее отъ натуральнаго, мочу красноватую, позывъ на ѣду хоша малой, однако не жалуясь ни на отвращеніе отъ пищи, ни на тяжесть, также не имѣютъ надуванія въ животѣ ни запору въ кишкахъ.

На третій или на четвертый день моча у нихъ дѣлается мутна и вскорѣ опускаетъ на низъ много склизкой осадки; и если въ концѣ четвертаго дня послѣдуетъ поносъ, отъ котораго больной чувствуетъ въ себѣ облегченіе, или сдѣлается легкой поносъ, или поидетъ изъ носу кровь, то по большей части тѣмъ самимъ и кончится сія лихорадка.

Еслижъ въ оной день не случится никакихъ шаговъ изъ тѣла испражнений, однакожъ между тѣмъ лихорадка начнетъ умаляться, тогда болѣзнь чрезъ вышеупомянутыя же переломныя испраженія, но въ седьмой день уже прекращается.

А если лихорадка на четвертой день не отпускаетъ, но продолжается до седьмаго дня, то болѣзнь въ одинацатой день оканчивается.

Въ сихъ легкихъ случаяхъ не многія потребны лекарства, а довольно, если больной трижды или четырежды приметъ порошокъ подъ No. 1. или подъ No. 2. означенный и будетъ чаще пить чай подъ No. 13.

пред-

предписанный. Сѣи и подобныя лекарства надлежишь продолжать до окончанія болѣзни.

Но когда больной сипраждетъ кашлемъ и сверхъ сего снѣсеніемъ въ груди, шо весьма пользуетъ для него лекарство подъ N. 8. предписанное, ибо не только споспѣшествуешь къ удобнѣйшему ошдѣленію и выхаркиванію мокротъ изъ груди; но и болѣзнь во вся прогоняетъ.

Слѣдовапельно въ сихъ простыхъ горячкахъ мало требуется лекарствъ; а когда оныя соединены бывають съ многими и сильными припадками, шо болѣе требуется смотрѣнія, трудовъ и знанія.

И такъ еснѣли съ самаго начала ощущается бѣненіе въ жилахъ или пульсъ жеской и полной съ великимъ жаромъ, шо больному топль часъ надлежишь ошворить кровь, смотря по обстоятельству, пускашь оную должно раза три, чешыре и болѣе.

Однако нужно, чпобы между всякимъ кровопусканіемъ проходило нѣсколько часовъ, дабы, поступая такимъ образомъ, можно было удобнѣе узнать, уменьшается ли сила болѣзни опъ учиненнаго кровопусканія или нѣтъ.

Въ семъ случаѣ должно весьма прилѣжно смотрѣшь, чпобы больной опъ излишнихъ кровопусканій не пришелъ въ крайнее изнеможеніе, равномерно и чрезъ опущеніе оныхъ не увеличилась бы болѣзнь еще болѣе.

Неблагоразумно поступаютъ шѣ, которые чрезъ непрестанныя и безразсудныя

кровопусканія стараются прогнать въ одинъ разъ весь жаръ или лихорадку вмѣстѣ съ болѣзнью. Ибо лихорадка или жаръ есть то орудіе природы, помощію котораго болѣзненная маперія перерабатывается и переработавшись изъ шѣла выгоняется, слѣдовательно лихорадка нужна для излеченія болѣзни, и только требуется, чтобы она была умѣренна, то есть ни очень сильна ни очень слаба, а сіе познается изъ біенія жилъ и силъ больного.

Но чему безбоязненно можно и должно повторять кровопусканіе, когда больной находится въ жару, мучится сильною жаждою, имѣетъ довольныя силы и біеніе въ жилахъ или пульсъ полнѣе, жесче и крѣпче обыкновеннаго напуральнаго.

А какъ только примѣчено будетъ, что припадки часъ отъ часу утихаютъ и лихорадка или жаръ спановится ишше, біеніе въ жилахъ начинаеть быть порядочнымъ, то крови вовсе не должно пускать, развѣ припадки опять спанутъ усиливаться и біеніе въ жилахъ сдѣлается великое, полное и жесткое.

Вѣрное и щастливое оспрыхъ горячекъ леченіе зависиеть по большей части отъ благоразумнаго лихорадки управленія или умѣренія, и кто сіе наблюдаетъ, шомъ много выигрываетъ; ибо такимъ образомъ не только жестокость болѣзни унимается но и природа такъ располагается, что наконецъ, не требуя никакихъ по-

неспобій, бываетъ въ состояніи сама себѣ пособить.

Есѣлиже болѣзнь произошла отъ употребленія грубой, худой и къ варенію неспособной пищи, или отъ излишняго пресыщенія; больной жалуется, что онъ имѣетъ крайнее отвращеніе отъ пищи, частой позывъ на рвоту, горечь въ роту, тяжелость или щемоту подъ ложкою, круженіе головы, тошну и проч. то съ начала должно ему дать рвотное подъ No. 14. - 25. - 26. предписанное, только съ тою осторожностію, чѣобы прежде, нежели будетъ дано рвотное, была пущена кровь, есѣли необходимостъ того требуетъ; но чѣобы рвота удобнѣе и не столько съ великимъ усиліемъ происходила, то больной принявъ рвотное, долженъ пить въ довольномъ количествѣ теплую воду или чай.

Когда больной говоритъ, что чувствуетъ въ животѣ у себя тяжесть, и ворчаніе въ кишкахъ, склизко въ роту и не имѣетъ никакого позыву на пищу, то сіе значитъ, что у него въ кишкахъ много находится нечистоты, въ такомъ случаѣ шопъ часъ надлежитъ дать ему проносное подъ No. 3. - 5. - 14. - 38. предписанное.

Иногда одно рвотное, и одно проносное не сильно бываетъ отразить болѣзнь, сіе узнается, когда и на другой день тѣ

же самые продолжающіяся припадки, и для того полезно повѣторить по разсужденію, по или другое.

Еслилижъ напрошивъ больной слабѣетъ очень слабъ, или на другой день примѣнно утихнувшъ припадки, то для очищенія шѣла довольно будетъ чаще сдѣлать одни только промывательныя или давать лекарства подѣ №. 11.-12.-39.-141. предписанныя.

А когда не видно никакихъ признаковъ показывающихъ, чтобъ въ желудкѣ или въ кишкахъ содержалось что нибудь вредное, испорченное и несваримое, то отъ лекарствъ рвотныхъ и слабительныхъ должно удержаться, а пошѣ часъ начать употребляющъ иныя средства.

Поелику въ сихъ осипрыхъ горячкахъ по большей части кровь бываетъ очень густа, твердая части очень жески, жаръ и жажда чрезвычайно жеспоки, то нужно давать больному въ большемъ количествѣ лекарства прохладительныя, утоляющія соки и смягчительныя подѣ №. 1.-2.-6.-7.-8.-9.

Чѣмъ жаръ и жажда больше, чѣмъ бѣшеніе въ жилахъ сильнѣе, чѣмъ кровь густѣе: тѣмъ болѣе должно принимать сіи опвары, однако стараться, дабы оныя были употребляемы ни очень горячіе ни очень холодные.

При томъ надлежитъ не опмѣнно примѣчать, всякой ли день больной имѣетъ на низъ или только чрезъ день; еслили

не порядочно сѣе изпражненіе, то понудить промывашельнымъ подѣ № 10. означеннымъ.

Промывашельныя, мягчительныя и слегка прохлаждающія весьма способствуяютъ какъ для приведенія жару въ умѣренность, такъ и лихорадки, особливо когда кровь спремипельно къ головѣ обращается.

Естьлижъ больной не хочетъ употреблять промывашельныхъ, тогда для побужденія на низъ можешъ онъ принимать кромѣ жижительныхъ опваровъ порошокъ подѣ № 3. раза по два или по три всякой день; или липше подѣ № 11. 39. 141. однако прилѣжно надлежитъ наблюдать, чшобы онъ того не сдѣлался сильной поносъ, копорый приведетъ больного въ великую слабость.

Сіи лекарства слегка прохлаждающія, упоньчающія и мягчительныя должно продолжать до тѣхъ поръ, пока лихорадка уменьшился и совсѣмъ кончися. Симъ способомъ острия горячки, хотябъ были нѣсколько и трудныя, но щасливо вылечиваются, есшлы полько не будутъ соединены ни съ какими особливими припадками.

А когда они имѣютъ опмѣнныя и опасныя припадки, которые по причинѣ своей жеспокости и количества увеличиваютъ горячку, то оный показанный простой способъ леченія не доволенъ, а пребуются кромѣ шѣхъ еще другія лекарства.

По учиненіи нужныхъ изъ тѣла испра-
жненій, продолжающаяся еще сильная боль
въ головѣ причиняеиъ больному великое
мучение, коиорое лишиаиъ его покоя и он-
нимаетъ сонъ. Въ семъ случаѣ должно вся-
кое утро и всякой вечеръ прикладывати
къ подошвамъ ногъ квашеное тѣсто. А
еслили сверхъ сего голова больному ка-
жется будио чѣмъ наполнена и чувству-
еиъ шумъ, при томъ же примѣчается въ
глазахъ необыкновенная острота и какъ
бы сверканіе, то для отвлеченія боли онъ
головы просное квашеное тѣсто не до-
вольно, а должно его смѣшати съ горчицею
какъ подъ N 291. предписано и приклады-
вати къ показаннымъ мѣстамъ. Тѣмъ лю-
демъ, у коиорыхъ подошвы нѣжны и мяг-
ки, также женщинамъ нѣжнаго сложе-
нія, часио вмѣсто квашенаго тѣста при-
кладывати можно съ пользою пластырь
изъ смолы называемой (galbanum), коиорой
должно перемѣняти всякой день.

Также весьма полезно для больного,
еслили во время сильной боли въ головѣ
будетъ онъ чаще на постелѣ или на дру-
гомъ мѣстѣ сидѣть прямо, а по утру и
въ вечеру ставитъ ноги въ теплую воду.

Не меньше полезно для сего также
и мягчищедьныя промывательныя.

Еслилижъ всѣ сіи употребленныя сред-
ства ни мало не пособляють, то должно
приложитъ къ шеѣ подѣ запылку нары-
вной пластырь, и велѣть больному чаще
ню-

нюхашъ укусуѣ или онымъ мочить себѣ виски; а иногда примочки какъ подѣ N 15 предписано прикладываемыя ко лбу великую приносятъ пользу.

Однако естли все сіе употребивъ, глаза еще красны и быспры, больной чувствуетъ въ головѣ жаръ, въ ушахъ непрестанной шумъ, круженіе головы и проч. то должно припустить по ниже ушей пиявицы и тѣмъ выпустить нѣсколько унцовъ крови.

Но весьма часто случается, что коша всѣ сіи средства въ теченіи употреблены были, однако боль въ головѣ не прежде престае, какъ когда уже самая болѣзнь утихаетъ спанетъ; или какъ кровошеченіе изъ носу или передомной легкой понось послѣдуетъ.

Когдажъ больной начинаетъ бредить, безпрестанно почти спитъ и лежитъ въ безпамятствѣ, тогда одно квашеное тѣсто смѣшанное съ горчицею мало дѣйствуетъ, но кромѣ онаго должно положить къ икрамъ нарывной пластырь и смотря на болѣзные припадки должно иногда допустить печь изъ опыхъ матеріи нѣсколько дней.

Естли сей пластырь или шпанскія мухи не много дѣйствуютъ и дѣлаютъ слабое облегченіе, то надлежитъ еще оныя приложить къ ладьямъ или рукамъ.

Не меньше потребны нарывные пластыри, когда въ разныхъ частяхъ лица, рукъ и ногъ появляются судорожныя дерга-

нїя, также когда больной въ продолженїи болѣзни жалуется на тоску и спѣсненіе въ груди, есѣли онѣ трудно и тяжело дышенїѣ и имѣенїѣ не большой кашель. Есѣли только оныя припадкы не зависяшѣ онѣ многокровоїя.

Часто больные проводятѣ ночи въ безпокоенствѣ и безсонницѣ, есѣли сїя особливо болѣе трехѣ или ченѣрехѣ дней продолжается, то надлежитѣ больному давать всякой день вечеромѣ лекарство подѣ N 41 предписанное.

Такое лекарство очень полезно тѣмѣ, которые онѣ природы прусливы и имѣютѣ чюдкїя (irritabiles) чувствѣнные жилы или часто снраждушѣ судорожными движенїями.

Однако онѣ сихѣ лекарствѣ должно воздерживатѣся, когда голова очень болишѣ и въ ней ощущается великая тяжеѣлость, или больные необыкновенно спяшѣ много и лежатѣ безчувствѣнные.

Вѣ сихѣ обстоятельствѣхѣ наиприѣлѣжитѣише надлежитѣ примѣчать, довольнѣяль по обстоятельствѣмѣ больной имѣенїѣ силы, и ежели есть въ немѣ еще нѣкоторая крѣпость, бїенїе въ жилахѣ порядочное, и больной всѣ даваемая лекарства безѣ сопротивленїя принимаетѣ, то онѣ еще не безнадеженѣ; и по тому прежнїя лекарства перемѣняшѣ не должно, а продолжатѣ тѣ же жидительныя и прохладительныя, пока болѣзнь мало по малу начнетѣ уменьшатѣся: и ежели между тѣмѣ при-

примѣчно будетъ, что шомъ или другой припадокъ становившя легче, то есть жажды меньше, сонъ спокойнѣе голова свободнѣе, жаръ умѣрениѣе и проч. и сіе все день отъ дня въ лучшее приходишь состояніе, то надѣяться можно, что больной совершенно выздоровѣетъ.

Часто бываетъ что больной по уменьшеніи припадковъ чувствуетъ въ себѣ великую слабость, изнеможеніе и боль въ соснавахъ, но такое ощущеніе не есть худой знакъ, а паче подаетъ надежду благополучнаго окончанія болѣзни, по тому что тогда больной самъ въ себя уже приходишь и начинаетъ прямо чувствовать свое настоящее состояніе.

Еслили такія спасительныя признаки показывающіе скорое выздоровленіе поспоянно будутъ продолжаться, то не нужно мучить больного многими лекарствами: но можно позволить ему употреблять пищу, которая была бы нѣсколько питательнѣе.

Однако должно еще нѣсколько продолжать лекарства, пока лихорадка совсѣмъ покинетъ и не окажется ни малѣйшаго болѣзненнаго припадка.

Ибо еслили преждевременно будутъ остановлены лекарства, которыя должно бы еще продолжать, то часто что нибудь въ тѣлѣ остается, отъ чего или прежняя болѣзнь опять возвращается или иные еще худшіе припадки приключаются.

И такъ естли естественныя силы находящя въ своемъ порядкѣ, кровь не испорчилась и не разжилилась, то обьявленныя жидительныя и холодительныя лекарства доваѣюшъ, которыми самыя опасѣишя осприя горячки щастливо выдѣиваюшя.

Напрощивъ когда припадки въ своей жестокости не перемѣняются или часъ отъ часу худшими становящя и сверхъ сего шѣлесныя силы ослабѣваюшъ, бѣеніе въ жилахъ рдѣлаешя малое и слабое и проч. или показываешя распущеніе крови, то должно шотъ часъ оставишъ холодительныя лекарства, а на мѣсто ихъ давать укрѣпляющя, слегка возбуждающя и прошивляющяся гнилости, ибо иначе природа не въ состояніи бы была ни коимъ образомъ отвратишъ опасность, запрещающя поврежденію соковъ, переработашъ болѣзненную матерію и выгнатишъ ея изъ шѣла.

И такъ въ сихъ обстоятельствахъ должно употребляшъ лекарства подъ N 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. означенныя, особливо шѣ, которыя приготавливаются съ канфарою, давать больному въ то время, когда онъ страждешъ судорожными припадками.

Симъ больнымъ также можно позволятишъ пить виноградное вино, особливо естли они прежде имѣли привычку къ виннымъ напиткамъ или оныхъ въ сіе время
мя

мя неотпѣнно требуютъ, ибо часто случается, что отъ вина не только силы но и природа, которая начала было ослабѣвать скорѣе опять въ крѣпость приходитъ, по чему къ прежнимъ лекарствомъ подъ N 17. 18. 19. предписаннымъ можно прибавить вина до двухъ или трехъ унцовъ или давать лекарство подъ N 31. означенное.

Однако лекарствъ разгорячающихъ, очень оспрыхъ или крѣпкихъ не должно употреблять, ибо они всегда для сихъ больныхъ бываютъ ядомъ.

Еслилижъ употребивъ сии лекарства окажется бѣненіе въ жилахъ живѣйшее, больного силы умножаются и опасныя припадки проходятъ, тогда можно ожидать хорошихъ успѣховъ, и по тому оныя лекарства продолжать до тѣхъ поръ, пока нужда будетъ требовать.

Но когда не оказывается никакого поправленія болѣзни и всѣ припадки еще худшими спановаятся, то должно ожидать неизбѣжной смерти.

Еслили въ иномъ случаѣ приключится кровотеченіе изъ носу и больной почувствуетъ отъ сего въ себѣ облегченіе, то онаго никогда не должно останавливать или удерживать, хотя будетъ очень сильное и продолжится чрезъ долгое время, развѣ когда отъ излишняго изпеченія крови больной спанетъ изнемогать, блѣднѣть и члены зябнуть съ слабымъ, малымъ

лымъ и приоспанавливающимся бѣеніемъ въ жилахъ, и упадеиъ въ обморокъ.

Но и не нужно, чибобъ кровь изъ носу всегда шла въ великомъ количествѣ, ибо иногда и не многія капли дѣлаютъ великое облегченіе.

Часіло засореніе (*obstructio*) въ ноздряхъ или сосуды въ оныхъ очень жескія препятствуютъ намѣренію природы, по чему и выходяиъ нѣсколько только капель крови безъ всякаго облегченія; то по сей причинѣ больной жалуется, что онъ въ головѣ чувствуетъ ломъ, бѣеніе, круженіе и шумъ и безпрестанно зудитъ въ носу.

Тогда должно помощь подать силамъ природы, то есиъ, размять засохлые сосуды грецкою губкою, коиорую обмочивъ въ теплую воду должно прикладывати къ носу больного и велѣиъ ему изъ оной губки вииягивати ноздрами паръ.

Весьма худо, когда кровь сдѣлавшись очень густа и клейка не можетъ изъ носу свободно ийти.

Не меньше худымъ же признакомъ почитается, есиъли кровь идетъ изъ носу хотя въ великомъ количествѣ, но жидкая, и больному не только не дѣлаетъ никакого облегченія, но еще въ большую приводитъ слабость, дѣлаетъ припадки худшими; сіе часто случается въ то наипаче время, когда соки обратились уже въ острешу и гнилость.

Ча-

Часто больные, когда горячка нѣсколько дней уже продолжается и при томъ были нѣкоторыя признаки варенія болѣзненной манерѣи, жалуются на сдѣлавшуюся вдругъ тошску и боль подъ ложкою, на тяжесть въ желудкѣ, на отвращеніе отъ всякой пищи и позывъ на рвоу. Таковыя знаки показываютъ, что природа чрезъ рвоу ищетъ себя освободить отъ вредительной манерѣи.

И такъ еслили больного само собою рветъ, то для лучшаго споспѣшествованія сей рвогѣ долженъ онъ пить въ довольномъ количествѣ теплой воды смѣшанной съ медомъ.

Еслилижѣ больной не имѣетъ довольныхъ силъ для произведенія рвошы, то надлежитъ дать ему рвошное подъ no. 24 означенное, сіе рвошное во всякое время болѣзни пользуешъ, еслили только оно не обходимо нужно, и нѣтъ ничего такого, чтобы могло препятствовать дать рвошное.

Переломная рвоша рѣдко случается, развѣ только въ тѣхъ случаяхъ, когда не были употреблены рвошныя или проносныя лекарства, которыя потребны были еще при самомъ началѣ болѣзни.

А когда съ обыкновенными признаками и прочіе болѣзненные припадки также суть худы, и больной безъ всякаго себѣ облегченія извергаетъ рвошою много манерѣи, которая, будучи уже испорчена, полу-

получила цвѣтъ желчной или черноватой и сдѣлалась гнилою и вонючею, то изъ сего должно заключать, что онъ уже близокъ къ смерти.

Но въ сіе время гораздо чаще случается поносъ, который дѣлается больному нѣкоторое облегченіе, и по тому естли сей поносъ будетъ съ задержкою и не въ довольномъ количествѣ, то должно оному споспѣшествовать и никогда не удерживать, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда онъ излишняго испражненія придетъ больной въ разслабленіе и приключится отъ того другой какой вредъ.

И такъ естли случится вдругъ сильной поносъ ослабѣвающей больного, онъ чего бѣненіе въ жилахъ сдѣлается слабое, больной трудно дышать станетъ, животъ вспучитъ, испражненіе обыкновенно вонючее и гнилью пахнущее, или какъ пища такъ и принимаемая лекарства нѣдомъ выйдутъ будутъ ни мало не сваренныя, то больной находится въ великой опасности.

Часто бываетъ, что больной въ продолженіи сей болѣзни чувствуетъ стѣсненіе въ груди, дышитъ съ нѣкоторою трудностію, и приходитъ кашель копорому по томъ скорѣ послѣдуетъ изобильное харкотины выхаркиваніе.

Естли сіе случится безъ всякихъ иныхъ припадковъ, то ничего не должно
бесо-

особливаго предпринимать, а продолжать
шѣхъ самыя лекарства.

Когда же больнои съ трудомъ выхар-
киваетъ и въ легкихъ чувствуется жаръ,
то должно давать лекарства смягчитель-
ныя подѣ №. 8. 32. 33. означенныя, ко-
торыя бы могли сносѣшеспвовать легчай-
шему испражненію грудной мокроты.

Но естѣли больнои хранишь, съ тру-
домъ дышитъ, много потѣетъ, а руки и
ноги зябнутъ и при употребленіи всѣхъ
приличныхъ лекарствъ не свободно хар-
котина идетъ, то весьма худой знакъ;
естѣли не сдѣлается поносъ, коимъ бы
могъ облегчить шѣ припадки, то должно
думать, что больному вскорѣ смертъ
послѣдуетъ.

При началѣ горячекъ или острыхъ
лихорадокъ случающійся сильной поносъ
всегда почини вреденъ, ибо больнаго при-
водитъ въ слабость, отнимаетъ у крови
много жидкости, слѣдовательно дѣлаетъ
ее очень густою и показываетъ великое
поврежденіе или и разжиженіе крови, так-
же не надлежащее ея смѣшеніе или нако-
нецъ чрезвычайное ишвердыхъ часшей въ
шѣлѣ ослабленіе и пр.

Однако случающійся потъ и въ самомъ
началѣ болѣзни бываетъ иногда полезенъ,
естѣли болѣзнь произошла отъ простуды
и удержаннаго какимъ нибудь случаемъ
испаренія, или когда какая нибудь зарази-
тельная или прилипчивая оспроша, ко-
шорая

порал не совсѣмъ еще соединилась съ кровью, выгоняется изъ тѣла, прежде нежели она могла испортишь кровь, и произвеша опаснѣйшіе припадки.

Потѣ бывающій въ переломной день и послѣ какъ уже видны были признаки варенія, весьма полезенъ и больному дѣлаеши не малое облегченіе, особливо когда не чрезмѣрно силенъ и одинаково выпшпаеши по всему тѣлу.

Въ семъ случаѣ, когда больной потѣеши, должно давати ему мясныя похлебки, пиши теплой тонкой чай подѣ No. 13. означенный, и велѣши ему сколько возможно беречься отъ холоднаго воздуха. Однако не весьма полезно для больного, есшяли онъ будетъ всегда лежати въ постѣлѣ и закушати многими одѣялами, находиши въ очень теплой горницѣ или употребляетъ горячишельныя пошова лекарсва.

Никогда не должно возбуждати поту, когда больной давно уже потѣеши, и не чувствуетъ отъ него ни малѣйшаго въ себѣ облегченія, но еще больше ослабѣваетъ; въ такомъ случаѣ при наблюденіи осторожности лучше оной неумѣренной потѣ уменьшати и удерживати, и потому надлежитъ больному позволить пользоваться нѣкоторымъ легкимъ прохладеніемъ, которое въ томъ состоитъ, что бы онъ почаще сидѣлъ на постѣлѣ прямо, а есшяли можно прохаживать въ

ком-

комнатѣ и исподоволь, уменьшалъ бы съ себя плашье, и бѣлье свое шакже перемѣнялъ бы съ осторожностію.

Лекарство подѣ №. 35. предписанное, въ сей болѣзни весьма часто великое производитъ дѣйствіе, ибо оно останавливаетъ нечувствительнаго излишній и ослабляющій потъ.

Естьлижъ сіе лекарство мало подѣйствуетъ, то должно давать перуанскую корку подѣ №. 70. означенную, копорая всегда почти совершенно вылечиваетъ и возвращаетъ больному потерянныя его силы, естли только потъ не произошелъ отъ испорченной матеріи находящейся въ первыхъ пищевосныхъ дорогахъ, отъ зашвердѣній, открывшихся чирьевъ или отъ распущенной крови.

Естли окажутся на поверхности тѣла опухоли, копорыхъ причиною перешедшая болѣзненная матерія, при томъ оныя будутъ мягки, надуты водяною мокрою, и когда допронуться перстами, ощущается въ нихъ колыханіе, то оныя потъ часъ надлежитъ по правиламъ искусства прочнуть и выпустить содержащуюся въ нихъ матерію.

Естли будутъ тверды, должно ихъ привести въ созрѣлость мягчительными и нѣкопорую острошу въ себѣ имѣющими лекарствами: однако естли они сдѣлались уже мягки и матерія въ нихъ начи-

наетъ колыхаться, то должно оныя раз-
рѣзатьъ.

Иногда такая перешедшая матерія за-
нимаетъ какую нибудь наружную часть
пѣла, но въ скорости опять исчезаетъ и
переходитъ въ другую часть.

Часто матерія будучи всосана кров-
ными жилками заражаетъ дороги, чрезъ
которыя обыкновенно проходитъ моча и
изпражненія низомъ и на послѣдокъ нечув-
ствительно сими дорогами вонъ выходитъ.

Не рѣдко съ довольнымъ облегченіемъ
больнаго выступаютъ прыщи по всей по-
верхности пѣла.

А еслии такія опухоли, причиненныя
перехожденіемъ матеріи, оставляющъ на-
ружную поверхность и занимающъ внут-
реннія части, то должно ожидать вели-
кой опасности.

Изпражненія болѣзненной матеріи чрезъ
кровотеченіе изъ носу, мочою, низомъ,
выплесываніемъ рномъ мокроты, попомъ
и пр. или чрезъ наружныя въ продолженіи
болѣзни переходенія, очень часто дѣ-
лаютъ великое и неожиданное облегченіе,
и во вся прогоняютъ болѣзнь, и по сей
причинѣ можно почесть ихъ спаситель-
ными и полезными, а иногда таковыя пѣ-
лесныя изпражненія не пособляютъ боль-
ному, но еще въ большую его приводятъ
слабость и припадки дѣлаютъ худшими;
въ такомъ случаѣ не лзя ихъ называть
переломными; но припадочными и злыми.

Сіежѣ

Сіежъ самое случается, когда выступитъ пшену подобная сыпь и гнилыя пятна: то часто больной чрезъ то получаетъ скорое облегченіе и щастливо выздоравливаетъ. Въ то время справедливо они называються полезными и переломными.

Однако не рѣдко бываетъ, что больной, хотя таковыя пятна и появляются, не чувствуетъ въ себѣ никакого облегченія и спустя немного времени приходитъ еще въ худшее состояніе. Въ семъ случаѣ они не могутъ почестъся переломными; но припадочными и злыми.

Не зная прежде повѣтроїя, никогда не лзя въ началѣ болѣзни предсказать, высыплетъ ли на поверхность тѣла какая нибудь сыпь или нѣтъ, потому что въ началѣ не бываетъ подлинныхъ и опличительныхъ ея признаковъ.

Однако до выпупленія въ болѣзни такихъ сыпей больные часто жалуются, что у нихъ давитъ и щекочетъ въ груди, ломятъ въ соснавахъ, особливо въ поясницѣ и крестцовой кости, бывають безпокойны, иногда кожа на поверхности тѣла примѣчается суха и жеска и иногда выступаетъ легкой по тѣлу потъ; тѣ, у которыхъ высыпаетъ прищевая сыпь, всегда имѣють потной лобъ и шею, часто ощущають нѣкоторое подираніе по кожѣ, потъ ихъ издаетъ запахъ кислой, безпрестанно капають, и чувствуютъ стѣсненіе въ груди.

Есѣли пшену подобная сыпь или гни-
лая пѣшна порядочно и легко выступяшѣ,
при томѣ вѣ томѣ самой день, вѣ которой
бывася переломѣ болѣзни, то больнымъ
всегда служашѣ великимъ облегченіемъ. Вѣ
семѣ случаѣ не должно ничего опмѣняшѣ
изъ предписанныхъ лекарствъ, но оныя
сѣ пользою прежде употребляемыя надле-
жишѣ не боязненно продолжашѣ.

Есѣли шаковыя пѣшна не совсѣмъ
еще высыпали, больной очень слабъ и
шоскуенъ, то должно даванъ ему легкія
попovyя лекарства подѣ №. 16. 17. 18. 19.
20. 22. 25. 30. 31. предписанныя.

А какѣ скоро они выступяшѣ и боль-
ной почувсшвуешѣ вѣ себѣ легкость и яв-
ное умноженіе силъ, то оныя попovyя
лекарства тотчасѣ должно оставишѣ и
спарашѣ легкимъ леченіемъ удерживашѣ
на поверхности тѣла сѣи пѣшна.

Такія пѣшна часно на четвертой,
седьмой, девятой или одинадцатой день,
однако не рѣдко на семнадцатой день или
поздѣе высынаюшѣ; сѣе случаетѣся по боль-
шей части тогда, когда природа имѣешѣ
нужду вѣ продолжительнѣйшемъ времени,
дабы хорошо персработашѣ болѣзненную
матерію и оную изъ крови выгнашѣ.

Есѣли кто спанетѣ очень послѣшно
лечитѣ сѣи болѣзни, или есѣли больной и
которые за нимѣ ходяшѣ будучи непер-
пѣливы, начнушѣ прежде времени, дабы
скорѣе вышли наружу пѣшна, употре-
бляшѣ

бля возбуждающія и горячительныя лекар-
ства и держащъ больного въ неумѣрен-
ной теплотѣ, то болѣзнь не только не
уменьшится, но еще больше усилятся;
такимъ образомъ выгнанная наружу сыпь
не облегчаетъ, но обезсиливаетъ; и есть-
ли природа не имѣетъ силъ поправить
какъ самую болѣзнь, такъ и непорядочной
способъ леченія, то нѣтъ никакой надеж-
ды, чтобы сѣи больные выздоровѣли. И
по тому съ начала болѣзни вынустивъ изъ
человѣка нѣсколько жидкостей и учинивъ
все потребное, не должно скороспѣшно
лечить острыѣ болѣзней и безъ главной
причины перемѣнять лекарства; но не-
боязненно продолжать оныя до тѣхъ
поръ, пока или болѣзнь пресѣчется, или
окажутся другіе признаки, которые по-
требуютъ перемѣны въ леченіи.

Облегченіе болѣзни зависить не отъ
многаго числа пятенъ, но отъ ихъ дѣй-
ствій, ибо часто небольшая прыщевая
сыпь или гнилыя пятна приносятъ боль-
ному больше облегченія, нежели когда
оныя высыпаютъ въ великомъ количествѣ.

И такъ если больной чувствуетъ въ
себѣ облегченіе отъ малаго числа выпу-
тшихъ пятенъ, и все течетъ надлежа-
щимъ порядкомъ: то тогда причинитъ
великой вредъ, кѣо захочетъ увеличить
сѣе число возбуждающими лекарствами и
горячимъ содержаніемъ больного.

Сыпь называемая латинскимъ словомъ (miliaria): не иное что есть, какъ маленькіе, круглые, возвышенные подобныя пшениу пузырьки, которые иногда бывающѣ красны и тогда называющіся (miliaria rubra) а когда они наполнены свѣтлою водяною матеріею, называющіся (alba)

Гнилыя пятна называемыя (petechiae) суть пятна широко краснѣющія, круглыя, подобныя пятнамъ, когда накусаятъ блохи, которыя чѣмъ болѣе своему виду и цвѣту соотвѣтствуютъ, тѣмъ почитаются легчайшими.

А чѣмъ болѣе отъ своего надлежащаго виду опсупающѣ, чѣмъ красный ихъ цвѣтъ больше походитъ на шемноватый пурпуровый или черной, тѣмъ шакія пятна почитаются худшими, особливо естьли кромѣ сего имѣющѣ еще вокругъ себя барговый или синій цвѣтъ, который показываетъ крайне опасное поврежденіе и гнилость въ крови.

Однако часто случается видѣть, что худатаго свойства гнилыя пятна больному дѣлали облегченіе; по сей причинѣ въ такомъ случаѣ не должно много бояться, естли прочія болѣзненныя обстоятельства не очень тяжелы, и текутъ обыкновеннымъ своимъ порядкомъ.

Случается иногда, что чрезъ ошибку учиненную самымъ больнымъ, либо шѣми, которые за нимъ ходятъ, или отъ простуды, гнѣва, страха или употребленной

ной тайнымъ образомъ неприличной пищи, пашна нечаянно скрываются внутрь и приводятъ больного въ великую опасность.

Тогда смотря на причину, производшую таковое дѣйствіе и на происшедшіе опшуда припадки должно избирать соопвѣпствующій всему сему способъ леченія. Ибо еспли не разсмотрѣвъ хорошо прежде причины, пошъ часъ начать употреблять горячипельныя потовыя лекарства, то можно больного прежде времени предать смерти. Очень часто случается, что опъ скрывшихся внупри пашенъ рождаются новая и жестокая оспрая лихорадка, бѣеніе въ жилахъ спановится полное, и твердое, большой шрудно дышеніе, чувспвуетъ чрезвычайно великой жаръ и мучишся нестерпимою жаждою.

Въ то время нужно больному пустить кровь, давать жидипельныя и холодипельныя лекарства, шакъ какъ въ началѣ лихорадки. Ибо въ семъ случаѣ не смотря ни мало на прошедшее, надлежитъ поступать такимъ образомъ какъ поступлено было при самомъ началѣ болѣзни, и по тому всѣ потовыя горячія лекарства приключаютъ весьма великой вредъ.

Есплижъ причина состоитъ въ легкой проспудѣ, при томъ лихорадка не очень жестока, то больной долженъ пить много чаю подъ No. 15. 21. означеннаго, который слегка гонишъ потъ, и при томъ содер-

жать себя въ одинаковой теплотѣ: часто посредствомъ такого леченія больной въ короткое время оправляется и пятна опять наружу выходятъ.

А когда будетъ примѣчено, что природныя силы слабы и потовыя лекарства не въ состояніи наружу выгнать пятна, то должно привязать къ икрамъ нарывныя пластыри и давать больному крѣпкія лекарства подъ No. 16. 17. 18. 20. 22. 23. предписанныя. А какъ скоро пятна выступятъ, то надлежитъ пользоваться больного смотря по его силамъ и припадкамъ.

Еслилижъ скрывшихся пятенъ причиною была сильная душевная страсть, то больной во первыхъ долженъ успокоиться и употребляя много питья слегка гонящаго поить, держаъ себя въ умѣренной теплотѣ, также для укрѣпленія силъ таковымъ больнымъ весьма полезенъ сонъ, который должно производить лекарствомъ подъ No. 37. показаннымъ.

Однако еслии въ семъ случаѣ сдѣлается сильная лихорадка, и больной, находясь въ великой тоскѣ, дышитъ тяжело, то онаго лекарства, наводящаго сонъ не должно давать; но пособлять кровопусканіями и лекарствами жидишельными и холодишельными.

А когда скрылися пятна по причинѣ неумѣреннаго употребленія вредной и къ варенію неспособной пищи, онѣ чего больной чрезвычайно тоскуетъ, тяжело ды-

дышетъ, желудокъ у него пучитъ и вѣздухи твердѣютъ, чувствуетъ отвращеніе отъ всякой пищи и имѣетъ непрестанное понужденіе на рвоту, то потѣ часъ должно дать ему рвотное подѣ №. 24. 25. 26. или проносное подѣ №. 3. 5. 14. предписанное или наставить подобное промывательное.

Часто бываетъ, что, какъ скоро сія нечислопа изъ желудка и кишекъ выйдетъ, безъ всякаго лекарства пятна опять наружу вышупаютъ; а естли сего не случится, хотя бѣеніе въ жилахъ ощущается не такъ худо и лихорадка не очень сильна, то прилично давать больному по прежнему лекарства жидишельныя и слегка гонящія потѣ.

Не рѣдко безъ извѣстной причины пятна скрываются внутрь, отъ чего больной терпитъ такое стѣсненіе въ груди, что находится въ великой опасности, чтобъ нечаянно не задохнулся. Тогда конечно еѣ тѣла ш. е. руки и ноги, которые въ сіе время бываютъ холодны, должно тереть фланелью или байкою и немедленно пустить ему кровь.

Такой способъ леченія дѣлаетъ весьма скорое пособіе, и часто сіе одно только средство остается, которымъ можно сохранить жизнь, однако въ сомнительныхъ сихъ обстоятельствахъ кровопусканіе не всегда бываетъ полезно, ибо иногда

иѣкоторые изъ сихъ умирали въ то самое время, когда имъ пущенна была кровь.

Однако въ сей крайней опасности, кровопусканія, хотя и сомнительное средство, не должно пренебрегать; ибо лучше одного сохранить нежели оставить всѣхъ безъ всякой помощи, и шакъ сказать предать смерти. Но прежде нежели сіе будетъ учинено, надлежитъ объявить пріятелямъ больного о сомнительномъ средствѣ и о той самой опасности, которой не можетъ больной избѣжать.

Если скрывшійся пятна перейдутъ въ голову и причиняютъ въ ней нестерпимой ломъ, сонливость, бредъ, шрясеніе сухихъ жилъ и проч. по разсмотрѣвъ сіи припадки шомъ часъ должно больному осприть на головѣ волосы и непрестанно прикладывать примочки изъ отвара приготовленнаго изъ травъ, которыя имѣютъ силу разбивать, по шомъ припустить къ вискамъ піявицы, дабы выпустить нѣсколько унцовъ крови; или для отвлеченія наружу болѣзненной матеріи поставитъ на запятокъ или на иныхъ частяхъ близкихъ къ головѣ кровопускательныя баночки и ставитъ чаще нѣсколько острыхъ промывательныхъ: при шомъ всемерно стараться вызвать на поверхность шѣла шиковыми лекаршвами скрывшійся внутрь пятна или выгнать ихъ изъ шѣла иными дорогами.

Въ такомъ случаѣ произвольное и изобильное кровопеченіе изъ носу часто дѣлаетъ великую пользу.

Но когда скрывшіяся внутрь пятна произвели жестокія припадки, то никогда не должно пренебрегать нарывныхъ пластырей, которые надлежитъ прикладывать къ икрамъ, или смотря по припадкамъ, и къ другимъ частямъ тѣла, а къ подошвамъ привязывать квашеное тѣсто съ горчицею подъ No. 291 означенное.

Хотя скрывшіяся внутрь пятна часто ввергающъ больного въ крайне великую опасность, однако случается, что нечаянно спрятавшись не оставляютъ послѣ себя никакихъ печальныхъ слѣдствій: но въ то время тотъ часъ слѣдуетъ иное тѣлесное изпражненіе, которое выноситъ съ собою вредительную массу.

Такое изпражненіе очень часто бываетъ мочою и низомъ, иногда чрезъ легкой кашель и изверженіе рпомъ харкотины; а въ женскомъ полѣ сіе бываетъ чрезъ изпеченіе мѣсячныхъ кровей, особливо когда уже онымъ время ишши.

Если такія тѣлесныя изпражненія порядочны и безъ всякой трудности, то въ леченіи, въ разсужденіи оныхъ, ничего не должно перемѣнять; а если они причиняютъ какую трудность и не въ довольномъ количествѣ, то должно понудить ихъ легкими лекарствами, если же сдѣлаютъ-

лаются очень сильныя, то привести въ умѣренность.

Во всякой острой болѣзни почитается за худой и опасной знакъ, когда больные жалуются, что они чувствуютъ внутри сильной жаръ и несносное сженіе, а напрошивъ въ наружныхъ часяхъ ознобъ, особливо когда у нихъ лице очень похудѣло и совсѣмъ перемѣнилось, при томъ біеніе въ жилахъ ощущается слабое, малое и непостоянное.

Чѣмъ больше при самомъ началѣ болѣзни больного знобитъ и шрясетъ, тѣмъ сильнѣйшей болѣзни надлежитъ ожидать и тѣмъ худшіе припадки послѣдуютъ.

Одинаковъ во всемъ тѣлѣ жаръ показывается хорошій знакъ, но противной сему слѣдуетъ, если цвѣтъ въ лицѣ часто перемѣняется и больной то краснѣетъ то блѣднѣетъ или синѣетъ.

Также признаютъ за хорошій знакъ, когда біеніе въ жилахъ, которое прежде было малое и слабое, послѣ принятыхъ лекарствъ увеличивается, становится крѣпче и свободнѣе, и больной чувствуетъ поправленіе въ своихъ силахъ.

Если по долговременномъ и жестокомъ брѣженьѣ больной лежитъ въ безпамятствѣ, непрестанно спитъ, мучится сильными шрясеніями сухихъ жилъ или судорогою, то такое его состояніе не рѣдко предвѣщаетъ опасность.

А въ хорошемъ состояніи больной находится тогда, когда послѣ такого же брѣду не чувствуетъ въ головѣ никакой боли, спитъ свободно и пробудившись отъ сна чувствуетъ укрѣпленіе въ своихъ силахъ.

Сіе часто бываетъ передъ кровошеченіемъ изъ носу.

Хотя во время острой болѣзни все хорошо и вънадлежащемъ порядкѣ кажутся, однако больного не лѣзя ипочно увѣрять, что его болѣзнь къ лучшему клонится, естли у него языкъ, зѣвы, ноздри, глаза и кожа на пѣлѣ очень сухи. Ибо сіе показываеніе, что еще находится въ пѣлѣ что нибудь такое, которое нечаянно и съ великою опасностію въ скоросни откроется.

Когда больные очень безпокойны, не лежаиъ порядочно въ постѣлѣ, но безпрестанно валяются и переворачиваются то на ипотъ то на другой бокъ, безпрерывно сисяпся всапъ съ постѣли, колѣни поднимаютъ въ верхъ, руками по пустому хватаютъ, или не принимаютъ ни пици ни лекарствъ, то должно признать сіе за худой знакъ.

Естлижъ они спокойны и въ напуральномъ положеніи лежатъ, принимаютъ лекарства и пицу, и оныя производятъ въ нихъ надлежащее дѣйствіе, то можно надѣяться, что они выздоравлиютъ.

Въ острыхъ болѣзняхъ лица, копорую больной долженъ употреблять, всегда должна быть соразмѣрна жестокости лихорадки, долговременности и перемѣнѣ припадковъ.

Чѣмъ лихорадка жесточе и чѣмъ болѣе тѣло содержишь въ себѣ нечистоты, тѣмъ самымъ должно употреблять пищу легкую, тонкую и всячески оберегаться отъ пищи скоро согнивающей или копорой желудокъ не можетъ скоро варить.

Но жидкая каша приготавливаемая изъ ячныхъ либо овсяныхъ крупъ или изъ сороцинскаго пшена, въ копорую надлежитъ прилить не много уксусу или лимоннаго соку; также тонкія похлебки изъ муки либо изъ печенаго бѣлаго хлѣба или изъ пшеничныхъ сухарей служатъ больнымъ наилучшимъ кушаньемъ.

А мясныхъ кушаньевъ, горячей и очень питательной пищи до тѣхъ поръ не должно употреблять, пока лихорадка не покинетъ; однако можно позволить больнымъ тонкія мясныя похлебки, особливо когда больной оныя употреблялъ прежде и при томъ пьетъ много кислыхъ напитковъ.

Вареные зрѣлые плоды, вареный шпинатъ, эндивіа салатъ и проч. служатъ для больного какъ пищею такъ и лекарствомъ.

А когда утихнутъ опасныя припадки, когда больной чувствуетъ въ себѣ облегченіе и имѣетъ позывъ на ѣду, можно позволить пищу, копорая иѣсколько питатель-

пельнѣ и велѣшь ему оную употреблять по немногу въ одинъ разъ, но по чаще.

Когда лихорадка во вся покинула, больной чрезмѣрно хочешъ ѣсть, то давать можно ему молодое мясо, какъ то, курятину, шелятину, баранину и по не многу вина, еесли онъ къ нему позывъ чувствуетъ.

Однако еесли послѣ лихорадки еще во рту слизко и больной не имѣетъ порядочнаго или во все никакого позыву на ѣду, то прежде, нежели онъ начнетъ употреблять мясныя кушанья, долженъ принять легкое слабительное подъ №. 38. предписанное.

Когда силы станутъ помалу поправляться, и больного желудокъ легко варить пищу, то долженъ онъ слегка приступать къ прежнему своему жишю и употреблять обыкновенную пищу, только долженъ воздерживаться отъ той, которая трудно варится, пока шло его получить прежнюю крѣпость, ибо такая пища ему вредитъ и препятствуетъ скорѣйшему выздоровленію, при томъ шло на долгое время остается слабымъ и немощнымъ.

Въ сей болѣзни должно содержать больного ни очень тепло ни очень холодно, ибо для него пристойнѣйшая есть легкая и умеренная теплота.

И сколько возможно надлежитъ стараться, чтобы воздухъ въ его комнатѣ былъ свѣжъ и чистъ; по чему въ лѣтнее вре-

время, когда на дворѣ очень жарко и сухо; должно полѣ въ горницѣ, гдѣ лежишь больной, окрапливать холодною водою смѣшанною съ трешкою частію уксуса.

Поринишься воздухъ по большей части отъ того, когда въ комнатѣ и около постѣли больного находишься много людей, ибо отъ того воздухъ спановишься удушливой, въ которомъ лежа больной поспуеешь и безпокоишься; по сей причинѣ пріятели больного непріятельски и очень неблагоразумно поступающъ, когда во весь день сидишь у постѣли и упрждающъ его своими излишними услугами и ненужными разговорами.

Сверхъ всего сего всемѣрно надлежишь наблюдать около больного чистоту, и когда онъ жалуется, что у него отъ непреспаннаго лежанія по на томъ по на другомъ мѣстѣ показывающа пролежни, то должно мѣста сѣи раза два или три въ день мазать мазью, копорая соспавляется слѣдующимъ образомъ. Возми яичной бѣлокъ и не много проспной водки, по томъ положивъ сей соспавъ въ чистой глиняной сосудѣ, поставь на легкой огонь и мѣшай ложкою или лопашкою до тѣхъ поръ, пока сдѣлается надлежащая мазь.

Сѣе простое лекарство весьма часто преняспивуешь увеличиваться пролежнямъ, которые для больныхъ гораздо мучительнѣе нежели самая болѣзнь.

ГЛАВА III.

О гнилой горячкѣ.

Въ острыхъ непрерывныхъ лихорадкахъ въ первые почти дни кровь столь бываетъ гусна и клейка, что чрезъ тончайшія кончики кровныхъ жилъ съ трудностію проходитъ; изъ сего явствуетъ, что такая кровь будучи склонна къ воспаленію по своему свойству причиняетъ сильной жаръ во всемъ тѣлѣ какъ въ наружныхъ, такъ и во внутреннихъ частяхъ; однако въ лихорадкахъ прямо гнилыхъ кровь по большей части бываетъ какъ бы свернувшаяся и распузенная, по чему удобно поршился и загнивается.

Сии лихорадки всегда опаснѣе острыхъ горячекъ и по большей части бывающъ заразительны.

Часто они происходятъ отъ излишества острой и испорченной желчи, особливо послѣ великаго и долговременнаго зною, отъ дурной пищи или отъ голоду долгое время претерпѣваемаго, отъ хлѣба дѣланнаго изъ старой и испорченной муки или изъ поврежденныхъ еще на полѣ зеренъ, отъ употребленія мясъ начинающихъ гнить или больныхъ животныхъ; отъ дохлыхъ рыбы, отъ воды, въ которой много насѣкомыхъ, отъ воздуха нечистаго, гнилаго, вонючаго неимѣющаго никакого движенія; а всего удобнѣе отъ воздуха горючнчаго, гдѣ многіе лежатъ шю лихорад-

Часть I.

Д

кою

кою или гнилымъ кровавымъ поносомъ испраждающіе, и куда въпрѣ и свѣжій воздухъ никогда не проходишь.

Гнилая лихорадка обыкновенно начинается ознобомъ, послѣ котораго спустя нѣсколько времени бросаетъ больного въ жаръ, также тяжелою и скрыпкою болью въ головѣ, безпокойствомъ и сномъ ни мало не облегчающимъ; пакъ чпо больной вставши отъ сна чувствуетъ въ себѣ еще большую слабость нежели прежде.

Тѣло такое бываетъ слабо и какъ бы об липо клейкимъ потомъ, однако въ немъ не очень еще сильной жаръ примѣчается, языкъ бываетъ мокрой и покрытъ сверху корою свинцоваго или желтозеленаго цвѣту; больные жалуются, чпо у нихъ горько во рту и позываетъ на рвоту, бѣненіе въ жилахъ ощущается мягкое, слабое, малое и весьма часно въ началѣ болѣзни бываетъ медлительнѣе натуральнаго. Сіи больные бывающъ безпокойны, слабы, боязливы; а иногда, чпо бы съ ними ни случилось, равнодушно все сносятъ, ни о чемъ не заботятся, рѣдко хощатъ пить, не способны ни къ какому дѣлу и все для нихъ равно въ постѣлѣ ли они находятся или въ иномъ мѣстѣ.

Часто сія лихорадка многіе дни скрывается въ тѣлѣ прежде нежели покажется, отъ чего такіе больные ни на что опредѣленно не жалуются и не почишають себя больными; при томъ не чувствуютъ въ се-

бѣ

бѣ никакой особенной тяжести кромѣ обыкновенной усталости, и что у нихъ теряется охота къ бѣдѣ.

Слѣдовательно, если изъ объявленныхъ причинъ какая нибудь откроется, если и нѣкошорыя изъ упомянутыхъ припадковъ окажутся, то можно заключить, что такой больной сопряженъ гнилою лихорадкою, а особенно когда въ сѣе самое время свирѣпствуетъ между людьми такое повѣтріе.

Рѣдко въ сей болѣзни бываетъ нужно кровопусканіе, развѣ больной многокровенъ или горячаго сложенія; однако и въ сихъ обстоятельствевахъ безъ крайней нужды болѣе одного разу не должно пускать крови.

Но въ началѣ надлежитъ больше стараться о сохраненіи силъ естественныхъ, кошорыхъ должно возбуждать, препятствовашъ распущенію крови и предохранять ее отъ гнилости.

Опытомъ дознано, что тѣ люди гораздо удобнѣе справляются отъ болѣзни, кошорые при самомъ ея началѣ принимаютъ рвотное, особенно когда въ желудкѣ и кишкахъ много находится нечистоты; ибо часто сѣя лихорадка происходитъ отъ дурной и грубой пищи.

По тому всегда должно начинать лечить такимъ лекарствомъ, какое подъ Но. 24. 25. 26. показано, особенно когда больной имѣетъ отращеніе отъ пищи и

побужденіе на рвоу, при томъ выходящъ изъ рта гнилая, вонючія и горькія отрыганія, также чувствуетъ онъ тоску и тяжесть подъ ложкою.

Сего лекарства никогда не должно пренебрегать, когда изъ предидущихъ причинъ подлинно примѣчено будишь, что больной прежде употреблялъ гнилую и испорченную пищу.

А хопя сего по примѣчанію и не окажется, однако нужно дать больному легкое проносное подъ №. 3. 5. 14. 38. дабы желудокъ и кишки освободили отъ нечистоты; ибо чрезъ сіе больной не получаетъ никакой слабости, но еще большее облегченіе.

Естьлижъ больные съ самаго начала сдѣлались очень слабы и опасно имъ давать проносное или рвоющее, то въ такомъ случаѣ по крайнѣи мѣрѣ для очищенія желудка должно чаще спавивать имъ промывательныя.

Симъ способомъ приведши первые дороги въ надлежащій порядокъ, надлежитъ давать лекарства подъ №. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 25. означенныя.

Естьлижъ сверхъ сего испражненія исходящія низомъ также и моча издающъ худой и вонючей запахъ, отрыганія вонючъ на подобіе гнилыхъ яицъ, біеніе въ жилахъ очень мягкое и слабое, слѣдовательно кровь уже разпушена, спонка и близка къ гнилости, то къ предписаннымъ лекарствамъ должно прибавить купоросной кислоты, дабы такимъ образомъ сдѣлать

лашь оныя лекарства прїятно кислыми и дѣйствишельнѣйшими.

Лекарства подѣ №. 29. и 177. написанныя, могутъ служить больному вмѣсто обыкновеннаго и лекарственнаго пища.

Сии и подобныя лекарства надлежитъ продолжать, пока болѣзнь пресѣчется или окажется явное ся поправленіе, и когда біеніе въ жилахъ и силы умножаются, то оныхъ лекарствъ прїемъ можно уменьшить а прибавить большее количество пища.

Испытайтъ болѣзнь не переспаешь скоро и сверхъ сего худые припадки часъ отъ часу умножаются, то должно давать лекарства подѣ №. 30. 31. предписанная.

Перуанская лихорадочная корка при самомъ началѣ болѣзни употребляемая, часто производить весьма великое дѣйствіе, естли только прежде будутъ очищены первыя дороти, ибо она проливается дальнѣйшему распущенію и поврежденію крови, удерживаетъ судорожныя снягиванія, сохраняетъ и возобновляетъ силы и симъ самымъ многократно избавляетъ больного отъ смерти. По чему, когда жестокіе воспаляютъ припадки, пить часъ надлежитъ оную употребить въ довольномъ количествѣ, а естли больной ртомъ не можетъ оной принимать, то можно употреблять оную удобно съ промывательными. Можно также сію корку смѣшивать и съ прежними лекарствами или съ оными по пе-

ремѣнно давать какъ подѣ № 31. 70. 145. 146. 147. 148. 149. 150. показано.

Также умѣренное употребленіе вина часто дѣлаетъ великое вспомошествованіе леченію, естли принимать его съ тою же оснороженосію какъ предписано въ оспрыхъ горячкахъ.

Лекарства производящія на поверхности кожи легкое рдѣніе или краснѣніе, естли положишь оныя къ подошвамъ, въ семъ случаѣ дѣлаютъ великую пользу, также нарывные пластыри, которые должно такимъ же образомъ привязывать, какъ въ оспрыхъ горячкахъ.

Въ сихъ гнилыхъ лихорадкахъ часто на третій или на четвертой день болѣзни, видна бываетъ на поверхности тѣла пшени подобная сыпь или пятна пурпуровато цвѣту съ нѣкоторымъ больнаго облегченіемъ, что почишанъ должно хорошимъ знакомъ.

Естлижъ сїи пятна ни мало вверхъ не поднялись а наровнѣ съ прочею кожею или и худого цвѣту и съ ними выступишъ по шѣлу сильной вонючей попѣ, производящій больнаго въ великую слабость, то часно сїи больные, въ концѣ шести дней болѣзни, прекращаютъ свою жизнь.

Естлижъ такіе припадки на четвертой день не оказываютъ въ себѣ еще ничего худого, а на седьмой день въ первой еще разъ такими сдѣлаются, то дол-

жно ожидать смерти въ одинадцатой или шринадцатой день.

Иногда припадки хопя умножаются до четвертаго дня и въ своей жестокости не перемѣняются, но на седьмой день нѣкоторыя изъ нихъ начинаютъ уменьшаться и такъ продолжаются одинаковымъ образомъ; сѣ облегченіе умножаясь до девятаго или одинадцатаго дня, ежели такимъ оспается и въ слѣдующіе дни, то сѣ не малую надежду подаеиъ къ выздоровленію. При семъ иногда пятна на четырнадцатой день сами собою появляются, но съ явнымъ уменьшеніемъ всѣхъ припадковъ; а иногда сѣ болѣзнь безъ всякой сыпи въ четырнадцатой или семнадцатой день къ своему концу приходитъ.

Естьли сѣ лихорадка на четвертой день сдѣлается худшею, моча, которая прежде была густа и мутна, спановиися тонкою и водяною, при томъ больной не чувснвуетъ на седьмой день никакого послабленія и припадки еще больше усиливаются; то такіе признаки въ сѣ смертельными почищаются.

Въ сихъ случаяхъ нѣсколько холодновашый, чистый и возобновляемый воздухъ весьма часто приносишь великое и неожиданное облегченіе, слѣдовательно надлежишь всемѣрно стараться, чпобы сѣ больные находились въ шакомъ воздухѣ.

Можно симъ больнымъ позволишь умѣренно пить холодную воду, особливо когда они чрезвычайно оной жаждущъ.

Въ лихорадкахъ гнилыхъ и злыхъ бѣеніе жилъ очень часто обманывается, ибо не рѣдко ощущаешь медлительнѣе и близко подходитъ къ натуральному, нежели какимъ оно быть должно въ разсужденіи жестокихъ припадковъ, больной мало себя чувствуя сдва на чпо жалуется: естли въ такихъ обстоятельствахъ въ предсказаніи будущаго полагаетъ всю надежду на одно бѣеніе жилъ, то очень легко обманушься можетъ.

Однако не всѣ одержимые гнилою лихорадкою вдругъ при самомъ началѣ подвергаются объявленнымъ злымъ припадкамъ; но нѣкоторые находясь, у которыхъ бѣеніе жилъ скорое, сильное и нѣсколько пугое, однако не чувствуютъ въ себѣ никакой почти слабости; а болѣе чувствуютъ жажду и жаръ, имѣютъ кровь очень густую а не разпущенную; словомъ естли тѣ находясь припадки, которые обыкновенно бывающъ въ острыхъ горячкахъ, то сихъ больныхъ не инымъ образомъ должно лечить, какъ тѣмъ же самымъ, когда бы они были одержимы острою горячкою.

Но съ кровопусканіями и холидательными лекарствомъ надлежитъ поступать осторожнѣе, дабы сими не привести больного въ слабость, хотя часто съ начала

и бывающѣ знаки острой горячки, однако по прошествіи нѣсколькихъ дней силы умаляются и скоро показывающіяся припадки гнилой лихорадки, а какъ скоро сіи при-мѣнены будучѣ, то смотря по онымъ дол-жно располагать способъ леченія.

А еслили безъ всякихъ прежде быв-шихъ злыхъ припадковъ выступивъ въ седьмой или въ одиннадцатой день прыще-вая сыпь или пияна пурпуроваго цвѣта съ примѣшнымъ облегченіемъ больныхъ, то должно надѣяться, что они въ ско-ромъ времени выздоравливуютъ.

Сіе случается, когда гнилая лихорад-ка приспаивъ къ такимъ, которые про-чимъ шѣломъ здоровы, имѣющѣ хорошую кровь и не столь склонную къ гнилости такъ же и къ шѣмъ, которые суть холод-наго и мокротнаго сложенія.

ГЛАВА IV.

О воспаленіи.

Соки нашего шѣла всегда должны быть соразмѣрны своею жидкостію сосудамъ, чрезъ которые имъ надлежитъ проходить.

А какъ только они потеряютъ такую жидкость и частицы ихъ между собою очень крѣпко соединены, то кровь спа-новится клейкою и нѣсколько огустѣ-ваетъ.

Очень клейкая густая кровь не можетъ свободно и безъ затрудненія проходить чрезъ мѣлчайшія бьющіяся жилки и отверстія, отъ чего рождается сильное мясныхъ тонкихъ волоконъ между собою сплетеніе, изъ которыхъ состоятъ кровные сосуды, и чрезъ сіе самое возбуждается во всемъ тѣлѣ великой жаръ; но поелику кругообращеніе крови не можетъ преодолѣть сего препяисшвія, то сердце и бьющіяся жилы начинаютъ сильнѣе сжиматься, отъ чего кровь въ жилахъ скорѣе движется и на послѣдокъ по причинѣ великаго и жестокаго жару возжигается лихорадка, которая обыкновенно называется лихорадкою воспалительною (*febris inflammatoria*).

Когда сія загустѣлая кровь остано-
вится въ послѣднихъ протокахъ бьющих-
ся жилъ, и въ нихъ сдѣлается заваль,
которой естли скоро не испребляется
опѣ крови съзади напирющей, то чрезъ
сіе часто кровь не можетъ свободно про-
ходить, отъ чего сердце и бьющіяся жи-
лы получаютъ еще большее раздраженіе и
лихорадка часъ отъ часу увеличивается;
когда такимъ образомъ умножится и уси-
лится движеніе крови, слѣдовательно еще
большимъ сдѣлается толкъ заваль, то за-
соренные сосуды разширяются и тако-
вымъ своимъ разширеніемъ спѣсняютъ про-
чіе сосуды около ихъ лежащія, отъ чего
и въ сихъ кругообращеніе крови теряется

и такъ безпрестанно умножаясь во многихъ сосудахъ заवालъ, увеличивается лихорадка, пока на послѣдокъ сія больная часпъ начнетъ краснѣнь, рдѣнь или горѣнь, и при томъ пухнуть съ великою болью и колошьемъ, съ пугостію и съ нѣкопорымъ чувствіемъ біенія: такая опухоль называется воспалительною.

Такое воспаленіе можетъ случиться какъ на виѣшнихъ такъ и во внутреннихъ частяхъ тѣла, только внутреннее всегда опаснѣе наружнаго.

Всякое воспаленіе окончивается проявимъ образомъ: 1.) Когда оное разойдется и опухоль упадетъ, что почитается лучшимъ всего; 2.) Когда воспаленіе за-благовременно не пройдетъ и остановившаяся кровь испорчится и превратится въ гной; 3.) Когда не случится ни того ни другаго, то часъ, въ которой всѣ жидкости находящіяся безъ движенія, и отъ самаго сего застоянія портящіяся, начинаютъ чернѣть и мершвѣть, что называется *антоновымъ огнемъ* (gangrena) и *мертвенностью* или *гнилью* (sphacelus). Однако часто случается, что лихорадка, боль, нагорѣлая краска и жаръ во вся упишашъ; но вмѣсто всѣхъ сихъ больная она часть получаетъ окрѣплость или шугость и *затвердѣніе* (scirrhus). Сіе бываетъ отъ того, когда огустѣлые соки лишившись всей своей водяности засохнуть и сра-

сшущ-

спущенъ съ сосудами, чрезъ которые они прежде прошекали.

Первое окончаніе воспаленія есть всѣхъ легчайшее и полезнѣйшее; а третіе всѣхъ опаснѣйшее, и когда приключится во внутреннихъ частяхъ, всегда бываетъ смертельное.

Во впоромъ, то есть въ нагноеніи, часто самая природа, однако чаще искусство дѣлаетъ великое пособіе, но загноеніе во внутреннихъ частяхъ и во внутреннихъ органахъ не рѣдко подаетъ причину къ смерти.

Естьлижъ воспаленіе займетъ желѣзистыя части, то не рѣдко также оныя превращаются въ окрѣпость, которая иногда являясь болѣе и переходя въ ракъ (cancer).

Можно надѣяться, что воспаленіе тихо пройдетъ, когда оно не очень великое и не жестокое, кровь не очень огустѣла и не получила еще особенной оспроты, лихорадка очень умеренна и когда употребленные лекарства въ скороснѣ произведутъ явное и неперемѣнное облегченіе.

А еслили оказывается тому противное, то надлежитъ ожидать нагноенія, или въ разсужденіи очень опасныхъ и часъ отъ часу умножающихся припадковъ, должно опасаться, чтобы воспаленіе не превратилось въ антоновъ огонь.

Во всякомъ воспаленіи должно избирать такой способъ леченія, которымъ
бы

бы можно опончить и охолодить кровь, ибо всѣ горячительныя лекарства причиняютъ великой вредъ и открываютъ удобнѣйшій путь антоновому огню.

Кровопусканіе въ семъ случаѣ есть первѣйшее и необходимѣйшее средство, которое, смотря по свойству лихорадки, по силамъ больного и по жестокости воспаления, должно повторять.

Въ первомъ кровопусканіи, когда находится жестокое воспаление, должно выпустить довольно количество крови, по счисленію двенадцати до двадцати унцѣвъ, если только состояніе больного не препятствуетъ сего учинить.

Еслили воспаление сдѣлается въ шей части тѣла, которая очень чувствительна и крайне нужна для жизни, на пр. въ мозгу, въ легкомъ, въ сердцѣ и проч. то въ первой разъ должно выпустить столько крови больному, пока онъ почувствуетъ легкой обморокъ.

Но въ послѣдующихъ кровопусканіяхъ надобно поступать осторожнѣе, дабы не привести больного въ крайнюю слабость, а только надлежитъ довести лихорадку до такой умѣренности, какая необходимо требуется въ оспрахъ горячкахъ, какъ прежде сказано было.

Кромѣ кровопусканій потребно, что бы больной принималъ чаще и по многу питья жидительнаго, мягчительнаго прохладительнаго и прилѣжно употреблялъ бы ле-
кар-

карства такого же свойства, 'копрыхъ подѣ №. 1. 2. 7. 6. 8. 9. предписаны.

Мягчительныя и холодительныя промывательныя или легкія слабительныя подѣ №. 11. 39. означенныя чрезвычайно пользуютъ, когда находится жаръ и жестокая лихорадка, больной не ходитъ во все на низъ или очень мало, и когда испражненія исходящія низомъ очень засохли. Снаружи къ воспаленной часпи надлежитъ почаще прикладывать жидкія или густыя мягчительныя припарки.

Естьлижъ сіи лекарства мало дѣйствуютъ и боль ни мало не утихаетъ, при томъ больного часпо то въ томъ то въ другомъ мѣстѣ знобитъ, то сіе показываетъ, что не лзя во все положитьсь, чтобы воспаленіе порядочно прошло, но оное скоро обратится въ нагноеніе.

А какъ нагноеніе въ созрѣніе свое приходитъ помощію боли и лихорадки, которая при началѣ онаго всегда увеличивается, то въ семъ случаѣ крайне не благоразумно и со вредомъ поступитъ, которой будучи увѣренъ, что не можно болѣе ожидать, чтобы воспаленіе миновалось, спанетъ безъ понуждающей причины многими кровопусканіями или жидительными и холодительными лекарствами приводитъ больного въ крайнее безсиліе, и мѣшатъ природѣ въ ся дѣйствіяхъ.

Во время нагноенія должно больному давать пишь много мягчительнаго пишня
подѣ

подѣ №. 8. 40. 88. означеннаго и прикладывать къ наружныйѣ частямѣ густыхъ мягчительныхъ припарки, а естѣли нагноеніе очень медлительно производится, то къ онымѣ припаркамѣ надлежитѣ примѣшавъ крѣпкія и въ созрѣлости приводящія лекарства, дабы могло оно скорѣе совершиться.

А когда больная часть нагноилась совершенно, то боль и лихорадка примѣтно утихаютѣ и по тому должно тотѣ часѣ стараться сдѣлать по правиламѣ искусства свободной гною выходѣ, естѣли природа одна не въ силахѣ произвести свободной дороги для иссеченія вонѣ гною.

Когда во время начинающагося нагноенія не примѣчаются никакіе свойственные сему припадки, или которые и находятѣся, но спаваятѣся часѣ оиѣ часу худшими, и естѣли больной чувствуетѣ въ себѣ несносную боль съ жаромѣ, то должно опасатѣся, чтобы не открылся антоновѣ огонь.

Какѣ скоро сей смертельной огонь станетѣ показыватѣся, то боль уменьшася и часто вдругѣ во все утихаетѣ; оиѣ чего больной какѣ самому себѣ, такѣ и присутствующимѣ возлѣ его кажется бытъ внѣ всякой опасности, но бѣненіе въ жилахѣ ощущается слабое, непостоянное, неровное и прѣостанавливающееся, конечности шѣла, то есть руки, ноги, уши, носѣ холодѣютѣ, губы синѣютѣ, глаза, какѣ

какъ въ ямѣ, дыханіе неровное и по всему тѣлу выступаетъ холодной клейкой потъ.

Изъ сихъ и шому подобныхъ несо-
мнительныхъ знаковъ познаешь, что сія
скоропосыжная перемена, показывающаяся
лучшею больному и при немъ находящим-
ся, есть ложная, и предвѣщаетъ болѣе
смерть нежели поправленіе болѣзни.

Какъ скоро появились первѣйшіе знаки
антонова огня, то потъ часъ должно
оставить всѣ холодишельныя и мягчи-
тельныя лекарства; а употреблять тѣ,
которыя поддерживающіе и умножающіе
естественныя силы и сопротивляются
гнилости, какія видѣть можно подъ №. 16.
18. 19. 20. 22. 23. 28.

Въ такомъ печальномъ состояніи час-
то одна перуанская лихорадочная корка
служитъ дѣйствишельнѣйшимъ лекар-
ствомъ, которая можетъ сохранить жизнь
больного.

А еслили больной сего спасительнаго
лекарства не можетъ никоимъ образомъ
притимать внутрь въ довольномъ количе-
ствѣ, то должно ему чаще наставлявати
промывательное пригововленіе изъ сей
самой корки.

Очень часто сіе одно лекарство силь-
но бываетъ опровергнуть антоновъ огонь,
или, когда уже онъ совершенно открылся,
ослабить его отъ здоровой чаши, особ-
ливо когда онъ находится на наружныхъ
частяхъ тѣла.

ГЛАВА V.

О горячкѣ по причинѣ воспаления мозга или его перепонкѣ.

Сія горячка случается всегда въ то время, когда сдѣляется воспаление въ мозгу, или, какъ весьма часто бываетъ, въ мозговыхъ оболочкахъ (meninges) но дабы въсправедливо узнать, надлежитъ примѣчать изъ слѣдующихъ признаковъ.

При самомъ началѣ сей болѣзни имѣетъ больной нестерпимую ломоту въ головѣ, жестокой жаръ и неуполимую жажду, лице у него очень краснѣетъ, глаза сверкаютъ и какъ бы горятъ. Когда онъ начнетъ бредить, то безпорядочно на вопросы отвѣчаетъ, очень беспокоится, непрерывно силится вскочить съ постѣли, и самъ себя не помня обнажаетъ свое тѣло, оцѣпывается, шевелитъ по воздуху руками, какъ будто мухъ ловитъ, напоследокъ такое его брѣженіе обращается въ бѣшенство, никого изъ своихъ прежнихъ знакомцевъ не узнаетъ, бросается на присутствующихъ, плюетъ на нихъ и харкаетъ; естъ и пьетъ такое ужасное время нѣсколько и пройдетъ, то безпрестанно молча ворчитъ, скрипитъ зубами, нечувствительно калится и мочится въ постѣли, или часто выкидываетъ рвотною зелень.

Иногда такіе больные послѣ сильнаго брѣженія приходятъ въ себя и кажутся быльш умомъ порядочны, всѣхъ знаютъ,

Часть I.

Б

лас

ласково и весело разговариваютъ; однако имъ въ этомъ не должно вѣрить, ибо они часто бросаются на предстоящихъ и впадаютъ опять въ бѣшенство гораздо сильнѣйшее прежняго, и спуская не много времени умираютъ. Бѣшеніе въ жидкахъ ощущается по большей части очень скорое, дрожащее, неровное и сжатое, моча всегда бываетъ красна и огненнаго цвѣта; также за худой знакъ почитается; когда она при силѣ обильнѣе сдѣлается блѣдною и водяною. Иногда на третій на четвертой или на пятой день болѣзни сии больные оканчиваютъ свою жизнь смертію.

Когда сія воспалительная болѣзнь гораздо съ большею соединена опасностію и жестокостію нежели всѣ прочія, то съ самаго начала тошнѣ часъ надлежитъ пропить оной употреблять тѣ же лекарства, которыя въ разсужденіи припадковъ были похваляемы, когда говорено было вообще о воспалении.

Въ сей болѣзни во первыхъ требуется пустить больному много крови, насильствовать смягчительныя, холодительныя промывательныя или давать лекарства, которыя не допускаютъ сдѣлаться запору, какія подъ No. 11. 12. 39. 141. показаны, и которыя унимаютъ стремление крови, дабы такимъ образомъ нѣсколько удержавъ сильное печеніе крови въ мозгъ.

Къ сему весьма много способствуетъ, естли больной чаще будетъ по-сигивать на постѣль прямо, по утру и въ

въ вечеру ставишь ноги на полчаса въ теплую воду и непрестанно прикладываешь къ подошвамъ тѣсно подѣ No. 219. означеное.

Также чрезвычайно пользуется припусканіе пѣявицъ къ вискамъ или къ заднему проходу, особливо есѣли больной спраждетъ глухимъ почечуемъ, и для того всегда должно изслѣдовать, не склоненъ ли больной къ почечуйнымъ припадкамъ.

Есѣли отъ прилѣжнаго упоиребленія сихъ средствъ лихорадка и сильное брѣженіе унимается, больной чувствуетъ въ головѣ облегченіе и находится спокоенъ, лице у него начинаетъ блѣднѣть, глаза уже не столько ярки и жаръ нѣсколько унимается, то можно надѣяться, что онъ выздоровѣетъ.

Однако смотря на припадки должно еще продолжати тѣже самыя лекарсва.

А есѣли всѣ одобренныя лекарсва не дѣлають никакого пособія, и болѣзнь вмѣстѣ съ припадками спановишся худшею, то должно прибѣгнуть къ тому самому, способу какой предписанъ въ надлежащемъ мѣстѣ о острыхъ горячкахъ, о боли въ головѣ или о пятахъ вступившихъ въ голову и о скрывшейся внутрь болѣзненной материи.

Кровоисеченіе изъ носу и открывшійся почечуй въ сей болѣзни часно дѣлають великое облегченіе.

А есѣли воспаленіе превращается въ нагноеніе, то правда что лихорадка поки-

дастѣ и брѣженъе уменьшается, однако нагноеніе въ сей часпи влечетѣ за собою смертельныя слѣдствія; ибо гноисшая матерія находясь долгое время подѣ черепомѣ и будучи всегда согрѣваема неплотною околичныхѣ часпей становится острѣе, и разбѣдая ближайшія часпи приключаетѣ непрестанной и несносной ломѣ въ головѣ, безсонницу, безпрестанное круженіе, тоску и иногда поснрѣлъ, дѣлаетѣ многія часпи тѣла недѣиспвенными или параличными. А иногда причиняетѣ неизлечимую падучую болѣзнь или напоследокѣ дѣлаетѣ больного на всю жизнь безумнымѣ.

Однако иногда гной ищетѣ самѣ себѣ выходу и вытекаетѣ чрезѣ уши, глаза и носомѣ, или производитѣ на шеѣ опухоли и вереды, но гораздо чаще вытекаетѣ ушами и носомѣ.

Еслили гной чрезѣ уши намѣреваетѣ иппи, то больной, хотя и не имѣетѣ поврежденія въ умѣ; но жалуется на непріятной шумѣ и боль въ ушахѣ, или въ то время вовсе ничего не слышитѣ.

Однако изѣ сего никакого худа не слѣдуетѣ, а шомѣ часѣ должно начать прикладывать къ ушамѣ и другимѣ мѣстамѣ густыя смягчительныя и разбивающіе припарки, ибо часпо помощію сихѣ гноисшая или водяная матерія вытекаетѣ однимѣ ухомѣ или обоими, и такимѣ образомѣ опять возвращается какѣ слухѣ такѣ и здоровѣ.

Пока

Пока будеть ощутишеленъ хотя ма-
лѣйшей шумъ или иная какая боль въ
ушахъ и въ ближайшихъ мѣстахъ, то до
тѣхъ поръ должно парить густыми при-
парками или впускать въ уши какую ни-
будь нѣскольکو оспрую жидкость, дабы
такимъ образомъ совсѣмъ выгнать ма-
терію.

А еслии сія матерія перейдетъ въ
глаза, то часто причиняетъ неизлечимую
слѣпоту.

Но починается всегда за хорошій знакъ,
когда такіе больные жалуются на боль въ
соснавахъ и другихъ частяхъ шѣла. Ибо
сіе показываешь, что болѣзненная мате-
рія хочетъ перейти въ сіи части, кото-
рую дабы скорѣе принянуть въ сіи мѣ-
ста должно къ нимъ приложить квашеное
мѣсто или мѣсто смѣшанное съ толче-
ную горчицу какъ подъ No. 291. предписано.

Еслии опъ такого переходенія ма-
теріи больной почувствуетъ въ себѣ яв-
ное облегченіе и уменьшеніе болѣзни, то
въ семъ случаѣ надлежитъ послушанъ та-
кимъ образомъ какъ сказано о острыхъ
дихорадкахъ.

Перехожденіе матеріи къ жѣлѣзамъ
ушнымъ въ сей болѣзни очень рѣдко обѣ-
щаетъ надежное оолегченіе.

Часто болѣзненная матерія нечаянно
переходитъ въ легкіе, но когда оную въ
скоромъ по томъ времени больной спанетъ

выкашливать довольною харкотиною съ ощущеніемъ въ себѣ нѣкотораго облегченія, то иногда можно надѣяться, что онъ выздоровѣетъ, особливо естли сверхъ сего и прочіе припадки уже поправились.

Но сіе переходеніе матеріи въ легкое рѣдко имѣетъ благополучной конецъ, ибо смерть въ скоромъ времени прекращаетъ жизнь.

Между хорошими знаками щипается, естли пакіе больные испускаютъ много мочи густой и мупиной, которая вскорѣ опускаетъ у себя на низъ гноеватую осадку, или когда случится легкой поносъ, ибо посредствомъ паковыхъ испражнений, голова спановится свободною.

Напрощивъ больной гораздо большей опасности подвергается, когда моча у него или совсѣмъ не идетъ или вытекаетъ тонкая и водяная или когда сдѣлается у него кровавой поносъ, естли онъ мучится непрестанною и съ болью икошою, или естли его рветъ черною и гнилою склизью либо зеленью.

Въ сей болѣзни усыпительныя лекарства съ великою осторожностію надлежитъ употреблять, или до тѣхъ поръ оныхъ не давать больнымъ, пока лихорадка и воспаление будутъ продолжаться.

Естлижъ употребивъ надлежащимъ порядкомъ приличныя средства лихорадка и воспаление прошли и больной находится въ своемъ умѣ, но при всемъ томъ не
мо-

можетъ спать; но въ вечеру, когда ему ложиться въ постѣлю, должно давать лекарство подѣ №. 41. означенное, и смотря по обстоятельствамъ оное продолжать.

У нѣкошорыхъ больныхъ по прогнанїи лихорадки и воспаленїя часто такая бываетъ слабость въ головѣ и такая чуткость въ шѣхъ мѣстахъ, въ коихъ было прежде воспаленїе, что и послѣ, когда все шѣло чрезъ порядочную пищу уже получило довольныя силы, не рѣдко безъ всякой явной причины заговариваются или брѣдяшъ, для сихъ больныхъ послужитъ спасительнымъ лекарствомъ, какое подѣ №. 37. предписано, которое чрезъ нѣсколько дней должно продолжать.

Естьлижѣ и сіе не произведетъ желаемого дѣйствїя, то надлежитъ давать перуанскую корку подѣ № 70 означенную.

Выздоровливающїе отъ сей болѣзни должны долгое время беречься отъ всякаго излишняго упражненїя, долговременнаго чтенїя книгъ и глубокихъ размышленїй; ибо такую неумѣренностїю приводятъ свою память въ великую слабость, и дѣлающа со всѣмъ слабоумными.

Г Л А В А VI.

О воспаленїи глазъ.

Воспаленїе глазъ познается, когда они очень горяшъ, рдѣющъ, очень сухи,

болящѣ, краенѣющѣ и жилы бьются очень скоро; больные не въ состоянїи бываюиѣ глядѣиѣ на свѣтъ и на огонь и ищутѣ для себя шемнаго мѣста и непрестанно руками трутъ глаза.

Сіе воспаление раждается или отѣ общиѣ причинѣ воспаления или отѣ какихѣ нибудѣ наружныхѣ приключенїи или отѣ острой маперїи, которая изѣ другаго мѣста перешла въ глаза.

Но чему ссѣлаи сїя болѣзнь случилась послѣ воспаления въ мозгу, послѣ долговременной головной боли, или отѣ иной острой и злой болѣзни, то воспаление такое глазѣ бываетѣ всегда соединено съ великою опасностїю: ибо оное зависитѣ отѣ перехожденїя ѣдкой матерїи въ глаза, которая часно не только глазныя мокроты дѣлаетѣ густыми и непрозрачными; но и повреждаетѣ твердыя части, причиняетѣ упорную и неизлечимую слѣпоту.

Также не меньше вредитѣ глазамѣ перехождение въ нихѣ маперїи, какую имѣетѣ рожа, воспа, наружныя заковы болѣзни, оспроны французской нечиспи, цынготныя, подагрическія, ломотныя и проч. или когда раны, изѣ которыхѣ нѣсколько лѣтъ шла маперїя, безразсудно залечены наружными ссѣдательными лекарствами, или когда шкуиѣ болячки натурою или искусствомѣ произведенныя прежде времени зашверены. Слѣдовательно такую ма-
те-

терію потѣ часѣ должно ошвѣть отѣ
глазѣ и выгнать изѣ шѣла.

Вѣ разсужденіи боли, жестокаго вос-
паленія и силѣ больнаго топѣ часѣ должно
отворишѣ кровь, и еспѣли перебуотѣ об-
сшояшельства, то и вшорично пустишѣ;
также прилично даватѣ чаще крѣпкія сла-
бишельныя лекарства, какія подѣ №. 1.
5. 42. 43. 44. 47. означены, но густыхѣ
мягчительныхѣ припарокѣ не должно упо-
шреблять; ибо они вѣ семѣ случаѣ про-
изволятѣ опасное нагноение, также не
меньше вредятѣ и наружныя лекарства,
которыя внутрѣ машерію вгоняютѣ и силь-
но вяжутѣ.

Но густыя припарки приготовляемые
изѣ разбивающихѣ травѣ, варенныхѣ вѣ
просномѣ виноградиномѣ винѣ смѣшанномѣ
пополамѣ сѣ водою или вѣ слабомѣ крас-
номѣ виноградиномѣ винѣ сушѣ нужны и
полезны; также изѣ сихѣ травѣ приго-
товляющія мѣшечки, которыя обмочивѣ
вѣ теплосе вино прикладываются кѣ гла-
замѣ сѣ успѣхомѣ.

Сии больные должны пипѣ много жи-
дительныхѣ и кровотисшишельныхѣ опи-
варовѣ, которыми осироша разжижается,
унимается и легкимѣ образомѣ выгоняетѣ
чрезѣ мочеые проходы, такія лекар-
ства видѣшѣ можно подѣ №. 6. 7. 40. 46.

Еспѣли примѣчено будетѣ, что отѣ
сихѣ лекарствѣ болѣзнь поправляется,
то употребленіе оныхѣ должно продолжатѣ.

Естьлижъ въ скорости не сдѣлается никакого облегченія, то въ то время должно положить на зашылокъ или позади ушей нарывной пластырь и оставить послѣ сего тѣчь матерію на долгое время, Рожечное или топорковое кровопусканіе, также и воздушныя банки или горшечки въ сихъ случаяхъ дѣлають великую пользу,

А къ тѣмъ мѣстамъ, изъ которыхъ перешла острая матерія, должно привязать тѣдкіе густыя припарки, и естьли можно, нарывной пластырь, дабы такимъ образомъ опять къ прежнимъ мѣстамъ притянуть матерію.

Раны не порядочнымъ образомъ затворенныя должно посредствомъ тѣдкихъ лекарствъ отворить, сіе самое надобно учинить и съ болячками нарочно произведенными, или апертурами когда они прежде времени залечены.

Естьли употребленіемъ сихъ средствъ хотя боль и воспаленіе уменьшился, но глаза находящія еще красны, мутны и не чисны, то должно употребить лекарство подъ No. 48. означенное, въ семъ случаѣ также лекарство подъ No. 50. предписанное много пособляетъ.

Гораздо удобнѣе вылечивается воспаленіе глазъ, которое получило свое начало не отъ прежде бывшей въ тѣлѣ болѣзни или особенной остропы крови, но отъ какой нибудь общей причины воспаления.

Когда

Когда воспаленіе находится во внутреннихъ частяхъ глазъ, и больной жалуется, что въ глазахъ очень болитъ и рѣжетъ, отъ чего онъ не можетъ смотрѣть на свѣтъ, то такая болѣзнь почищается гораздо опаснѣйшею, нежели когда спржадутъ одни только наружныя глазныя оболочки.

Еслили при сей болѣзни окажется лихорадка сопряженная съ жестокими припадками, то шопчасъ больному должно пускить кровь и давать пить холодиельныя лекарства, что самое продолжать нѣсколько времени, при томъ спараться, чтобы больной имѣлъ свободно на низъ, слѣдовательно черезъ день или черезъ два давать ему проносное подъ No. 3. 5. 14. или лекарства подъ No. 11. 12. 39. 141. означенныя, или вмѣсто всего сего наспавливать ему чаще промывашельныя.

Въ сихъ воспаленіяхъ, еслили глаза будутъ сухи и болѣтъ, надлежитъ съ самаго начала прикладывать къ нимъ гущыя смягчительныя припарки; а какъ только воспаленіе уменьшится, и мучительная боль нѣсколько утихнетъ, то вмѣсто смягчительныхъ припарокъ должно употребить разбивающія, которыя часто въ короткое время всю болѣзнь прогоняютъ; также можно надѣяться, великой пользы отъ долговременнаго употребленія лекарства подъ No. 54. предписаннаго.

Когда

Когда боль и лихорадка совсѣмъ утихнутъ, но разбивающія припарки не въ состоянїи укрѣпить ослабѣвшія части, и совсѣмъ излечить воспаления, то должно прибѣгнуть безъ всякаго опасенія къ лекарствомъ слегка вязательнымъ и укрѣпляющимъ, какія подъ No. 51. 52. 53. означены.

Если по выпускѣи надлежащаго количесва крови, по употребленїи жидкихъ и проносныхъ лекарствъ лихорадка нѣсколько утихла, однако больной не можетъ ночью порядочно спать, то надлежитъ давать ему по вечерамъ всякой день лекарство подъ No. 41. означенное.

А когда воспаленіе сдѣлалось отъ наружняго какого нибудь поврежденія или удара и ушиба; кровные сосуды не пронузины, то можно всю болѣзнь прекратить, еслии тотъ часъ обмочивъ плапокъ въ холодную воду привязать къ глазамъ. Въ семъ случаѣ теплыя и смягчительныя припарки бывають вредны.

Еслии такое воспаленіе обратиться въ нагноеніе, и гной между глазными оболочками или въ передней глазной плевѣ соберется, то должно оной по правиламъ искуства выпустить.

Часто воспаленіе долгое время не излечивается по причинѣ острой матерїи, содержащейся въ ближайшихъ частяхъ глазъ, особливо въ рѣсницахъ, копорая непрестанно беспокоитъ сіи часны, при-

причиняетъ свербежъ, рдѣніе, непрестанное печеніе изъ глазъ мокроты и боль съ жаромъ, также не рѣдко производитъ на рѣсницахъ нѣкоторыя ранки.

Въ семъ случаѣ больные должны чрезъ долгое время употреблять опвары подѣ No. 40. и подѣ No. 46. означенные, и кромѣ сего чаще въ день промывать глаза первымъ опваромъ и какъ бы оныя парить; также можно съ наружи прикладывать лекарство подѣ No. 55. 56. при томъ всякую недѣлю одинъ или два раза должно давать сему больному проносное подѣ No. 4. 5. 14. предписанное.

Исправивши острогу крови и когда не примѣчается болѣе никакого жару, можно употреблять лекарство подѣ No. 51. означенное.

ГЛАВА VII.

О воспаленіи въ ушахъ.

Сіе воспаленіе познается, когда больной жалуется, что у него въ одномъ или въ обоихъ ушахъ чрезвычайно болитъ, колѣтъ, горитъ и какъ бы что колотитъ, и сверхъ сего имѣетъ бѣшеніе въ жилахъ лихорадочное.

Сии больные крайне беспокойны, ни мало не спятъ, часто бредятъ, и иногда мучатся жестокими и весьма опасными припадками.

По-

По чему сія болѣзнь не меньше опасна, какъ и самое воспаление въ мозгу; и по сей причинѣ должно такимъ же образомъ пользоваться, какъ самую горячку отъ воспаления въ мозгѣ происходящую.

Г Л А В А VIII.

О воспаленіи горла или жабы.

Подъ именемъ жабы все то разумѣется, что причиняетъ трудность и боль въ глотаніи, или дѣлаетъ оное во все невозможнымъ.

Но какъ сіи припадки и ихъ причины весьма между собою различиваются, то и воспаление въ горлѣ и его леченіе различно.

Очень часто воспаленіе случается въ самомъ зевѣ и внутреннихъ частяхъ пищеприимнаго горла.

Во время такого воспаленія больные, когда спанутъ глотать, то чувствуютъ въ горлѣ боль съ жаромъ и колошемъ, и имѣющъ острую горячку.

Какъ сіе воспаленіе бываетъ двоякое; либо жестокое, либо тихое и заражаетъ либо немногія, или многія части, и при томъ оныя болѣе или менѣе чувствительнѣе другихъ: потому и самые произведенные отъ сего припадки и лихорадка бывающъ не одинаковы, либо тихіе, либо жестокіе.

Сіе воспаленіе всегда почти можно глазами видѣть, и тогда только не лѣзя его усмотрѣть, когда оно находится глубоко

боко въ зевѣ и больной не можетъ хорошо разинушь рта, или когда подавишь слегка у больного языкъ, тотчасъ его рвешь. Въ то время осматривается только узнавать жеспокость и опасность воспаления изъ боли, сиремленія лихорадки и прочихъ припадковъ.

Не рѣдко случается, что послѣ нечаяннаго простуженія, слѣдуетъ подираніе по кожѣ, а спустя не много времени бываетъ оцущителенъ во всемъ тѣлѣ жаръ съ расслабленіемъ всѣхъ соснавовъ, глотанъ трудно и больно, и бленіе жилъ показываетъ лихорадку.

Еслили кто чувствуетъ такіе припадки, то съ самаго начала долженъ взять спокойствіе, беречься отъ холоднаго воздуха и не пить ни чего студенаго, парить снаружи шею, пить много отваровъ жидительныхъ и смягчительныхъ подъ №. 13. 40. 88. означенныхъ. Также по утру и въ вечеру принимать порошокъ подъ №. 1. предписанный, и снаращаться такимъ образомъ возбудить легкой поппъ, весьма часно симъ простымъ леченіемъ больной скоро себя вылечиваетъ и не рѣдко отвращаетъ сильную и опасную болѣзнь.

Во многокровныхъ, часно одно кровопущеніе учиненное съ начала, прежде нежели могла болѣзнь укорениться, возвращаетъ здоровье.

Еслилижъ больной не многокровенъ, то часно одно проносное лекарство подъ №. 4.

№. 4. 5. 14. предписанное, въ состоянїи бывающъ во вся прекратить сію болѣзнь, только бы больной спокойно себя содержалъ и всячески остерегался бы онъ холоду.

Когда воспаленіе глубоко въ горлѣ находится, слѣдовательно больной съ трудностію и болью глотаетъ, болѣзнь будучи соединена съ жестокою лихорадкою не столь скоро и не столь легко уменьшается, по въ то время безъ всякаго медленія, въ разсужденіи силъ больного, должно ему много выпустить крови и спустя два два или три часа опять повторить; сіе повтореніе надлежитъ дѣлать столько разъ, сколько припадки, бѣненіе жилъ, и силы больного того требуютъ.

Равнымъ образомъ надлежитъ сколько можно употреблять онвары смягчительные и холодительные подъ №. 6. 8. 40. означенные; въ семъ случаѣ болѣе потребны проносныя лекарства, и по тому, пустивъ больному на первой день кровь, тогда часъ надлежитъ ему дать проносное подъ №. 5. 14. упомянутое, которое на слѣдующій или на третій день должно ли повторить или нѣтъ? покажутъ припадки; или вмѣсто сихъ давать лекарства подъ №. 11. 39. 139. 141. означенныя, пока довольно очистишь шлѣ, болѣзнь сдѣлается полегче.

Еслижъ больные не могутъ въ довольномъ количествѣ глотать сихъ лекарствъ.

карствъ, но должно имъ чаще ставить промывательныя для очищенія.

Снаружи всю шею надлежитъ обложить теплыми и смягчительными густыми припарками и велѣнь полоскать ротъ смягчительными отварами подъ №. 40. 38. предписанными до тѣхъ поръ, пока въ зевѣ пересыханетъ сохнуть, болѣнь и сверхъ сего долженъ онъ, разинувъ ротъ, сидѣть надъ паромъ горячей воды; а еслили воспаленныя части покрывы густою слизию, то полоскать чаще легкимъ полосканьемъ подъ №. 8. или помощію насоса впрскивать ему въ ротъ подобный отваръ.

Еслили все сіе употребивъ, воспаленіе уменьшился, больной спанетъ по свободнѣе глотать, то упомянутыя смягчительныя прохлаждающіе лекарства надлежитъ продолжать, пока болѣзнь совсѣмъ прекратится; а въ вечеру вмѣсто смягчительныхъ припарокъ прикладывать къ шѣ зеленой смягчительной пластырь приготовленный изъ буркуна или донной шравы (*emplastrum de melliloto*).

Но еслили такой способъ леченія ничего желаемого не произведетъ, воспаление не уменьшается, глотать трудно и хотя крови уже довольно выпущено и употреблено много проносныхъ лекарствъ, однако боль и беспокойство въ горлѣ продолжается, то надлежитъ обложить всю шею крѣпкими густыми припарками; черное

Часть I.

Ж

мыло

мыло разваренное въ водѣ на подобіе густой каши приложенное къ шеѣ скоро и хорошо дѣйствуетъ, подобное сему дѣйствие имѣетъ и квашеное пѣсто или пѣсцо смѣшанное съ полченою горчицею подѣ №. 291 означенное.

Еспльиждѣ сѣи средства въ суточное время не окажутъ желаемыхъ дѣйствій, то должно тотъ часъ къ шеѣ приложить нарывной пластырь, коимъ доспавляетъ больнымъ великое облегченіе, ибо какъ только сей пластырь начнетъ тянуть мащерію и поднимать верхнюю кожу, то глотаніе становившагося гораздо легче прежняго.

Иногда случается, что съ начала болѣзни не только глотать трудно и больно, но еще не лѣзя свободно дышать, больной въ то время находящійся въ великой опасности, которая еще болѣе умножается, потому что больные все то, что ни силятся проглотить, принуждены бывающіе выбросить чрезъ носъ или опять ртомъ; симъ больнымъ внутренними лекарствомъ не лѣзя пособить, онѣ чего у нихъ вдругъ синѣетъ и краснѣетъ лице, глаза выкатывающіеся и часто распухнутой языкъ виситъ изъ рта.

Въ семъ случаѣ тотъ часъ должно пустить больному много крови и повторять сѣе чрезъ часъ столько разъ, сколько силы его могутъ снести, также наставлявшъ ему чаще промывашельныя

и прикладывать густыя мягчительныя припарки, вѣлѣнь держать горло разинувъ ротъ надъ паромъ горячей воды; и приспавливать ему къ шеѣ и къ другимъ мѣстамъ воздушныя банки. Но еслили все сѣе употребивъ въ двенадцать часовъ не почувствуешь больной никакого облегченія, то ни мало не медля шопчасъ должно положить во кругъ шеи нарывной пластырь, которой многимъ доспавляетъ великую пользу. А какъ скоро больной получишь свободу чпо нибудь глотать, то надлежитъ опять ему давать въ довольномъ количествѣ вышеупомянутыя лекарства.

Еслилижъ нарывной пластырь неспдѣлаешь никакого пособія, то должно опасаться, чпо бы больной не задушился; въ такомъ опасномъ случаѣ почти нѣтъ ни одного средства избавить больного отъ предспоящей смерти, кромѣ искусственнаго прорѣзанія дыхательнаго горла, (tracheothomia) которое сколько можно скорѣе надобно сдѣлать, дабы такимъ образомъ пособить больному въ его дыханіи.

Воспаленіе, еслили отъ употребленныхъ средствъ заблаговременно не пройдешь, очень часно превращается въ нагноеніе; а когда оно уже до сего дошло и нѣтъ крайней нужды въ кровопусканіи, то больше крови не должно ему пускать, дабы силъ его, которыя нужны для приведенія въ созрѣніе загноеннаго мѣста, не

учинить чрезъ по слабыми. И шакъ въ сѣ время не должно давати никакихъ средствъ для испраженія изъ человѣка кихъ либо жидкостей, а употреблять только смягчительные опвары, которые больной долженъ теплые въ роту держати, а снаружи прикладывать смягчительныя гущыя припарки. Ибо нагноеніе сими средствами скорѣе совершается, и шакъ еспѣли примѣчено буденъ, что уже въ нѣкопторомъ мѣшечкѣ собралось гною довольное количество, однако шакъ мѣшечекъ самъ собою не прорывается, по должно оной прорѣзать искусно.

По отвореніи сего нарыва больные чувствуютъ въ себѣ великое облегченіе и часно безпрестанно уже глотаютъ, однако должно разсмотрѣть, хорошаго ли свойства выпущенная матерія или сдѣалась уже оспрою и вонючею: когда матерія хороша, по рана легко заживетъ, только больной долженъ полоскати ротъ опваромъ подъ №. 57. или впускати оной въ горло помощію насоса.

А еспѣли гной оспрый, имѣетъ дурной цвѣтъ и опврашительной запахъ, еспѣли части, на которыхъ было прежде воспаленіе, кажутся очень шемны и почернѣлы, по шакія ранки пошъ часъ должно пользоваться лекарствами очищающими и противящимися гнилости подъ №. 58. 59. предписанными, при томъ смотрѣть не обвѣдены ли и повреждены уже бли-

ближайшія часши или сильная оспрота не подѣлала ли ямокъ или пазухъ и рытйковъ (fistula.)

Обѣденныя околичныя часши должно опять очистишь и заживишь лекарснвами подѣ No. 58. 59. означенными.

Естьлижъ сія манерія между подѣ лежащими часшиями уже засѣла, то надлежишь опасаться многихъ худыхъ слѣдствій, но можно легко пособишь и цаспливо вылечишь, еснъли она къ наружной поверьхности шеи пробираясь открываснсь себѣ выходѣ; а еснъли она пробирается ко внупреннимъ часшиямъ глубоко лежащимъ къ желудку или къ дыхательному горлу или къ легкимъ, то больного прудно вылечишь, особливо когда ни наружными лекарснвами ни руками не лзя къ симъ мѣснамъ доспуишь, ибо внупреннія лекарснва по большей части не много могушь пособишь, однако въ сихъ случаяхъ лекарснва для промыванія ранъ подѣ No. 59. означенныя и лекарснва подѣ No. 60. 61. находящіяся великое дѣйснвіе производяшь, такъже можно впускашь насосомъ лекарснво подѣ No. 61. предписанное.

Настоящее и безѣ гнили воспаленіе во рпѣ случающееся, хотя бываетъ сильно и опасно, но рѣдко переходитъ въ аншоновъ огонь.

Однако весьма часто случается, что бываютъ злыя жабы или воспаленія въ горлѣ, кошорыя по большей части зани-

мають полько поверхность пищепріемнаго горла, не производящъ столь великой и стугой опухоли, какъ тихая жаба, ибо въ оныхъ боль бываетъ болѣе соединенна съ жаромъ, нежели съ колошемъ, цвѣтъ на частяхъ одержимыхъ воспаленіемъ очень красный или темнованный и рѣдко вездѣ одинаковыи, но только показываетъ пятна или красныя полосы, глотаніе съ начала бываетъ не очень трудно и бѣніе жилъ не много различествуетъ отъ здороваго, шакія больныя жалуются на расслабленіе въ сосудахъ, шажестъ въ головѣ и имѣютъ нѣкоторую небольшую жажду.

По большей части спраждушъ такою жабою люди, кошорые имѣютъ кровь къ гнилоспи склонную и зараженную цынгопною оспрошою.

Еслии такія воспаленія очень злыя, то вскорѣ перемѣняющъ свой цвѣтъ въ черносиней, оказывающъ то въ томъ то въ другомъ мѣстѣ пузырьки различной величины съ сукровицею, кошорыя въ скоромъ времени обратившись въ раны обѣдающъ околичныя части, причиняющъ сильной жаръ въ пищепріемномъ горлѣ, желудкѣ и подъ грудною косшею, отъ чего сїи больныя дыханіемъ издаютъ вонючій запахъ.

Иногда сїи раны покрываются струпомъ багроваго цвѣта, вырастающъ на нихъ дикое мясо, кошорое очень красно и чер-
но-

новато, на концѣ такія раны часто обмешиваются всю небную завѣсу, языкъ, десны и обѣдаются весь ротъ, отъ чего очень трудно и чрезвычайно больно глотать; иногда кожа покрывающая внутреннюю поверхность рта во все согнивши слизишь, отъ сихъ припадковъ больной совсѣмъ ослабѣваетъ, бѣненіе жилъ спавшиися мягкое и слабое, приваливаетъ къ сердцу шоска и часто смерть очень въ короткое время полагаетъ всему концѣ.

Сей родъ воспаленія въ горлѣ не иначе какъ и гнилые лихорадки пребываетъ въ кровоупусканіи великой осипорожности, шакже не должно давать проносныхъ лекарствъ, наславливать промывашельныхъ, развѣ только въ шо время, когда крайняя нужда того шребуешь, дабы шакимъ образомъ не привесши больнаго въ чрезвычайную слабость. Но помощію лекарствъ крѣпительныхъ и сопротивляющихся гнилости, копорыя предписаны въ гнилыхъ лихорадкахъ, должно препяшествовать дальнѣйшему поврежденію и поддерживанію силы.

Въ семъ случаѣ часто бывающіе вредны всѣ смягчительныя полоскапельныя лекарства, а вмѣсто ихъ употреблять должно слегка холодительныя и разбивающія какъ подъ No. 62. 63. показано. А еслили находятся пятна очень красныя или черносинія, шо должно оныя чаще мазать слегка острымъ и очищающимъ лекарствомъ, какое подъ No. 64. видѣшь мож-

но, также лекарства подѣ №. 64. 65. означенныя весьма пользуясь, когда оказывающіяся раны, дикое мясо, багровой струи; есѣли сѣ ранки будѣтъ очень болѣе и рѣе по должно оныя мазать лекарствами подѣ №. 66. и 67. предписанными.

Часто случается видѣтъ одни маленькія ранки, которыя по срединѣ бывающѣ бѣлы, вокругѣ красны, таковыя есѣли случаются у крѣпкаго сложенія людей, то не очень опасны и легко или сами собою пропадѣтъ или испребляющіяся лекарствами подѣ №. 57. 63. 64. означенными.

Но у шѣхъ людей, у которыхъ уже кровь напоенна оспроною, бывающѣ часто очень злыя или опасныя, заражающѣ зевы и большую часть рта, и такѣ распространяющіяся, что весь языкѣ, внутренняя воверхность щекѣ и зевы подергиваются шероховатую и бѣлою плѣвою; въ сѣхъ обстоятельствѣхъ весьма пользуясь лекарства подѣ №. 62. и 63. означенныя, изѣ которыхъ послѣднее очень размягчающѣ, есѣли его нѣсколько времени держанъ теплое въ роту или онымѣ мыть и полоскать ротѣ.

Есѣли сѣ бѣлая плѣва очень крѣпка или у больного изѣ рта весьма дурно пахнѣтъ и являющіяся на разныхъ мѣстахъ темныя или черноватыя пятна или полоски, то должно употреблять лекарства подѣ №. 64. и 65. показанныя, а внутрь
при-

принимать отваръ изъ корки перуанской подѣ №. 70. предписанный.

Какъ скоро сія плѣва спанетъ долой сходитъ, вонючей запахъ уменьшатся, пияна шемныя, синія проходятъ и исподняя часть ранокъ краснѣтъ, но лекарствъ подѣ №. 64. 65. находящихся еще не лзя употреблять безъ ощущенія боли и жару, по вмѣсто сихъ полезно употреблять лекарства подѣ №. 66. 67. 69. написанныя. Однако надлежитъ долгое время употреблять, въ разсужденіи припадковъ, либо сіи либо выше предписанныя лекарства; и при употребленіи сихъ лекарствъ пить отваръ подѣ №. 70. означенный, пока больной получишь довольныя силы и болѣе не будешь видно у него въ роту никакой гнилости или показывающаго анпоновъ огонь.

По излеченіи болѣзни весьма полезно употреблять чрезъ долгое время лекарства подѣ №. 68. 69. или 45. означенныя для предохраненія отъ преждебывшей опасности.

Иногда зевъ распухаетъ водяною и холодною или мокротною опухолью, отъ чего глотаніе также дѣлается очень трудно, но такая жаба рѣдко бываетъ соединенна съ лихорадкою и больные не мучатся жаждою. Въ семъ случаѣ приличны разбивающіе отвары подѣ №. 17. 18. 21. предписанные или лекарства мочегонительныя подѣ №. 71. 72. также лекарства про-

носныя подѣ №. 4. 5. 14. означенныя. А для полосканья рта полезны лекарства подѣ №. 71. 21. 35. означенныя; снаружѣ шеѣ должно прикладывать мѣшечки сшитые съ бобовою мукою, бузиновыми цвѣтками и нѣкоторою часпю канфоры.

Естьлижѣ сїи лекарства въ скоромѣ времени не сдѣлаюшѣ надлежащаго облегченїя, то должно на зашылокѣ или всю шею положишѣ нарывной пластырь.

Часто сїи водяныя и холодныя опухоли такѣ бываюшѣ велики, что больной не только глотать но и дышать свободно не можетѣ. Въ такихѣ обстоятельствахъ должно на сихъ опухоляхъ сдѣлать насѣканїе, (Scarificatio) и чтобы больной нечаянно не задушился, положишѣ во всю шею нарывной пластырь.

Часто послѣ воспалительной и мокрощной жабы, желѣзы называемые миндальныя или желѣзы шейныя распухаюшѣ и зашвердѣваюшѣ; такая ихъ зашвердѣлость естьли несовсѣмѣ пренеприятна, но по крайней мѣрѣ дѣлаетѣ глотанїе труднымъ: въ семѣ случаѣ лекарство подѣ №. 59. означенное, есшѣли его теплое въ роту чаще держать и сверхѣ сего долгое время употребляшѣ внутрь лекарства подѣ №. 49. 91. предписанныя иногда дѣлаюшѣ облегченїе а иногда и совершенно вылечить, однако должно избѣгать всѣхъ острыхъ и ѣдкихъ лекарствъ; ибо они

раздражаютъ сїи затвердѣнія и подають поводъ открыться ранѣ.

Глубокія затвердѣнія или очень большія, копорыя весьма часто дѣлають препящивіе не только въ глотаніи но и въ дыханіи, гораздо съ большею соединенныю опасностію. Въ семъ случаѣ тѣже самыя лекарства должно употреблять какія были прежде употребляемы съ желаннымъ успѣхомъ.

У мушинъ подверженныхъ ипохондріи и женщинъ одержимыхъ мапочною немощію часто зевъ шакъ крѣпко сжимается, что они у себя въ томъ мѣстѣ чувствуютъ какъ бы нѣкоторый шаръ, копорый препящиваетъ имъ глотаніе и дыханіе. Всѣ сїи припадки рождаются отъ судорогъ, и еслили дать такимъ людямъ понюхать что нибудь вонючее какъ шо, прижженое перо, копышы, рога животныхъ, бобровую струю, спиртъ изъ оленьяго рогу, дурной духъ, (*asa foetida*) спиртъ напашырной, шо они выпускають опрыжкою нѣкоторые выпры и получаютъ свободу въ глотаніи и въ дыханіи и мнимой шаръ, копорой они чувствовали въ зѣянїяхъ, потѣ часъ пропадаетъ, однако сей припадокъ часто опять приходитъ къ больнымъ.

И шакъ по оплущеніи такихъ припадковъ должно давать больнымъ лекарства, копорыя бы не допускали бвдущихъ припадковъ; въ сихъ обстоятельствевахъ много пользуют пилули подъ
No.

№. 73. предписанные, а естѣли такіе больные очень слабы и судороги производящѣ опѣ слабости чувственныхъ жилъ, то надлежитъ давати долгое время лекарства подѣ №. 74. 75. означенныя.

Часто бываетъ, что въ зевѣ приключается параличъ, тогда сѣ больные не только не могутъ глотати, но и все то что ни примутъ, принуждены выкинуть опять ршомъ или чрезъ носъ.

Случай сей бываетъ очень опасный и часно смертельный, однако нѣкоторыя употребленіемъ приспосабливаемыхъ лекарствъ вылечиваются.

Многокровнымъ опѣ часъ надлежитъ пустиши кровь и въ разсужденіи ихъ силъ опятъ повѣпоритъ, а естѣли больной не многокровенъ, то кровопусканіе ему вредитъ. Однако требуется, чтобы посредствомъ частыхъ промывательныхъ очистити кишки и выгнати испражненіе. Сіе сдѣлавъ, должно впускати сеюжъ самую дорогою лекарства и пищу. И такъ чрезъ часъ должно наставляти промывательныя составленныя то изъ лекарства то изъ вещей питательныхъ, но сіе приготовленіе для промывательныхъ должно состояти въ маломъ количествѣ и не болѣе шести унцовъ, дабы долговремениѣе удержась въ шѣлѣ, лучше и больше возшло въ оное всасывающими жилками. Для кормленія больного промывательныя приготовляющіяся изъ мясной хорошей похлебки,

ки, изъ молока смѣшаннаго съ яичнымъ желткомъ, овсяной жидкой кашицы, ячной, изъ сорочинскаго пшена и проч. а для леченія полезны лекарсва подъ No. 76. 77. означенныя.

При томъ прикладывать къ шеѣ тѣсно смѣшанное съ горчицею подъ No. 291. или вмѣсто онаго нарывной пластырь, а языкъ особливо небную завѣсу чаще мазать лекарствомъ подъ No. 78. предписаннымъ.

Случается, что помощію сего способа глотаніе въ два или три дни спановишься нѣсколько полегче, въ то время больной можетъ принимать ртомъ какъ лекарство такъ и пищу, только въ маломъ количествѣ, однако между тѣмъ должно наставляванъ и промывательныя.

Кромѣ приличной пищи должно больному черезъ часъ давать по одной или по двѣ ложки лекарсва подъ No. 17. 18. 19. 22. 25. означеннаго, и когда послѣ сего больной спанетъ свободнѣе глотать, то наставляванъ ему промывательныя такъ часто не надобно, понеже онъ уже можетъ принимать лекарсва въ большемъ количествѣ обыкновеннымъ образомъ.

Еслилижъ глотаніе уже сдѣлалось во вся свободнымъ, то промывательныя надлежитъ совсѣмъ оставить, а давать пилюли подъ No. 75. предписанныя. Еслили такіе больные тѣломъ очень слабы; при томъ имѣющъ слабыя чувствемныя жилы, то

то чрезвычайно имъ пользуютъ лекарства подѣ №. 74. 75. означенныя, посредствомъ которыхъ больные возвращаютъ свои силы и приходящѣ въ совершенное здоровье.

ГЛАВА IX.

О грудныхъ болѣзняхъ.

Грудными болѣзнями всѣ тѣ припад-
ки называются, которые или наружные
части и поверхность груди или внутрен-
ности въ грудной пустотѣ находящіяся
дѣлаютъ болѣзненными, и сихъ дѣйстви-
е приводящѣ въ безпорядокъ или повреж-
дающѣ.

Всѣ сїи болѣзни, особливо тѣ, кото-
рые занимающѣ внутреннія части, всегда
опасны, хотя нѣкоторыя изъ нихъ съ
начала едва бывающѣ примѣтны, и для
того больной, поелику такая болѣзнь едва
ему чувствительна, ни мало не спараясь
се лечишь, не употребляетъ никакихъ
лекарствъ, отъ чего случается, что та-
кая болѣзнь съ начала не узнающа; а
когда чрезъ усиливающіяся часъ отъ часу
припадки сдѣлаются извѣстны, то
уже къ излеченію бывающѣ трудны и весь-
ма часто причиняющѣ медленную и мучи-
тельную смерть.

По чему необходимо должно во вся-
кой болѣзни прилѣжно разсматривать со-
стоя-

стояніе легкихъ и дыханія; ибо естли сїи части ни чѣмъ не повреждены; больной свободно и легко дышетъ и втянутой воздухъ очень долго въ себѣ держитъ, при томъ безъ всякаго препятствія и трудности можетъ въ постѣли на оба бока ложиться и проч. То можно всегда ожидать хорошаго окончанія болѣзней.

А естли въ легкихъ или около ихъ лежащихъ частяхъ окажется какаянибудь чувствительность, то должно всемерно стараться, чтобъ сїю трудность сколько можно скорѣе отворачишь, или по крайней мѣрѣ препятствовать ей болѣе умножаться.

ГЛАВА X.

О колотьѣ въ груди или въ бокахъ.

Познается воспаленіе подреберной плевы, когда больной часто кашляетъ и чувствуетъ въ себѣ жаръ, при томъ жалуется, что онъ въ одномъ какомънибудь боку снаружи или внутри чувствуетъ колотье и боль, коюрая при каждомъ вдыханіи въ себя воздуха и когда онъ кашляетъ, умножается, а при выдыханіи изъ себя воздуха, уменьшается.

Сїя болѣзнь по большей части начинается съ нечаяннымъ ознобомъ, пономъ слѣдуетъ жаръ, жажда и жестокой ломъ
въ

въ головѣ, послѣ сего больной кашляетъ, и чувствуетъ то въ шей то въ другой половинѣ груди колюще и боль, однако не непрерывную, которая наконецъ въ одной половинѣ останавливается, усиливается и производитъ жажду и жаръ; языкъ, если посмотришь, находится сухъ и покрытъ бѣлою кожею: иногда въ то время голова болѣе пересыхаетъ, однако гораздо чаще въ одинакомъ состоянii пребываетъ, и когда больной спанетъ кашляетъ, еще больше умножается.

Если боль въ бокахъ очень сильна, то больные боясь вдыхать воздухъ и сколько можно удерживаются, чтобы не кашлять, отъ чего кровь чрезъ легкія не можетъ свободно проходить, дыханіе становится труднымъ, и на послѣдокъ начинается такой больной бѣдитъ; не рѣдко къ симъ припадкамъ присовокупляется воспаленіе легкихъ, которое ввергаетъ больного еще въ большую опасность. Когда скопилось въ легкомъ очень много крови, слѣдовательно ея обращеніе сдѣлалось крайне безпорядочнымъ, то бѣшеніе жилъ, которое прежде было полное, твердое и широкое, ощущается уже малое и слабое и въ такомъ состоянii жизнь больного подвергается великой опасности.

И такъ во время настоящаго воспаленія, въ легкомъ или колюща въ груди, дабы начать лечить надлежащимъ образомъ, то не должно медлить, но немедленно

житѣ всемѣрно стараться, чтобы худыя припадки не усиливались.

Такимѣ больнымѣ надлежитѣ совѣтовать быти спокойными, и смотря на припадки и соспоянне ихѣ тѣла поспѣе часѣ должно имѣ пуспити изѣ руки много крови, для сего по большей часи избирается рука того боку, въ копоромѣ боль находится, однако можно пуспити кровь изѣ руки противнаго боку или изѣ ноги.

Рѣдко одно кровоупущеніе бываетѣ въ соспоянніи отвратити такое зло, развѣ въ то время, когда колотье въ груди произошло отѣ многокровія или отѣ остано-вившагося теченія крови изѣ носу, либо отѣ умедлившаго теченія мѣсячныхѣ кровей либо почечуя. Въ то время отѣ одного кровоупущенія учиненнаго въ довольномѣ количествѣ очень часно какѣ лихорадка такѣ и боль прекращается.

Естьлижѣ кровь уже очень огустѣла, воспаление неподвижно занимаетѣ одно только мѣсто, боль жестокая и безпрерывная, биење жилѣ ощущается твердое и скрое, то должно кровь пускать въ немаломѣ количествѣ, копорое и съ самаго начала болѣзни, естьли великѣ крайняя нужда, надлежитѣ повторять черезѣ три, а по крайней мѣрѣ черезѣ четыре часа до тѣхѣ порѣ, пока жилы станутѣ биться тихо и боль уменьшится.

Однако должно всегда примѣчать, дабы пусканіемѣ крови, не привесити боль-

наго въ крайнюю слабость, ибо чрезъ сѣ болѣзнь можетъ сдѣлаться продолжительною или смертельную, естли опнимутся естественныя силы, потребныя для переработанія болѣзненной матеріи и для истребленія оной изъ тѣла.

И для того прежде нежели будетъ сдѣлано кровопущеніе должно всегда разсмотрѣть и испытать бѣеніе жилъ, припадки, естественныя силы, дабы по неосторожности не случилось чего худаго.

Внутри надлежитъ давать, какъ и во всякомъ другомъ воспаленіи смягчительныя, жидительныя и охлаждающія лекарства, какія подъ No. 1. 2. 6. 7. 8. 9. 13. 32. 40. показаны. Снаружи прикладывать часто къ больному мѣсту теплыя смягчительныя припарки, и чпобы не сдѣлался запоръ наснавливать пому подобныя промывательныя.

А естли примѣчено будетъ, что въ желудкѣ или въ кишкахъ много находится нечистоты, то послѣ кровопусканія тошъ часъ должно дать больному легкое проносное подъ No. 3. 5. 14. или какойнибудь отваръ изъ предписанныхъ подъ No. 11. 39. 141. Сѣ сдѣлавъ надлежитъ продолжать прежнія лекарства, пока лихорадка и боль утихнутъ, или во все прекратится, естли только въ сѣ самое время не случится чего новаго, которое требуетъ другихъ лекарствъ.

Боль

Боль съ колошьямъ по большей части околочешвернаго дня примѣнно утихаетъ, а на седьмой день во все переспадаетъ, и рѣдко продолжается болѣе одиннадцати дней.

Однако лихорадка продолжается иногда до седми, одиннадцати или четырнадцати дней и долѣе хопя уже не ощущается никакой боли.

Всѣ тѣлесныя изпраженія переломныя въ и переходныя сей болѣзни, такъ какъ и во всѣхъ прочихъ воспаленіяхъ и въ осприхъ горячкахъ могутъ служить облегченіемъ для больныхъ.

Въ самые первые дни болѣзни случившееся кровошеченіе изъ носу и печеніе почечуя, дѣлаетъ великое облегченіе, въ прочемъ для окончанія колошья въ бокахъ служаиъ способиѣишею дорогою легкіе и при томъ чрезъ выплевываніе мокроты.

Иногда боль въ боку утихаетъ, лихорадка или жаръ покидаетъ, и думаютъ, что болѣзнь уже кончилась; но спустя не много времени лихорадка опять оказывается и боль ощущается въ другомъ боку съ тою же или еще съ большею жестокостію.

Въ такомъ случаѣ больного надобно пользоваться тѣмъ же самымъ порядкомъ какъ бы болѣзнь еще только начиналась, и будиобъ прежде никакой не было.

Иногда съ самаго начала бываетъ кашель очень сухъ, мучительнъ и изнуряющій

ющій больного силы; но иногда въ началѣ появляется изъ рта харкотина съ показаніемъ хорошаго для больного знака. Ибо иногда болѣзнь рѣдко продолжается до седми дней; но часто на четвертой день оканчивается, особливо когда моча вытекаетъ мутная и имѣетъ въ низу у себя склизкую осадку.

Хотя лихорадка такъ скоро покидаетъ и боль во все переспаеніе, однако всегда больной еще нѣсколько кашляетъ и мокротная харкотина продолжается, чему въ то время должно споспѣшествовать лекарствами подъ №. 8. 32. 33. означенными.

Еслилижъ кашель съ начала очень сухъ и досаденъ, то болѣзнь долго не оканчивается, и по тому до тѣхъ поръ должно давать больному пить одни смягчительные отвары подъ №. 3. 40. 88. означенные, пока переспаеніе мучится сухимъ кашлемъ и жалованья, что кромѣ колотья и боли чувствуютъ еще въ груди жаръ; еслилижъ больной на третий или на четвертый день станетъ выхаркивать мокроту съ ощущеніемъ въ себѣ облегченія, то можно ожидать хорошаго окончанія болѣзни, особливо когда болѣзненная матерія начинаетъ вариться или какъ бы созрѣвать, дѣлается подвижною и къ выхаркиванію способною.

Ничего не должно опасаться и не почитать за худой знакъ когда съ самаго на-

начала выходитъ изъ рта харкотина, на которой видны кровавыя полоски, что весьма часто, и всегда почти съ пользою больного случается. Почему очень худо поступитъ кпо изъ сей одной, а не изъ другой какой понуждающей причины заключитъ, что должно больному опить пускать кровь, и больны еще худшею сдѣлается, еслили смотря на сіи кровавыя полоски сначеиъ употребляетъ сушишельныя и вяжущія лекарства.

Всякая харкотина, которая выходитъ изъ рта, еслили облегчается больны, всегда считается полезною и спасительною.

Еслили примѣчено будетъ изъ кокошательнаго кашля, что харкота, хотя находяиъ въ довольноиъ количествѣ, но съ трудностію выходитъ, то во первыхъ должно давать лекарства подѣ №. 33. и 34. означенныя. Еслилижъ сіи мало дѣйствуютъ, и по причинѣ великаго количества мокроты, которая должна выйти вонъ, больной тяжело дышетъ, то сверхъ оныхъ лекарствъ должно къ икрамъ привязать нарывной пластырь, также весьма полезно, еслили больной, обмочивъ грецкую губку въ теплую воду смѣшанную по поламъ съ уксусомъ и приложивъ къ носу и къ рту, будетъ въ себя втягивать изъ оной паръ.

Иногда очень мало выходитъ харкотины, но вмѣсто сего случается легкой поносъ, которымъ испражняется матерія

склизкая, желчная и худого запаха, или выходящѣ очень много мочи, которая съ низу имѣетъ гноеподобную осадку, чрезъ что не рѣдко болѣзнь безъ выплевыванія многой харкопины вылечивается.

И по тому очень часто случается, что такая болѣзнь не только чрезъ выходеніе харкопины; но мочею и низомъ уменьшается и благополучно оканчивается, тогда больной по большей части скорѣе выздоравливаетъ, и нѣтъ причины бояться возвращенія преждебывшей болѣзни.

Естьлижѣ выпустивъ довольно крови и употребивъ какъ внутреннія такъ и внѣшнія лекарства, кашель ни мало ни унимается, которой больному ни днемъ ни ночью не даетъ покою и приводитъ его въ великую слабость, то должно въ промежуткахъ выше объявленныхъ лекарствъ давать довольно количество лекарствъ боль и кашель унимающихъ; какія подъ No. 80. 81. 82. видѣть можно. Сіи самыя лекарства должно давать въ вечеру, ибо хотя днемъ много выходитъ харкопы, но ночью сдѣлавшись кашель сухимъ не даетъ больному спать, то часто сіи лекарства ни мало не пользуютъ и для того лучше больному давать въ вечеру въ одинъ разъ довольно тѣхъ лекарствъ, какія подъ No. 83. 84. 85. предписаны, сей способъ доставляетъ спокойствіе на нѣсколько часовъ, въ которое боль-

больной пріобрѣтаетъ силы, а между тѣмъ харкота дѣлается способнѣею въ выхожденію и на слѣдующей день легко выходитъ.

Если послѣ учиненныхъ въ первые три или чепыры дни сряду кровопусканій, послѣ холодительныхъ и разводящихъ лекарствъ лихорадка и жаръ уменьшаются, однако боль ни мало не упихаетъ, то должно къ больному боку приложить нарывной пластырь, которой не рѣдко дѣлаетъ весьма великое облегченіе.

Иногда воспаленіе такъ бываетъ упорно, что не лзя онаго ни наружными ни внутренними лекарствами разогнать, ни болѣзненная матерія не можетъ обратиться въ хорошую харкотину, и вышши вонъ изъ пѣла ни чрезъ какія тѣлесныя испраженія случающіяся въ переломные дни болѣзни, и по тому надлежитъ опасаться, дабы воспаленіе обратившись въ нагноеніе не произвело въ груди нарыву.

Воспаленіе переходящее въ нагноеніе познается изъ слѣдующихъ признаковъ: когда лекарства прежде употребленные или ничего не пользуютъ или очень мало, когда время, въ которое воспаленіе должно разойтись, уже прошло, когда боль нѣсколько сильнѣе спановится, и лихорадка въ вечеру съ легкимъ ознобомъ или дергошою увеличивается, когда больной днемъ часто чувствуетъ

въ себѣ ознобѣ и имѣетъ большую обыкновеннаго жажду, на губахъ у него и щекахъ перемѣняется краска, языкъ сухъ, великая жажда, частой кашель, и неспокойной сонъ, по томъ бросаетъ больного въ потъ, который приводитъ его въ большее прежняго расслабленіе.

Какъ только сіи знаки примѣчены будутъ, то больного не должно приводить въ слабость ни кровопусканіями ни другими выпущеніями изъ него жидкостей, дабы симъ не препятствовало излеченію, которому надлежитъ способствовать внутренними смягчительными лекарствами и тому подобными припарками.

Часто сіе имѣетъ столь счастливое дѣйствіе, что не только харкотина хорошо переработанная и гною подобная выходитъ, но и тоска, лихорадка, потъ и другіе припадки прекращаются и больной чувствуетъ великое и скорое облегченіе; тогда можно надѣяться, что сей нарывъ чрезъ харкотину скоро очистишься, и для того должно еще продолжать смягчительныя лекарства.

Если кромѣ сего выходитъ много мочы гноевой маперіи, которая тогда часъ отсѣдаетъ, или если случится легкій и кашель облегчающій поносъ, то должно вѣрно ожидать, что сими шѣльными извращеніями болѣзнь въ скоромъ времени прекратится.

Въ

Въ вечеру всегда должно больному давать одно изъ предписанныхъ подѣ №. 83. 84. 85. лекарствъ, особливо естѣли онѣ по причинѣ частаго кашля немогутъ спать.

Когда харкота начнетъ по малу уменьшаться, лихорадка и поинѣ утихаетъ, температура по немногу убавляется, сонѣ и позывъ на бѣду возвращается и силы больного возобновляются, то больной въ скоромъ времени выздоровѣетъ, слѣдовательно нѣтъ никакой причины, по которой бы должно перемѣнять лекарства.

Естѣлижѣ послѣ того какъ уже достаточное количество гноя вышло, кашель еще продолжается сухъ и спречотенъ, то должно давать прежнія лекарства подѣ №. 80. 81. 82. или лекарства подѣ №. 86. предписанныя, которыя скорѣе унявъ кашель могутъ залечить оставшіяся еще ранки.

Естѣлижѣ послѣ оказавшихся знаковъ нагноенія не послѣдуетъ никакой харкоты и лихорадка въ вечеру еще больше усиливается, больной ночью очень потѣенъ и вовсе не можетъ лежать на здоровомъ боку или по крайнѣй мѣрѣ съ великою трудностію, мучимся сухимъ и жестокимъ кашлемъ, то сіе показываетъ, что гной содержится въ зашворенномъ мѣспечкѣ и непрестанно въ своемъ количествѣ умножается.

Естѣли мѣсто, въ которомъ находится нарывъ, будетъ извѣстно, то для се-

го другаго средства не сыскивается, какъ только сей самой нарывъ по правиламъ искусства разрѣзать и отворить, естли только оной занимаетъ такое мѣсто, въ которомъ лекарская рука можетъ удобно и безопасно дѣйствовать.

Естли сїя операція въ скоромъ времени не будетъ учинена, то гноевой нарывъ безпрестанно возрастая, сдѣлаетъ дыханіе труднымъ, и гной обѣдая ближайшія часни приведетъ больного въ великую слабость и изсушеніе, и на конецъ смѣшавшись съ кровью приключитъ сухопную лихорадку, которая навсегда останется неизлечимою.

Естлижъ нарывъ въ такомъ мѣстѣ находится, гдѣ искусной лекаръ не можетъ свободно онаго отворить, или больной, чшобы сїе надъ нимъ учинено было, не допускаетъ ни коимъ образомъ, то должно къ сему мѣсту или къ ближайшимъ частямъ, естли соспояніе частей не препятствуетъ, положить разводительное лекарство, или на сихъ частяхъ занянуъ заволоку, (*fetaceum*) дабы такимъ образомъ отвлечь гной къ наружнымъ частямъ; но сїи средства не такъ дѣйствительны и не такъ безопасны, какъ прорѣзаніе, особливо когда гной содержится глубоко въ пустотѣ грудной.

Однако иногда примѣчается опухоль на наружной поверхности груди и содержащійся въ ней гной самъ собою силится

ВЫИТЪ.

вышпи, то такую опухоль, естли она произвольно или опѣ гусныхъ мягчительныхъ и спрекошныхъ припарокъ къ ней прикладываемыхъ не прорывается, должно прорѣзать, куда надлежитъ впускать очистишельныя лекарства помощію насоса и больному давать много пить раны очищашельныхъ и завлекашельныхъ лекарствъ подѣ No. 86. предписанныхъ, дабы симъ способомъ оянь залечить сдѣланную рану.

Когда изъ прорвавшася нарыва, гной вышечетъ въ пустопу грудную, то сіе познается изъ особливаго внушренняго чувствованія, какое больной имѣетъ, при которомъ онъ всегда почти приходитъ въ обморокъ, послѣ сего перестаетъ шоска и лихорадка покидаетъ, кашель утихаетъ и больной чувствуетъ въ себѣ великое облегченіе, но сіе облегченіе не на долгое время, ибо всякой день гной умножается, кашель, шоска, жаръ, и лихорадка оянь увеличиваются, больной опѣ шоски не можетъ лежать, и по тому часто принужденъ бываетъ сидѣть внѣ постели и сидя спать, и естли пріиметъ онъ какую нибудь пищу и питье, то начинаетъ шакъ шосковать и мучиться, что на лицѣ у него, на головѣ и на груди выступаетъ сильной потъ, ночью беспокоится и не спитъ, въ вечеру чувствуетъ ознобъ и содраганіе, по шомъ бросаетъ его въ сильной жаръ, подошвы у него и ладони горятъ и чрезвычайно сухи, а около

пол.

полночи, когда пройдетъ жаръ, больной будучи слабъ очень потѣетъ, который, естли сихъ припадковъ не лечить, по малу изсыхаетъ, на послѣдокъ у него ноги и все тѣло опухнетъ, по томъ сдѣлавшись поносъ, прекращаетъ его жизнь.

Какъ только примѣчено будетъ, что нарывъ уже прорвался въ пусишу грудную, то ни мало не медля должно сдѣлать ему операцію *прободеніе* и отсюда выпустить гной.

Иногда случается, что въ колотьѣ боковъ, хотя находясь всѣ знаки начинающагося нагноенія, больные жалуются на особливую тоску и стѣсненіе въ груди, отъ чего дыханіе примѣнно становится труднымъ, выпускаютъ мочу сырую, лоѣ и шея у нихъ очень потѣетъ, и непрерывно по немногу кашляютъ, и спустя не много времени высыпаетъ у нихъ повсему тѣлу прыщевая или пшену подобная сыпь отъ чего всѣ прежніе худые припадки уменьшаются или во вся пропадаютъ, изъ сего слѣдуетъ, что никогда не можно по-длинно утвердить о будущемъ нагноеніи хотя съ начала всѣ знаки онаго будутъ находиться.

Такая прыщевая сыпь весьма часто случается въ то время, когда колотьѣ въ бокахъ съ ломошною лихорадкою соединятся, или съ ломомъ въ соснавахъ.

Однако естли во время сей сыпи, харкотинна изъ рта пойдетъ, то больнои
очень

очень скоро выздоровѣетъ и получитъ свои прежнія силы.

Однако по причинѣ сей сыпи не должно ни малѣйше перемѣнять прежняго порядка въ леченіи, но прилѣжно продолжая тѣ же самыя лекарства, коимъ до сихъ поръ пользовали; а естли больной не имѣетъ довольныхъ силъ, дабы у него такая сыпь могла легко выступить на поверхность тѣла, то кромѣ прежнихъ должно ему давать и легкія укрѣплятельныя, какія были употребляемы въ горячкахъ и въ гнилыхъ лихорадкахъ.

Впрочемъ когда прыщевая сыпь высыпаетъ безъ уменьшенія припадковъ, то показывается худое предвѣщаніе, особливо естли больные много поимѣютъ, очень слабы, или начинаютъ говорить вздоръ. Во время сихъ припадковъ не рѣдко приключается антоновъ огонь и на послѣдокъ смерть.

Такая худого свойства сыпь весьма часто случается, когда болѣзнь при началѣ была оспавлена въ небреженіи, или больной былъ пользованъ горячительными лекарствами и содержанъ въ неумѣренной теплотѣ.

Въ колотѣ боковъ всегда почти должно опасаться антонова огня, когда воспаленіе очень жестокое, и нѣтъ никакого пособія отъ самыхъ дѣйствительныхъ лекарствъ, особливо естли кровь уже напоена какою нибудь острою.

Когда

Когда приближается аншоновъ огонь, то должно такимъ образомъ поступить, какъ сказано въ своемъ мѣстѣ о жабѣ соединенной съ аншоновымъ огнемъ.

Однако въ семъ случаѣ всѣ лекарства по большой часпи бывають не дѣйстви-тельны и слѣдуетъ неизбѣжная смерть.

ГЛАВА XI.

О воспаленіи въ самомъ легкомъ.

Воспаленіе легкихъ есть болѣзнь очень опасная, кошорая всегда почти приключается въ людяхъ многокровныхъ и бываетъ по большей часпи въ исходѣ осени, зимою или весною, весьма часто раждается отъ жестокаго и вдругъ дѣлающагося мороза.

Познается сія болѣзнь, когда больной послѣ чувствуемаго подиранія по кожѣ и за онымъ непосредственно слѣдующаго жара, часпи кашляетъ, отъ тоски и стѣсненія въ груди трудно дышетъ, жалуется на жажду, жаръ, тяжелость въ головѣ и нѣкошорой обморокъ, иногда бредитъ, лице по большей части имѣетъ красное, дыханіе горячее, языкъ сухой, и выпускаетъ мочу огненнаго цвѣту.

Такіе больные очень часпи чувствуютъ давленіе въ груди особливо подъ ложкою, кошорое по испущеніи опрыжки или иныхъ вѣтровъ иногда уменьшается; но не

не много спустя времени опять возвращается и продолжается непрерывно.

Такая перемежная часто обманываетъ больныхъ, особливо когда воспаленіе съ начала будучи слабое не очень жестоко ихъ мучишь и не приводитъ въ великую слабость, такъ что они по своему легко-вѣрію приписываютъ все зло спершимся внутрь вѣспрамъ и болѣзнь за малое почитаютъ, а что болѣе еще вредишь, принимаютъ горячительныя лекарства разбивающія вѣпры; такимъ образомъ умножая болѣзнь, и приводя воспаленіе въ большую жестокость, не рѣдко бывають сами причиною своей смерти.

При началѣ воспаленія въ легкомъ бѣеніе жилъ всегда почти ощущается скорое полное и твердое, а когда начнешь воспа-леніе усиливаться, и повреждаться многія части легкаго, то приходитъ на больного великая тоска и кровь не въ состояніи будучи свободно проходитьъ чрезъ легкіе сгущается и не имѣетъ никакого движенія, и только тончайшая ея часть, коюрая отъ огустѣлой крови осталась печенъ по прочимъ внутреннимъ частямъ шѣла. Слѣдовательно чѣмъ тѣруднѣе кровь проходитъ чрезъ легкіе, тѣмъ бѣеніе въ жилахъ становится меньшее и слабѣе, и тѣмъ больной подвергается большей опасности.

Изъ сего слѣдуетъ, что воспаленіе легкаго можетъ въ короткое время ошнать у больного жизнь.

Вос-

Воспаленіе въ легкомъ не возбуждаетъ никакой жестокой боли, а когда больные и чувствующъ нѣкоторую, то она по большей части бываетъ скрытная, которая болѣе причиняетъ стѣсненіе въ груди и раждаетъ тоску, какая случается во время колошья въ бокахъ, и для того сіи больные не очень много беспокоятся, однако должно прилѣжно испытать свойства частей одержимыхъ воспаленіемъ и рассмотретьъ происходящую отъ того опасность.

Еслили при первыхъ дняхъ болѣзни, кашель очень сухъ, досаденъ и приводящій въ изнеможеніе, то можно вѣрно догадываться, что болѣзнь будетъ опасна и на долгое время продолжится.

Къ леченію сей болѣзни тѣ же средства могутъ быть употреблены, какія предписаны были о колошѣ въ бокахъ, въ прошчемъ для лучшей безопасности надлежитъ сему больному топъ часъ съ начала пустить кровь, хотя воспаленіе не очень сильное и припадки не очень жестокие находятся; ибо часно воспаленіе, не имѣя явныхъ тяжелыхъ знаковъ, въ короткое время очень усиливается и ославляетъ по себѣ на долго худыя слѣдствія, которыя бы легко можно было опровергнуть однимъ кровопусканіемъ въ началѣ болѣзни учиненнымъ.

Такіе припадки часто случаются, когда послѣ скорого бѣганія, танцованья, верь-

верховой ѣзды на лошади, и послѣ сильныхъ душевныхъ возмущеній, шѣло чрезвычайно разгорячится и вдругъ по не оспорносно проснудится, или ссѣли въ великомъ жару шѣла, человекъ поѣстѣ или напѣсѣ чего нибудь студенаго; онѣ чего часно больные безпресшанно слегка кашляющѣ, однако не чувснвующѣ въ себѣ никакого особливаго безпокойснва, при томѣ имѣющѣ бѣеніе въ жилахъ порядочное и надлежащія силы; и для шого сѣ небольшой кашель за ничто считающѣ, надѣясь, что онѣ въ скорости проидѣшѣ, хотя въ такой своей надеждѣ иногда и не обманываются, однако оной по большей часи долгое время ихъ безпокоинѣ, на конецѣ снвановинѣ сильнѣишимѣ, дыханіе у нихъ часѣ онѣ часу дѣлаенѣ шруднымѣ, не могутѣ ночью спокойно спать, шеряющѣ позывѣ на ѣду, въ вечеру ощущающѣ въ своемѣ шѣлѣ легкой ознобѣ и подираніе по кожѣ, послѣ котораго бросаетѣ ихъ въ жарѣ, а къ утру на другой день въ потѣ.

Тогда шо только больные сѣи узнающѣ, что шакое случая не должны они признавать маловажнымѣ и стараются сколько можно пособиѣ таковому своему нещастію; но сѣе не рѣдко бываетѣ уже поздно и неизбѣжная сухотная лихорадка къ нимѣ пристаѣтѣ.

По чему весьма нужно, дабы такіе люди, когда примѣчаютѣ въ себѣ легкой и

частой кашель, которой произошелъ отъ объявленныхъ причинъ, должны тогда часъ себя успокоить и пить много смягчительныхъ отваровъ подъ No. 8. 13. 40. 88. означенныхъ; есплижъ употребивъ сїи средства болѣзнь не поправляется, то надлежитъ кровь отворить и во время нужды вторично оную пустить, часто шаковыми средствами предохраняются худыя слѣдствїя.

Изъ сего слѣдуетъ, что кровопусканіе въ воспаленїи легкаго не очень сильномъ есть всегда не обходимо и производитъ желаемой успѣхъ, отъ котораго должно воздержаться, когда съ самаго начала спанетъ выходить изъ рта харкошина съ нѣкоторымъ больнаго облегченіемъ, или жилы бьются очень тихо, либо больной весьма слабъ и нездороваго сложенїя. Въ то время можно во вся прогнать зло лекарствами смягчительными и споспѣшествующими къ выплевиванїю харкошины.

Кромѣ кровопусканій и холодительныхъ жидительныхъ лекарствъ прилично еще употреблять смягчительныя, какїя можно видѣть подъ No. 6. 7. 8. 9. 13. 32. 40. 88.

Но горячительныхъ лекарствъ, рвотныхъ и крѣпкихъ проносныхъ во вся не должно употреблять.

Есплижъ окажется, что желудокъ очень слабъ или содержишься въ немъ много не переваренной пищи, то надлежитъ
да-

давать жидишельныя лекарства и легкїя слабишельныя подѣ №. 3. 11. 12. 39. 141. предписанныя.

Когда больной не имѣетъ довольно на низѣ, по попребно ему всякой день одинѣ или два раза наснавливать мягчишельныя промывашельныя.

Рѣдко воспаленіе легкаго разгоняется безѣ харкошины.

Иногда спраждушіе воспаленіемѣ въ легкомѣ на первой или на второй день своей болѣзни легко выхаркиваютъ мокроту, а чаще сіе случается на третій или на четвертый день, и не рѣдко въ самомъ началѣ болѣзни, какѣ въ колотѣ боковѣ бываетъ, видны на харкошинѣ, копоруя они извергаютъ, кровяные полосы.

Когда харкошина порядочно идетъ, то лекарства въ прежнихъ перемѣнахъ не надобно, есплижѣ оная клейка и съ трудностію выходитъ, то кромѣ разводящихъ отваровѣ, надлежитъ употреблять мягчишельныя лекарства подѣ №. 33. и 34. предписанныя.

Еспли харкотина идетъ въ довольно количествѣ и походитъ на гной, при томѣ дыханіе отъ того спавишѣ легко, лихорадка уменьшается, то можно ожидать хорошаго окончанія болѣзни; а еспли харкошина водяная, черноватая, дурно пахнетъ, или смѣшанна съ гнѣющею кровью, и не приноситъ больному ника-

И а

кого

кого облегченія, то всегда бываетъ худымъ предвѣщаніемъ.

Часто сія болѣзнь получаетъ нѣкоторое облегченіе, когда моча идетъ мутная, копорая въ скорости осѣдаетъ на низѣ въ видѣ гноя, или когда больной часно ходитъ на низъ. Великое кровотеченіе изъ носу иногда всего скорѣе унимаетъ болѣзнь.

Если въ продолженіи сей болѣзни дыханіе еще очень трудное, хотя довольно уже выпущено крови и употреблено много пошребныхъ лекарствъ; если харкотина по причинѣ своей клейкости не можетъ выходить и голова чрезвычайно болитъ; или если примѣчено будетъ брѣженіе или судорожныя содраганія, то шонъ часъ должно приложить къ подшвамъ квашеное пѣсто смѣшанное съ шолченою горчицею подъ №. 291. означенное, или, когда оное не будетъ довольно дѣйствовашъ, привязать къ ножнымъ икрамъ нарывной пластырь. Не рѣдко больной получаетъ великое облегченіе, если онъ будетъ держать подъ носомъ или передъ ртомъ грецкую губку, обмочивъ ее прежде въ горячую воду или въ мягчишельной опварѣ и вдыхать въ себя паръ, чрезъ что воспаленіе легкихъ не шолько разгоняется удобно, но и харкотина скорѣе приготавлиается; сіе лекарство бываетъ еще дѣйствительнѣйшимъ, если къ нему прибавитъ уксусу.

Когда

Когда воспаленіе легкаго продолжается тихо и надлежащимъ порядкомъ, то сіи больные уже на четвертой день чувствуютъ въ себѣ великое облегченіе, легко выхаркиваютъ, и на седьмой, девятой или одинадцатой день лихорадочные припадки покидаютъ.

Еслилижъ оныя безъ явнаго опущенія пребывающіе въ своемъ жестокомъ и нѣтъ никакой надежды, чтобы такое воспаленіе хорошо разошлось, и кончилось бы изверженіемъ изъ рна мокроты, то надлежитъ ожидать, что оно обратится въ нагноеніе.

Сие познается изъ непрестаннаго продолженія лихорадки, которая по большей части усиливается въ вечеру съ новымъ подираніемъ по кожѣ и за нимъ слѣдующимъ жаромъ, однако бѣненіе въ жилахъ ощущается нѣсколько слабо и мягко и бываетъ слышеніе въ груди; больные жалуются, что ихъ безъ явной причины часто знобитъ, имѣющъ великую жажду, краснѣющъ у нихъ щеки и губы сохнутъ.

Еслили такое воспаленіе занимаетъ великую часть легкаго, то онъ великаго нагноенія рдился нарывъ, который весьма часто содержишь въ себѣ много гною, въ сие время должно употреблять только же смягчительныхъ опваровъ, какъ сказано было околонтъ въ бокахъ во время нагноенія.

Окончаніе нагноенія въ воспаленіи легкаго бываетъ различное и по большей части опасное.

Естьли нарывъ въ скоромъ времени, однако не вовся, прорвется въ дыхательное горло, больной спанетъ харкашъ гноемъ, и почувсвуетъ опъ того въ дыханіи великую легкосъ, лихорадка и всѣ прежніе припадки уменьшающъ, или вовся утихнутъ, по можно вѣрно надѣяться, что нарывъ по возвращеніи здоровья посредствомъ выхаркиванія совсѣмъ истощится.

Но не меньше и въ семъ случаѣ мягчительные опвары и слегка споспѣшествующіе выхаркиванію мокроты должны бытъ употребляемы безъ пощады, пока харкотина начнетъ ити легко и во многомъ количествѣ.

А естьли мокрота очень густа и не скоро идетъ, то надлежитъ оную принудить крѣпчайшими лекарствами подъ No. 33. 34. означенными.

Естьли харкотина по немногу уменьшается, и больной не чувствуетъ стѣсненія или нарочитой трудности въ груди, то знакъ, что уже изъ нарыву вышло много гною, особливо когда біеніе жилъ не показываетъ болѣе лихорадки; и для того должно больному давать крѣпительныя и живучія лекарства подъ No. 86. 89. 90. предписанныя.

Естьли больные по причинѣ жестокаго сухаго кашля не могутъ спать, то въ вечеру когда ложатся въ постелью надлежитъ давать имъ лекарство унимающее
кашель

капель подъ No. 41. 83. 84. 85. означенное.

Симъ способомъ часто больные щасливо и совершенно вылечиваются.

А есѣли нарывъ будетъ большой и скоропостижно прорвется въ средину легкаго, то часно больные нечаянно задушиваются и умираютъ.

Есѣлижъ нарывъ прорвется на наружную поверхность легкаго, то гной вытекаетъ въ пустую грудную.

Сѣ такимъ же образомъ и изъ тѣхъ же самыхъ знаковъ познается, какъ прежде сказано въ подобномъ сему случаѣ о колотьѣ въ бокахъ.

Какъ только примѣчено будетъ изъ подлинныхъ знаковъ, что гной выпекъ въ пустую грудную; и изъ другихъ признаковъ извѣстно будетъ въ какой точно половинѣ груди содержится гной, то ни мало не теряя времени должно сдѣлать прободеи въ груди и выпустить опшуда гной.

Есѣли послѣ сего лихорадка перестанетъ, дыханіе сдѣлается свободнымъ и тѣлесныя силы начнутъ умножаться, то можно надѣяться выздоровленія, въ прочемъ для залеченія сего нарыва потребны тѣ же самыя лекарства, какія предписаны въ колотьѣ боковъ, находящемся въ подобномъ сему состояніи.

Но иногда такой нарывъ во вся неопоряется или очень поздно; особливо ког-

да гной уже сдѣлался острымъ и разѣлъ многія части вокругъ себя лежащія; и разивши кровь привелъ больного въ великую слабость, но въ такомъ случаѣ нельзя точно надѣяться, чтобы можно больного вылечить и сдѣлать ему довольное пособіе, ибо сіи больные сухоникою часто умираютъ, особливо, естли лекарства подъ №. 89. 90. 102. означенныя, которыя въ сихъ случаяхъ весьма полезны, не производятъ ожидаемаго дѣйствія.

Чѣмъ меньшій нарывъ, тѣмъ меньше опасности, и естли изъ сихъ нарывовъ прорвавшихся въ духовные каналы весь гной выйдетъ, то очень часто такіе больные легко и скоро выздоравливаютъ, особливо когда они прочимъ тѣломъ здоровы и ихъ соки не имѣютъ въ себѣ никакой оспроты.

Иногда воспаленіе заражаетъ въ легкомъ многія части, которое, естли обративши въ нагноеніе, то произведетъ многие нарывы, кои часто бываютъ очень малы, и пришедши въ совершенную созрѣлость не причиняютъ болѣе никакой лихорадки. Въ такихъ обстоятельствахъ больной свободно дышетъ, имѣетъ порядочной позывъ на ѣду, спокойно спитъ и въ короткое время выздоравливаетъ.

Сіи нарывы занимающие малую часть легкихъ находятся по большей части на поверхности легкаго, часто сами собою пропадаютъ безъ всякаго худаго слѣдствія,

спвія, а иногда зазыхають, и оставляють по себѣ небольшой мозолистой рубецъ, и сей рубецъ, естли занимаешь неважное мѣсто, по больному не причиняетъ никакого чувствительнаго безпокоисва.

А иногда маленькіе нарывы въ легкомъ долгое время скрываются, не имѣя ни какихъ явныхъ знаковъ, по которымъ бы можно ихъ примѣнить; но послѣ великаго шѣлодвиженія, послѣ сильнаго и долговременнаго крику или послѣ иныхъ упражненій, въ которыхъ легкіе должны дѣйствовать болѣе обыкновеннаго больные ощущають въ дыханіи нѣкоторое затрудненіе и непорядокъ, однако такіе люди прочимъ шѣломъ будучи здоровы, сѣ безпокойсво починають маловажнымъ и оное безвредно сносять до поздней своей старости.

Иногда такіе нарывы чрезъ долгое время находясь въ шѣлѣ безъ причиненія непріятнаго чувствія, но гной по малу дѣлаяся оспрымъ, и мѣсто, въ которомъ онъ содержится, раздражая своею ѣдкостью, производитъ воспаленіе; иногда больной жалуется на стѣсненіе въ груди, на частой кашель, на непрерывную лихорадку и частое подираніе по кожѣ. По томъ такой нарывъ прорывается и больной харкаетъ гноевою маперією, послѣ чего лихорадка опять утихаетъ и больной приходитъ въ силы; а естлижъ въ легкомъ многіе находятся нарывы, которые сопряжены съ воспаленіемъ, то и припадки

въ разсужденіи воспаленія спановлялся сильнѣйшими и опаснѣйшими; иногда случается, что изъ сихъ нарывовъ одинъ за другимъ воспаляется, которые приводящъ больного въ великую слабость, а какъ скоро выйдетъ изъ нихъ вся матерія, то такіе припадки вовсе унимающъ и больной выздоравливаетъ.

Симъ образомъ часто такіе нарывы пропадаютъ, но иногда собирается въ нихъ новая гной, которые когда соединяясь съ воспаленіемъ, то прежніе припадки опять оказываются.

Нѣкоторымъ больнымъ какой нибудь изъ сихъ припадковъ обыкновенно случается въ опредѣленное года время, то есть весною и осенью, къ которымъ они совершенно привыкаютъ, и будучи опытомъ научены, что оныя проходящъ не причиняя въ груди ни какихъ особенныхъ безпокойствъ, почитаютъ ихъ маловажными; нѣкоторымъ сіе приключается нѣсколько разъ въ году, а у иныхъ такіе нарывы пребываютъ затворенны и невредимы нѣсколько лѣтъ.

Когда нарывъ уже сопряженъ съ воспаленіемъ, то должно смотрѣнь усиливается ли лихорадка или нѣтъ? Если усиливается, то надлежитъ поступить не иначе какъ съ начинающимся еще воспаленіемъ легкаго, и даванъ больному мягчительныя холодительныя лекарства подѣ

№. 8. 40. § 8 означенныя.

Толь-

Только въ пусканіи крови шу оспорожності надлежитъ наблюдать, чтобы сохранить естественныя силы, которыя нужны для изгнѣнія, для приведенія нарыва въ созрѣлость и для ошворенія онаго и заживленія.

Еслили лихорадка не очень сильна, то крови пускать не должно, но довольно однихъ смягчительныхъ лекарствъ, которыхъ не нужно перемѣнять и въ то время, когда харкошина выходитъ легко и порядочнымъ образомъ; еслилижъ харкошина начинаетъ помалу уменьшаться, и больной чувствуетъ уже въ себѣ довольноное облегченіе, то надлежитъ давать прежнія живучія лекарства подъ No. 86. 89. 90. предписанныя.

Когда кашель ночью мучитъ, то въ вечеру надлежитъ давать лекарства утоляющія кашель, о которыхъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

Иногда случается, что послѣ такого воспаления легкіе зашвердѣваютъ, ошъ чего больные чувствуютъ въ груди тяжесть, трудно дышатъ, ошъ всякаго тѣлодвиженія приходятъ въ слабость и всегда опасаются, что бы нечаянно не задохнулись, по большій часъ могутъ только лежать на спинѣ, или на одномъ какомъ нибудь боку, а часто едва отваживаются и лежать, но принуждены бывающъ сидя спать, бѣшеніе въ жилахъ имѣющъ малое, церовное и никогда споль

ско-

скорого, какое имѣющъ шѣ, у которыхъ въ легкомъ находится великой нарывъ; при этомъ не чувствуютъ въ вечеру такъ сильныхъ содроганій или ознобу и не такъ много потѣютъ.

Часто такія окрѣпlosti и затвердѣнія бывающъ во многомъ количествѣ и причиняющъ непрерывной сухой кашель, въ семъ и въ первомъ случаѣ приличны лекарства подъ №. 60. 91. 135. означенныя, которыя кромѣ смягчительныхъ отваровъ употребляются съ желаемымъ дѣйствіемъ.

Если воспаленіе легкаго съ самаго начала будетъ очень жестокое или осиплено въ небреженіи и безъ всякаго пособія, или было пользовано горьчительными лекарствами и сдѣлалось такъ сильно, что скоро можешь обратиться въ англоновъ огонь.

Въ это время бѣшеніе жилъ ощущается очень слабое, скорое, малое, и неровное, лице блѣднѣетъ, худѣетъ или часто распухаетъ и синѣетъ, больные не чувствительно каются и мочатся въ постели, руки и ноги зябнутъ, выдыхающъ холодный воздухъ, выплевываютъ маперію черную и вонючую, и появляющая у нихъ на поверхности груди и по всему тѣлу красная пияна, за которыми въ скоромъ времени слѣдуетъ смерть.

Также воспаленіе легкаго всегда почти бываетъ смертельно, если оно произошло отъ прежде бывшей гнилой или
воспа-

воспалительной лихорадки, когда жизненные силы уже весьма слабы или соки очень огустѣли или испортились, сдѣлались бѣдными и начали гнить; и по тому воспаленіе легкихъ, когда случится во французской нечисти или въ цыгашной болѣзни, всегда соединено бываетъ съ превеликою опасностію.

Если при воспаленіи легкаго случится ломотная лихорадка или ломъ въ составахъ, то оно весьма часто на седьмой, девятой или одинадцатой день оканчивается либо потомъ либо прыщевой сыпью, кою порой пузырьки походятъ на пшено.

Не рѣдко воспаленіе легкаго порядочно и тихо продолжается, больной выхаркиваетъ много хорошей мокроты: лихорадка уменьшается и силы возобновляются; но вдругъ харкотина останавливается, больной чрезвычайно тоскуетъ, трудно дышетъ, спавшійся очень сонливъ, забывается, бредитъ и проч.

Сии припадки приключаются, когда больной простудился, много напился холодной воды или чего иного, очень жестоко разсердился и чрезвычайно испугался или учинилъ другое что нибудь тому подобное.

Когда въ то время будетъ жестокая лихорадка вмѣстѣ съ великою тоскою, то потъ часъ должно пустить больному кровь и во время нужды опять повторить.

Так-

Также должно давашь ему много пишь мягчишельныхъ, опончающихъ отваровъ, особливо шѣхъ, которые означены подѣ Но. 33. 34. Естѣли си не сдѣлаюшь въ скорости облегченія, то надобно положишь къ икрамъ, а иногда и къ плечамъ нарывные пласпыри, припомъ обмочивъ грецкую губку въ теплый уксусъ держашъ почаще передъ рпомъ и подѣ носомъ и велѣшь ему выпягивать въ себя изъ оной паръ, дабы такимъ образомъ возбудить кашель.

Употребленіемъ сего способа не рѣдко харкошина опянь начинаешъ иппи, тоска по малу уменьшается и больной чувствуетъ великое облегченіе; по чему надлежитъ опянь давашь больному мягчишельныя и возбуждающія харкошину лекарства, пока онъ совершенно выздоровѣетъ.

Г Л А В А XII.

О кровотеченіи изъ гортани.

Естѣли кто часно капляешъ и выплевываетъ много пѣниспой и чистой крови, то шакую его болѣзнь должно назвашь кровотеченіемъ изъ гортани.

Всякое сильное и долговременное шѣлодвиженіе, скоропостижное разгоряченіе или проспуженіе, жестокой гнѣвъ, незапной страхъ, сверьхъ силъ подниманіе чего нибудь шяжелаго, паденіе, ушибъ, очень
ско-

скорое и безъ малѣйшей остановки восхождение на возвышенное мѣсто, сильной крикъ, пѣніе, очень узкое плащье, долговременной жаръ въ лѣтнее время, или чрезвычайной жаръ въ покаяхъ, очень горячія бани и проч. могутъ сію болѣзнь произвеси.

Сей болѣзни очень часто подвержены бывающіе люди многокровные и горячаго сложенія, также и шѣ, у копорыхъ обыкновенное кровотеченіе изъ носу, текущей почечуй и мѣсячные крови давно не идущіе, или вдругъ остановились: также весьма склонны къ сей болѣзни, у копорыхъ легкіе очень слабы, продолговатая шея, плечи въ верхъ поднялись, узкая грудь, и сверхъ сего имѣющіе кровь оспирую, или такую, которая оипъ самыхъ легчайшихъ причинъ разгорячается.

Прежде, нежели такая болѣзнь откроется, шо сіи больные по большей части чрезвычайно шоскуютъ, чувствуютъ сильное и непрестанное сипѣненіе въ груди, или нѣкоторую боль либо въ одномъ либо въ другомъ боку либо по срединѣ груди; иногда жалуются, что у нихъ въ груди очень чувствительно болятъ, колятъ, деретъ, копорая боль начавъ отъ грудной кости доходитъ до спины и дѣлаетъ дыханіе очень шруднымъ, кромѣ сего чувствуютъ въ правомъ или въ лѣвомъ воздухѣ шугость съ болью, или спягиваніе, при томъ часто кашляютъ и наконецъ выпле-

плевываютьъ кровь, послѣ чего многіе иногда припадки утихаютъ.

Чѣмъ сильнѣйшая причина, тѣмъ скорѣе она производитъ свое дѣйствіе и тѣмъ опаснѣйшее бываетъ кровотеченіе, ибо такимъ образомъ часто большіе сосуды въ легкомъ прорывающся, и нерѣдко сій больные скоропостижно умираютъ, и хотя сего послѣдняго не случится, и будишь лечить сию болѣзнь приспоспобнымъ образомъ, однако всегда почти раждаются въ легкомъ великіе чирьи, копорые очень часто бываютьъ причиною неизлечимой чахотки.

Естьлижъ объявленная причина будетъ не очень сильна, и не очень скоро подѣйствуеишь, то кровные жилы не всегда разрываются, но только въ своихъ устьяхъ разширяются и выпускаютьъ кровь; такаа степень кровотеченія изъ горпани не соединена съ великою опасностію, особливо когда больной имѣетъ хорошее сложеніе своего тѣла и соки не острые, кровь не выходитъ изъ горпани съ споль сильнымъ стремленіемъ и въ такомъ множествѣ, больныежъ очень свободно кашляютъ, и легко мокроту плевываютьъ, по чему не должно крайне спрашиваться кровавой харкошины, копорая рѣдко приключаетъ худыя слѣдствія: ибо онаа безъ важной причины и въ то время случается, въ копорое должна иппи кровь изъ носу, текучей почечуй или мѣсячные крови, или
ког-

когда многокровоіе либо умножившееся движеніе соковъ подаеиъ къ тому причину.

Весьма опасное кровотеченіе изъ горшани, которое происходитъ отъ испорченныхъ осипрыхъ соковъ; ибо тогда или кровь во вся испорченна и распущенна, или легкое въ чирьяхъ, и больные очень слабы, слѣдовательно такое харканіе крови или съ трудностію или во вся не принимаеиъ никакого леченія. Въ болѣзняхъ гнилыхъ и злыхъ, въ воспѣ худаго свойсва, въ сильной французкой и цыготной немощахъ теченіе крови изъ горшани всегда почти бываетъ смертельнымъ знакомъ.

Когда кровотеченіе изъ горшани можетъ произойти отъ разныхъ причинъ, по сперва надлежииъ оныя прилѣжно изискать и смотря по онымъ располагати леченіе.

Во всякомъ харканіи кровью больной долженъ быть спокоиъ, и естли біеніе въ жилахъ скорое, полное, твердое и оспрое, то въ разсужденіи припадковъ и пѣлесныхъ его силъ, должно ему однажды или нѣсколько разъ пускати кровь, особливо естли сѣя болѣзнь произошла отъ многокровоія, очень сильнаго движенія соковъ или иной какой нибудь наружной причины, въ семъ случаѣ надлежииъ кровопусканіями привесити больнаго въ нѣкоторую слабосиъ съ наблюденіемъ крайней осторожности, дабы такимъ образомъ уняиъ сильное стремленіе крови въ легкое,

ошѣ чего кровные сосуды могли бы свободно сжиматься; а худой знакъ когда ошѣ повноренныхъ кровопусканій нѣшѣ никакого облегченія.

Припомѣ больной не долженъ никогда сильно кричать, но всячески избѣгать неумѣренныхъ шѣловженій и душевныхъ возмущеній, давая ему легкія холодильныя лекарсва подѣ №. 9. 41. 92. означенныя, всякая пища и питіе, кошорое больной употребляетѣ, должно бытъ чуть теплое а не горячее, и есѣли нѣшѣ у него на низѣ, то надлежитѣ понуждать мягчительными промывательными.

Сѣи лекарсва должно продолжати до шѣхъ порѣ, когда кровошеченіе изѣ горла явно и шочно уменьшился.

Есѣлижѣ употребивѣ надлежащимъ образомъ всѣ сѣи лекарсва, кровь не перестаетѣ ишши изѣ рта, то должно приешунитѣ къ лекарсвамъ слетка вязательнымъ, какія подѣ №. 94. 95. 96. 97. предписаны.

Однако есѣли и сверхѣ сего больной безпрестанно мучишя очень сильнымъ и шпрекопнымъ кашлемъ, кошорый всегда умножаетѣ кровяную харкошу, то кромѣ прежнихъ лекарствъ, должно давати не премѣнно лекарсва ушмающія кашель подѣ №. 80. 81. 82. 188. предписанныя.

Вязательныя лекарсва, есѣли или сѣ самого начала, или вѣ великомъ количествѣ будущѣ употреблены, часно дѣлаютѣ

лаютъ великой вредъ, и по тому всегда должно начинатьъ лечишь сперва легкими вязательными и помалу доходишь до сильнѣишихъ.

Весьма великое дѣйствіе производишь студеная вода внутрь упоиребляема. Когда кровотечение изъ горшани происходишь отъ сильнаго снрсрмленія и разжиженія крови, что обыкновенно очень часто случается послѣ великихъ на солнечномъ жару тѣлесныхъ упражненій, однако и въ семъ случаѣ должно прежде выпустить попребное количество крови и даватьъ холоднелыныя вышеупомянутыя лекарсва.

Какъ только кровь ииши чересшачениъ, то вязущихъ лекарсвѣ больше упоиребляишь не нужно, а возобновляишь силы спокойсвиѣмъ, хорошею и легкою пицсю приготоваенною изъ молока, жидкои, ячной или изъ соротинскаго иишена кашиды; однако ведъшь больному еще нѣсколькo времени пиишь овварѣ подѣ No. 98. котороч весьма пользуеишь и бываеишь вкусенъ, есшлы къ нему примѣшати третью часть молока.

Очень часто случается, что послѣ кровотеченія изъ горшани больной еще выплевываетъ нѣсколькo закипѣлой крови смѣшанной съ склизью, однако такой харкошы не должно ни коимъ образомъ останавливать, ибо она не показываеишь ничего худаго, иначе сія гнѣющая кровь можешъ получить

оспироту, кошорая развѣдая многія часпи произведетъ печальныя слѣдствія.

Естьлижъ больной не имѣетъ довольныхъ силъ къ изверженію харкошины, то должно пособлять лекарствами подъ No. 99. 100. означенными.

Но и въ то время не обходимо должно больному по вечерамъ, особливо когда онъ по причинѣ жестокаго кашля не можетъ ночью спокойно уснуть, давая лекарство унимающее кашель подъ No. 41. 84. 85. означенное.

Еслили кашель совсѣмъ перестанетъ и больной опять приходитъ въ свои силы, бѣеніе въ жилахъ снаноившися порядочное, дыханіе свободное и легкое, то должно не сомнѣнно надѣясь, что больной скоро выздоровѣетъ. Также изъ сего можно заключить, что кровяныя жилы въ легкомъ не повреждены, и кровь только шла изъ разширившихся послѣднихъ ихъ кончиковъ.

Однако больные должны еще нѣскольکو времени содержать себя въ спокойствіи и избѣгать всякихъ оспрыхъ горячихъ напитковъ и грубой пищи; въ семъ случаѣ молоко служишь для нихъ лучшею пищею, но еслили кто не можетъ употреблять молока, то долженъ избрать иную легкую пищу только въ маломъ количествѣ и никогда не долженъ въ одинъ разъ много набѣдаться.

Естьлижъ они во вся уже не кашляютъ, но пребывающъ чрезъ долгое время
сла-

слабы, то велѣнь имѣ принимають черезъ три часа по чашкѣ лекарства подѣ №. 70. предписаннаго.

При томѣ всемѣрно члдежитѣ избѣгать всего того, что только можетъ подаютъ случай опять возвратиться болѣзни, и по тому нужно больнымъ по выздоровленіи опѣ сей болѣзни чаще пускать кровь, особливо въ то время, какъ скоро они почувствуютъ въ себѣ нѣкоторое необыкновенное стремленіе жидкостей, въ лицѣ спануть краснѣть, ощущать стѣсненіе въ груди или трудно дышать, и когда сѣи припадки, употребивъ легкія холодительныя лекарства, не утихаютъ.

Если послѣ кровотеченія изъ горла больной нѣсколько кашляетъ, чувствуетъ въ груди нѣкоторую боль и жаръ, бѣеніе въ жилахъ скорѣйшее обыкновеннаго, и въ вечеру еще болѣе учащаетъ, то сѣе показываетъ, что легкое испорчено и въ немъ находится рана.

Въ сихъ случаяхъ по большей части съ начала бываетъ харкошина склиская, нѣсколько клейкая и иногда гмѣшанная не много съ кровью; но по прошествіи нѣсколькихъ дней такая харкошина спановится гноиспою, изъ чего можно заключить, что рана уже начала гноиться и внутренній вередъ открылся.

Если вередъ не великъ и больной впрочемъ пѣломъ здоровъ, то можно ожидать выздоровленія. А если вередъ великъ,

ликъ, больной съ природы имѣетъ легкое слабое, или избытокъ острыхъ соками, то припадки со дня на день усиливаются, вередъ разбодаетъ около себя лежащія чаши и изсушаетъ шѣло, пакъ что сему пособишь уже никакъ не возможно.

Иногда наружные краешки у раны соединяются между собою заливаются, отъ чего больной перестаетъ мокроту выхаркивать, однако онъ не перестаетъ мучиться сухимъ кашлемъ, по томъ въ срединѣ сей раны собирается гнои производящей новой нарывъ, который прорываетъ зашворецъ; самая сей не великъ, и при томъ соки въ шѣлѣ не испорчены, то онъ долгое время не прорывается, не дѣлая больному великаго беспокойства, наконецъ такимъ образомъ какъ обыкновенно случается при воспаленіи легкаго сѣи нарывы воспаляются, созрѣваяющъ, прорываются и сами собою испражня гноистую мокроту залечивающъ съ великимъ больнаго облегченіемъ.

Еслилижъ такой нарывъ будетъ великъ, и соки въ шѣлѣ остры, то больнои жалуются на тяжесть въ груди и не можетъ лежать либо на одномъ либо на другомъ боку безъ того, чтобы не чувствовать великой боли, кашляетъ сильно безъ всякой харкотины, безпрестанно мучится лихорадкою, которая въ вечеру еще болѣе усиливается, по томъ кидаетъ его въ жаръ, ночью не спитъ, напоследокъ
высту-

выступаетъ пошъ; отъ котораго онъ приходитъ еще въ большее разслабленіе; и когда такой нарывъ прорвется, то больные хопя вышлевывають много мокроты, кошорая очень дурно пахнетъ и имѣетъ цвѣтъ зеленой, но объявленные припадки непрерывно продолжаются; естлижъ сей нарывъ будетъ заповоренъ, то онъ часъ отъ часу увеличиваяся причиняетъ жеспокой кашель, отъ котораго силы уменьшаются, и наконецъ всѣ сіи бѣдствія оканчиваются мучительною и продолжительною смертію.

Естли послѣ того, какъ кровь изъ горшани перестанетъ ишти, примѣчается еще нѣкошорой сухой и какъ бы горячій кашель, однако безъ сильной лихорадки, то больному можно давать лекарствъ унимающіа кашель и умягчающіа харкошину, какія подъ No. 40. 41. 90. 92. показаны.

Естлижъ будетъ очень сильная лихорадка, біеніе въ жилахъ полное, шугое, то должно пособлять кровопусканіями и холодншельными лекарствами какія подъ No. 6. 8. 9. видѣть можно.

Когда послѣ сего жаръ и лихорадка утихнутъ и больной спанетъ харкаетъ гноиспою мокротою, то надлежитъ давать лекарства подъ No. 39. 90. 101. или подъ No. 36. 87. означенныя, а въ вечеру когда пора спать, шѣ, которыя подъ No. 41. 84. 85. предписаны.

Опытомъ дознано, что деревенской воздухъ, умѣренное упражненіе шѣла, пихая верховая ѣзда на лошади, или ѣзда въ коляскѣ воевское время очень полезны для сихъ больныхъ; ибо опъ того силы довольно скоро возобновляющіяся и больные выздоравливающъ, особливо естли сверхъ сего будучъ они продолжатъ лекарства выше объявленныя; инымъ чрезвычайно пользуясь лекарство подъ №. 70. или Сибирская вода по поламъ съ молокомъ смѣшанная.

А естли вередъ въ легкомъ очень великъ, лихорадка ни мало не опускаетъ, но еще пуще усиливается, естли харкота выходишь темная, зеленоватая и дурно пахнущъ, то худое предвѣщаніе; однако нѣкопорые вылечивающъ лекарствами подъ №. 89. 102. предложенными.

Естлижъ всѣ сїи лекарства будучи употреблены надлежащимъ порядкомъ не дѣлающъ никакой пользы, то слабая надежда о больномъ; и въ такомъ случаѣ имѣетъ только мѣсто леченіе поддерживающее жизнь, которое помощію объявленныхъ лекарствъ унимающъ усиливающейся кашель, легкія же холоднѣлыя и укрощающія боль подъ №. 41. и 92. предписанныя унимающъ вечерній жаръ и стремленіе лихорадки, и симъ способомъ сколько возможно дѣлающъ болѣзнь сноснѣйшею.

Сильной и обезсиливающей пошѣ, такъ какъ и изнуряющей поносъ, припадки въ сей болѣзни суть весьма опасныя.

Пошѣ часто унимается лекарствами подѣ No. 35. 70. означенными, а поносъ опѣ лекарства подѣ No. 94. 95. предписанныхъ перестаетъ.

Если ноги или животъ у больного распухли, то должно давать лекарства мочегонительныя подѣ No. 71. 72. также тереть опухлыя части фланелью или байкою накуренною можжевельными ягодами.

Также иногда можно давать больному легкое слабительное подѣ No. 38. предписанное, особливо когда больной по причинѣ излишней въ желудкѣ слизи не имѣетъ позыву на ѣду, но съ тѣмъ ежели только онъ не очень слабъ.

Иногда харкота у одержимыхъ чехоткою такую имѣетъ остроту, что разбѣдал внутреннія горланныя части производитъ раны, и симъ самымъ причиняетъ въ глотаніи не сносную боль; въ то время, какъ сказано уже прежде въ надлежащемъ своемъ мѣстѣ о жабѣ, можно употреблять лекарства подѣ No. 62. 66. 67. находящіяся.

ГЛАВА XIII.

О одышкѣ или занеманіи дыханія.

Одышка есть опаснѣйшая между грудными болѣзнями, которая имѣетъ главнѣй.

нѣйшимъ своимъ знакомъ трудность въ дыханіи, ибо больные одержимые сею болѣзнію всегда трудно и тяжело дышущі, и въ опасности всякой часъ, чтобы не удушиться, при томъ вдыхающі въ себя воздухъ съ разинутымъ ртомъ и съ разширенными ноздрями и при каждомъ дыханіи, которое всегда почти соединено бывающъ съ хрипотою и клакочаніемъ въ легкомъ, въ великомъ движеніи у нихъ вся грудь, плеча и руки.

Въ то время когда одышка очень тяжела, у больного надувается лице, губы распухаютъ и синѣютъ, глаза пучатся и краснѣютъ, выступаютъ по всему тѣлу клейкой потъ, руки и ноги холодѣютъ, умножается потка, отъ которой духъ занимается.

Между тѣмъ у такихъ больныхъ ощущается очень часто бленіе въ жилахъ лихорадочное не ровное и слабое, но иногда полное и пугое, а иногда неровное и прерывчивое.

Одышка не всегда бываетъ соединена съ кашлемъ, однако больные часто мучаются очень тяжелымъ и сухимъ, а иногда выплевывающъ много харкотины.

Одышку можно считать всегда опасною и часто неизлечимою болѣзнію, которая иногда бываетъ непрерывною и въ вечеру еще болѣе усиливается.

Находятся больные, которые днемъ имѣютъ во всемъ свободное дыханіе, а какъ

какъ только лягутъ въ постелю и спанутъ засыпать, то тотъ часъ начинающіе имъ грѣзиться страшные и непріятные сны, опъ чего они вдругъ пробужаются, вснающіе съ поспехи, отворяющіе окна, дабы скорѣе вдыхаиъ свѣжій воздухъ и отвратиши наступающее задушеніе, и такимъ образомъ доспавляютъ себѣ облегченіе.

А у иныхъ такой припадокъ болѣзни бываеиъ на подобіе порядочной перемѣжающейсѣ лихорадки, коиорая въ опредѣленное время, однако нечаяннымъ и скоропоспижнымъ образомъ нападаетъ на больного, но сѣ дѣйствіе по прѣшеспвѣи нѣсколькихъ часовъ оиъ опять оканчивается.

Все это можетъ приключиши отдышку, что только очень спѣсняетъ, отягчаеиъ дыхательное горло и препятспвуетъ свободному вдыханію и выдыханію воздуха.

Сею болѣзнію гораздо чаще бывающіе одержимы нѣ люди, копорые имѣютъ очень слабыя и чувствительныя чувствспсныя жилы, слѣдовательно часто спраждутъ судорогами. У сихъ не рѣдко шеи шакъ сжимается, что воздухъ спершійся въ срединѣ горла имъ кажется быиъ въ видѣ нѣкопорого шара, копорый дыханіе дѣлаетъ шруднымъ и тяжелымъ.

Естли по примѣчанію свойства и расположенія больного окажется, что вся сѣя немощь происходиши опъ судорогъ, то въ это время, когда она мучиши больного, надлежиши давать ему нюхаиъ лекар-

карства подѣ №. 104. 105. 106. или внутрь давати въ ложкѣ чистой воды нѣсколько капель подѣ. № 105. 106. означеннаго. Есѣли сѣи мало подѣисвуютѣ, то употребитѣ лекарство подѣ №. 107. которое часто въ короткое время прогоняетѣ сей болѣзненной припадокѣ. Также въ семѣ случаѣ премною пользуютѣ промывательныя приготовленные изѣ наливки довольно настоянной съ цвѣтками ромашковыми, куда на дѣ житѣ положиѣ не много сахара и масла, или тѣ промывательныя, которыя подѣ №. 76. 77. предписаны. А дабы не допустиѣи будущаго нападенія сей болѣзни, то больные должны долгое время употреблять пилюли подѣ №. 73. или подѣ №. 218. означенныя. Есѣлижѣ для укрѣпленія чувствительныхѣ жилѣ и для преодоленія судорожныхѣ дѣисвій оныя лекарства не довольно будутѣ, то надлежитѣ имѣ давати довольно количество лекарствѣ подѣ №. 70. 74. означенныхѣ.

Многіе находятѣся, которые въ прочѣ довольно здоровы, но какѣ скоро сдѣлается на дворѣ погода мокрая, то чувствуютѣ въ легкихѣ ипоску и тяжело дышатѣ: сѣе часто зависитѣ отѣ слабости и безсилія легкихѣ.

Таковымѣ больнымѣ приличны лекарства подѣ №. 86. 208. означенныя, которыя есѣли мало пользуютѣ, то употребляѣ подѣ №. 70. 74. 75 и проч. предписанныя. При томѣ весьма полезно, особливо

бливо весною и лѣтомъ, выходишь жить на горисшыя или навозвышенныя мѣста, на которыхъ можно пользоваться свѣжимъ чистымъ и здоровымъ воздухомъ, также хорошо имѣть вѣдѣть верхомъ на лошади, или имѣть другое какое шлодвиженіе и соопвѣствующую своимъ силамъ работу, только надлежитъ стараться, чтобы такими пріятными движеніями не приве-
сти шла въ усталость.

У иныхъ часто легкое вдругъ наполняется кровью и рождаются кровяная одышка, сему подобное легко приключается людямъ многокровнымъ послѣ жестокаго гнѣва, сипраха и проч. или естли текучей почечуй, мѣсячныя крови, очищеніе кровей послѣ родовъ, или кровотеченіе изъ носу нечаянно и прошивъ обыкновенія оспановляющіяся.

Такіе больные будучи лишены всѣхъ почти своихъ силъ лежатъ поверженны, дышутъ тяжело, лице и глаза у нихъ краснѣютъ и пухнутъ, руки и ноги холодѣютъ, бѣеніе жилъ имѣютъ не ровное и сжащенное.

Въ семъ случаѣ часто всю болѣзнь истребляетъ однажды пущенная кровь, которую въ разсужденіи припадковъ должно столько разъ повторять, сколько нужда будетъ сего требовать; между шѣмъ давать больному много жидисельныхъ и холоди-
тельныхъ опваровъ, и поступать съ нимъ
шакъ.

также наставлявшъ ему промывательныя и шерсть нагрѣтою байкою руки и ноги.

Еслили отъ того дыханіе сдѣлается свободнымъ, то больные должны нѣсколь-ко дней сряду приниматьъ лекарства подѣ No. 11. 12. 39. означенныя, дабы симъ образомъ освободить тѣло отъ излишнихъ мокротъ, еслилижъ при самомъ началѣ болѣзни примѣчены будутъ у больного почечуиныя шишки, то вмѣсто пусканія крови, надлежитъ припустить пиявицы.

Сие самое приключается и нѣмъ людямъ, которые имѣющъ въ своихъ сосудахъ кровь огустѣлую и склизкую; ибо сія густая и склизкая матерія скопившись въ легкомъ, раждаетъ мокротную одышку, которая всегда бываетъ продолжительнѣе первой, такіе больные много и тяжело кашляютъ и иногда выхаркиваютъ склизкую и густую матерію.

Въ семъ случаѣ потребны лекарства разбивающія и опончающія склизъ, которыя чрезъ выплевываніе, испражненіе низомъ или мочею испребляютъ мокроту изъ тѣла, такія находящіяся подѣ No. 109. 110. 111. 112. 113.

Нѣкоторые изъ числа сихъ больныхъ посредствомъ таковыхъ лекарствъ часто благополучно и совершенно вылечиваются; но тяжелое дыханіе соединенное съ хрипотою опять возвращается, и часто бываетъ съ такою жестокостію, что долж-

но

но вѣрно опасаться, чтобы больной не удушился.

Въ сихъ обспоятельствахъ вышепоказанныя лекарства должно оплощить, и больного положивъ на открытомъ воздухѣ, давая ему лекарства подѣ №. 107. или 114. Еслилижъ такой припадокъ долго продолжится, то надлежитъ приложить къ икрамъ нарывной пластырь, и наставивъ крѣпкое промывательное.

Когда шаковой припадокъ нѣсколько утихнеть, то лекарства прежде предписанныя опять употреблять и нарывные пластыри когда напластуютъ довольно матеріи, надлежитъ снять, а мѣсто, къ которому оныя приложены были, держать открытымъ чрезъ долгое время, сей способъ леченія должно продолжать до тѣхъ поръ, пока болѣзнь по малу уменьшаяся совсѣмъ прекратится.

Послѣ сей болѣзни, такіе больные часто долго времени бываютъ слабы, и послѣ всякаго движенія тѣла великаго или малаго, дрожатъ у нихъ сердце и тяжело дышатъ.

Но дабы истребить во вся и сѣи безпокойства, то должно давать имъ лекарства подѣ №. 74. 75. предписанныя, и велѣтъ заниматься умѣренными упражненіями тѣла при сельскомъ воздухѣ.

Иные больные очень часто жалуются, что у нихъ изъ головы подѣ видомъ какъ бы насморка не прещанно идетъ острая
шон-

тонкая матерія, которая своимъ спрекопаніемъ возбуждаетъ жестокой кашель, жаръ въ груди и тяжелое съ одышкою дыханіе.

Въ семъ случаѣ должно имъ давать много пишь отваровъ подъ No. 40. 88. и проч. и оныя долгое время продолжаятъ, сѣи еще большее производятъ дѣйствіе, естли примѣшашъ къ нимъ третью часть молока; а естли такое насморку подобное испеченіе матеріи будетъ продолжаятъся и при томъ во многомъ количествѣ, то должно къ запылку приложитъ нарывной пластырь.

Естлижъ испеченіе изъ головы острой оной матеріи перестанетъ, однако сухой кашель съ перхотю въ горлѣ продолжается, то надлежитъ пользоваться лекарствами подъ No. 80. 81. 82. 92. означенными. Также не рѣдко случается, что подагра, ломъ въ суставахъ и грыжа перешедши въ грудь и осноровившись въ легкомъ раждаетъ одышку.

Въ сихъ обстоятельствахъ больной долженъ принимать много лекарствъ жидкихъ, смягчительныхъ и мочегонительныхъ, какія подъ No. 8. 13. 40. 46. 72. пока онъ почувствуетъ въ себѣ облегченіе, а шѣ части, въ которыхъ прежде находилась матерія перешедшая уже въ легкіе, должно посредствомъ наружныхъ лекарствъ и прикладываніемъ нарывныхъ пластырей,
до-

дovести до того, чtобъ оная матерiя
опянь перешла въ прежнее свое мѣсто.

Естьли одышка получила свое начало
отъ чесотки, съ копорю при прежнемъ
ея леченнi худо было поступлено и пѣмъ
самымъ она снаружи вступила внутрь
пѣла, то въ такомъ случаѣ доставляющъ
весьма великую пользу плаюли подѣ No. 49.
означенныя, которыя надлежишъ употреб-
лянь съ часмъ подѣ No. 61. показаннымъ
или вмѣсто сихъ приниматьъ лекарства
подѣ No. 110. 115. 116. предписанныя.

Также довольно пользующъ, мягчи-
тельные, жидишельныя, кровочищитель-
ныя лекарства подѣ No. 3. 45. 46. 72. пред-
писанныя, естьли только оныя будущъ
долгое время употребляемы, ибо посред-
ствомъ сихъ лекарствъ больной выплевыва-
ющъ много харкошны, отъ чего и самая
болѣзнь пропадешъ.

Въ сихъ и пому подобныхъ случаяхъ
когда одышка происходивъ отъ острой
матерiи засѣвшей въ легкомъ, то весьма
полезно больному сдѣлать по правиламъ
искусства на плечѣ или на ногѣ болячку
(*toniticulus*) и осипавить ее на долгое время,
дабы изъ оной могла вытекать матерiя.

Нерѣдко причиною одышки бывающъ
нарывы и затвердѣлыя опухоли въ лег-
кихъ, въ то время больной по большей
части мучится сухимъ кашлемъ, при ко-
торомъ у него въ груди слышно пиданiе,
или хрипѣнiе.

Естьли что нибудь такое примѣчено будетъ изъ предшедшихъ причинъ, изъ прежнихъ и еще продолжающихся припадковъ; то съ больнымъ должно такъ поступать, какъ предписано въ подобномъ случаѣ во время воспаленія легкихъ.

Одышка часто происходитъ отъ излишняго обремененія желудка, или отъ спершихся вѣтровъ; естьли причиною первое, то употребляютъ рвотныя и проносныя; естьли второе, то иѣ лекарства, которыя подъ №. 117. 130. 160. означены.

И по тому страдающіе одышкою должны всемѣрно осиперегаться, чтобы не отягощать своего желудка многою, грубою и раждающею вѣтры пищу, и спараться имѣть всякой день свободное на низъ испражненіе.

Послѣ жестокой и долгое время продолжающейся одышки часто приключается неизлечимая водяная въ груди болѣзнь.

Г Л А В А XIV.

О водяной болѣзни въ груди.

Водяная болѣзнь въ груди раждается, когда соберется водяная матерія въ одной половинѣ груди или въ обоихъ.

Съ начала сію болѣзнь рѣдко можно узнать; она по большей части тайнымъ образомъ и медленно умножается и въ самое то время, когда уже сдѣлается явною такъ

такъ бываетъ сильна и упорна, что никакимъ образомъ не можетъ истреблена быть, особливо естли свержъ сего находится въ легкомъ какое нибудь поврежденіе.

Не рѣдко водяную болѣзнь получаютъ тѣ, копорые въ сильномъ будучи поту, вдругъ выйдунъ на холодной воздухъ и сей потъ у нихъ скроешя, однако сія болѣзнь бываетъ чаще слѣдствіемъ другихъ продолжительныхъ грудныхъ болѣзней.

Одержимые сею болѣзнію, непрестанно кашляютъ безъ всякой харкопины, а хощя они и выплываюнъ изъ груди какую маперію, то всегда бываетъ пѣниса и водяна.

Сіи немощные когда долгое время, или нѣсколько возвышеннымъ голосомъ говорятъ, также когда далеко и долго прохаживаюнъ или всходянъ вверхъ по лѣсницѣ или на гористое мѣсто, либо сдѣлаюнъ какое нибудъ тѣлесное движеніе, то потъ часъчувствуюнъ великую трудность въ дыханіи, и опасаясь, чтобы не задохнуться, принуждены бываюнъ вдругъ остановиться и удержаться отъ таковыхъ своихъ дѣйствій, они не могутъ свободно и довольно дышать, и во всемъ подобны тѣмъ, копорые отъ многого бѣганія и сильныхъ тѣлесныхъ движеній чрезвычайно устали. А естли лягутъ въ постель и едва спанутъ засыпанъ, то не много спустя времени получаюнъ сильную шоску, копорая

у нихъ захватываетъ духъ и не даетъ вся почти дышать, отъ чего они вдругъ пробуживаются, спремительно встаютъ съ постели и растворивъ окна ищутъ себѣ облегченія въ свободномъ воздухѣ.

Естьли въ обоихъ половинахъ груди много уже скопилось матеріи, то больные никогда не могутъ на спинѣ лежать; но принуждены бывають или сидѣть или по крайнѣй мѣрѣ держатъ голову и грудь выше обыкновеннаго. Естьлижъ сія въ одной какой половинѣ находится, то они не столько трудно ложатся на больной бокъ, а когда лягутъ на здоровой бокъ, то ощущають въ груди великую тоску и начинаютъ сильно кашлять, и по тому они никогда не отваживаются лечь на сей бокъ. Иногда у сихъ больныхъ опекають ноги, отъ чего дыханіе имъ ютъ легче, которое, естьли на ногахъ опухоль упадетъ, опять дѣлается труднымъ.

Иногда сей опекъ бываетъ на одной или на обѣихъ рукахъ, отъ чего сіи слабые части спановаятся нечувствительными и недвижимыми; часто въ пустотѣ грудной примѣчается переливаніе воды и какъ бы кипѣніе: также когда больные споятъ или сидятъ прямо, то чувствуютъ тяжесть и давленіе въ низѣ къ преградѣ грудобрюшной, (diaphragma) надуваются у нихъ вздухи, и весь животъ, особливо выше пупа вверхъ приподнимается, тогда при такихъ обстоятельстввахъ больные имѣ-
ютъ

тутъ свободнѣйшее дыханіе; но часто боль и колошье въ груди проспирается вверхъ, по причинѣ которыхъ впадаютъ они въ обморокъ, или у нихъ когда біеніе въ жилахъ сдѣлается вовсе нечувствительное, то сердце начинаетъ дрожать или прерываться.

Въ сей болѣзни всегда выходитъ мало мочи, которая бываетъ ионка и водяна, а иногда мупна съ красною осадкою.

Біеніе въ жилахъ всегда бываетъ слабое, малое, неровное и съ пріоспановкою, однако иногда случается, что въ одной рукѣ жилы бьются крѣпко и ровно, а въ другой неровно и слабо.

Если болѣзнь еще не усилилась и легкіе не повреждены, то біеніе въ жилахъ не рѣдко ощущается крѣпкое, свободное и во всемъ порядочное.

Въ сей болѣзни пыловыя лекарства рѣдко приносятъ вспоможеніе, и по тому, если больные силами крѣпки, надлежитъ имъ давать черезъ два или три дни проносное подъ №. 42. 43. 47. 110 предписанное, а въ тѣ дни, въ которые больной не принимаетъ оныхъ проносныхъ, давать мочегонительныя подъ №. 71. 72. 79. 89. 113. 118. 119. означенныя.

Если сѣи лекарства выгонятъ изъ тѣла много воды, и дыханіе становится свободнѣе, то сей способъ леченія должно продолжать, а когда больной получитъ довольно облегченіе, то повторять такъ часто проносныхъ лекарствъ не нужно.

Часто случается, что сѣи проносныя хопя выгоняють много воды, однако дыханіе не поправляется, при томъ больной жалуется на умножающійся жаръ, тоску, сухость въ груди, и кашель по причинѣ ослабѣвшихъ его силъ увеличивается. Въ семъ случаѣ проносныя надлежитъ оспа-вить, а употреблять только мочегони-тельные.

Естьлижъ и отъ сихъ не будетъ ни-какого вспоможенія, то нѣтъ уже никакой надежды, чтобы больной выздоровѣлъ, и бо-лѣе ничего не оспается съ нимъ дѣлать, кромѣ прободенія, (paracentesis) которое долж-но учинить на груди. Но и сѣе, естьли бу-детъ долго времени откладываемо, не много пособитъ, особливо когда больной чрезвычайно слабъ и болѣзнь уже въ немъ очень усилилась. Также прободеніе не все-гда пользуется, естьли водяная болѣзнь получила свое начало отъ поврежденія легкихъ.

У которыхъ ноги съ облегченіемъ ды-ханія отекають, тѣмъ полезно держашъ отекрыя ноги надъ паромъ зажженного хлѣбнаго вина, дабы симъ образомъ про-известъ потъ.

По учиненію сего часто отеки съ на-чала вдругъ опадаютъ и больной опять получаетъ тоску и снѣсеніе въ груди; однако для сего не должно томъ часъ оспавлять употребленія сего средства; но продолжаясь чрезъ многіе дни; ибо та-кимъ

кимъ образомъ часто больные получаютъ много облегченія, а нѣкоторыя приходятъ чрезъ то въ прежнее свое здорovie.

Такія опухоли можно также иногда съ желаемымъ успѣхомъ наскать помощью наскательнаго инструмента, или вмѣсто сего сдѣлавъ по правиламъ искусства нарочитую болячку на рукѣ либо на ногѣ, или глубоко загнувъ больному на груди заволочу и чрезъ долгое время ее держать открытою, чтобы истекала матерія; таковыя средства не рѣдко приносятъ великую пользу.

Г Л А В А XV.

О необыкновенномъ бiеніи или трепетаніи сердца.

Еслили сердце необыкновеннымъ образомъ скоро и усильно сжимается, больного приводитъ въ слабость, наводитъ на него шокъ и не можетъ порядочно производить своихъ естественныхъ дѣйствій, то такое болѣзненное состояніе называется *бiеніемъ* или *дрожаніемъ сердца*.

Послѣ чрезвычайныхъ кровопеченій или послѣ излишнихъ изпеченій другихъ жидкостей, которыя лишивъ тѣло нужныхъ ему влажностей, приводятъ оное въ великое разслабленіе, или послѣ сильныхъ, жестокихъ и продолжительныхъ болѣзней

получаетъ человѣкъ такую слабость, что отъ самаго малѣйшаго движенія шѣла или духа, сердце у него начинаетъ очень сильно дрожать, отъ чего присоединяется новая слабость пренятствующая его выздоровленію.

Въ семъ случаѣ, хоня отъ недостатка соковъ силы чрезвычайно ослабѣли однако худо поступитъ, кто станетъ больному для укрѣпленія его силъ давать крѣпкіе напитки и кормить пищею пригошовленною съ многими пряными зелями.

Но съ начала должно спарашься кормить шолько мясными питательными похлебками и ячною кашницею или изъ сорочинскаго пшена, такимъ образомъ можно опянь доставить шѣлу спокойствіе и больному порядочной сонъ. А естли въ шѣлѣ довольно находится соковъ, то позволишь ему употреблять не много вина и пищу съ пряными зелями; шакже не худо въ хорошую погоду совѣтовать ему прохаживаться или ѣздить въ коляскѣ; сіе принесетъ гораздо большую выгоду, естли учинено будетъ на открытомъ полѣ, избѣгая всегда излишнихъ трудовъ и заботъ: симъ простымъ и безопаснымъ способомъ часто шакіе больные совершенно вылечиваются.

Но естли по употребленіи всѣхъ сихъ средствъ, сердце не перестаетъ дрожать и больной не имѣя никакого позыву на ѣду находится очень слабъ, то тогда дол.

должно ему давать крѣпительныя лекарства подѣ №. 70. 74. 75. означенныя.

Въ женщинахъ и мужчинахъ спражующихъ судорогами, часно нечаянно оказывающа сильное и безпрестанное дрожаніе сердца, копорое происходитъ только отъ судорогъ и непорядочнаго теченія жизненныхъ соковъ, а по большей части отъ гнѣва, страха, радости или отъ иныхъ легкихъ душевныхъ возмущеніи Въ семъ случаѣ лекарства подѣ №. 23. 92. 106. 107. 114. предписанныя подають скорое облегченіе.

Но самыя малѣйшія и почти невинныя причины дѣлають, что въ сихъ больныхъ часно и очень скоро опять начинается дрожаніе сердца. Для предохраненія и удержанія сего шоль часно возвращающагося припадка должно чрезъ долгое время употреблять лекарство подѣ №. 73. означенное.

Еслилижъ чувственыя жилы такъ слабы, что сіе лекарство не будетъ довольно къ совершенному испребленію болѣзни, то надлежитъ отвѣдать одно копорое нибудь изъ лекарствъ подѣ №. 70. 74. 75. предписанныхъ.

Иногда дрожаніе сердца происходитъ отъ многокровія, въ такомъ случаѣ кровопусканіе есть надежнѣйшее вспоможеніе, копорое должно производить въ сходственную силамъ больного; а естли и по довольномъ выпущеніи крови не будетъ никакого облегченія, то надлежитъ упо-

шребить лекарства холодительныя, опон-
чающія кровь и легкія слабишельныя, ка-
кія подѣ №. 9. 11. 12. 39. 45. 121. означены.

Такимъ же образомъ должно посту-
пать, когда остановившійся текущей че-
чуй, и теченіе мѣсячныхъ кровей произ-
ведунѣ многокровіе и чрезѣ то причиняшѣ
дрожаніе сердца.

Также въ крѣпкихъ и здоровыхъ лю-
дяхъ послѣ нечаянныхъ душевныхъ спрас-
шей часто рождается мучительное и не
обыкновенное дрожаніе сердца, во время
кошораго не рѣдко такіе больные впада-
ютъ въ обморокъ: сіи естли тѣлесный
возмутѣ покой и умѣютъ укротитѣ свои
душевные возмущенія, то симъ часо пре-
одолавають все сіе зло.

Естлижѣ сердце дрожать не пере-
стаетѣ, и сверхѣ сего въ больномъ ощу-
щается жарѣ, и тугое біеніе жилѣ, то
должно потѣ часѣ пуститѣ ему кровь,
пославитѣ промывательное и даѣть лекар-
ство подѣ №. 1. 2. 7. 9. 12. предписанное.

Которыя естли мало пособятѣ, при
томѣ больной лежитѣ безпокоенѣ и не
спитѣ, то надлежитѣ даватѣ ему чрезѣ
часѣ по чашки лекарства подѣ №. 41. или
92. 93. предписаннаго; симъ способомъ
дрожаніе сердца часто унимается. А ког-
да всѣ сіи не дѣлаютѣ никакого пособія и
дрожаніе сердца ни мало не утихаетѣ,
біеніе въ жилахъ ощущается не ровное и
перерывчивое, естли шакое зло при каж-
домѣ

домъ движеніи тѣла усиливается и больной по причинѣ сильной тоски задыхается, то сіе значить, что у него въ сердцѣ находится какой нибудь кровяной наростокъ (polypus) или болѣзненное разширеніе самаго сердца, либо большихъ изъ него исходящихъ жилъ. (aneurisma).

Такое состояніе очень опасно, и если съ начала не оповрашнѣ его, то оно часно остается неизлечимымъ.

Надлежитъ, чтобъ такіе больные были совершенно спокойны и чаще бы себѣ опворяли кровь, дабы чрезъ то уменьшилось дрожаніе сердца, сверхъ сего очень полезно имъ давать чрезъ два часа по ложкѣ лекарсва подъ No. 12. положеннаго съ одною или съ двумя чайными чашками лекарсва подъ No. 45. означеннаго, или вмѣсто сихъ можно употреблять подъ No. 121. предписанное.

Еслилижъ такое зло опъ того утихнетъ, то должно ожидать выздоровленія, однако сіи лекарства нужно употреблять долгое время, и хопя будетъ казаться, что такая болѣзнь совсѣмъ уже прошла, однако надлежитъ беречься всякаго сильнаго движенія и трудовъ.

А когда не оказывается никакого облегченія и болѣзнь не можетъ вовсе истреблена быть, то въ такомъ случаѣ имѣетъ только мѣсто леченіе продолжающее жизнь, (cura palliativa) или облегчающее нѣсколько припадки, что болѣзнь дѣлаетъ сноснѣйшею.

Лекар-

Лекарства жидишельныя можно употреблять безпрестанно, а какъ скоро біеніе въ жилахъ сдѣлается напряженнѣе, умножится дрожаніе сердца, и тоска станетъ усиливаться, то безъ замедленія должно пускить кровь. Но какъ сіе случается часно, то не всегда нужно пускать много крови, но столько надобно оной выпустить, сколько попребно для уменьшенія припадковъ.

Еслижъ дрожаніе сердца и тоска препятствуютъ больному спать, то всякой вечеръ надлежитъ давать ему сонъ производящее лекарство, какое подъ No. 41. 84. 85. показано, а днемъ давать лекарства унимающія боль, какія видѣть можно подъ No. 82. 92. 126. 127. Сіи лекарства продолжать до тѣхъ поръ, пока дрожаніе сердца и тоска прекратятся и когда прежде упомянутыя лекарства не дѣлаютъ уже никакого вспоможенія.

Также симъ способомъ можно лечить и тѣхъ, которые получили нечаянное и безпрестанное сердца претепаніе послѣ сильныхъ упражненій тѣла, послѣ наружнаго поврежденія, то есть, когда у нихъ начало дрожать сердце отъ того, что они ушиблись, упали съ какого нибудь мѣста, надсадились приподнимая что нибудь тяжелое, или отъ восхожденія на возвышенное мѣсто.

Припадки происшедшіе отъ сихъ причинъ всегда бываютъ опасны, по тому что
часно

часто рождается кровяной волдырь или разширеніе (aneurysma) въ сердцѣ или въ кровныхъ жилахъ изъ него исходящихъ, и хотя сіе зло съ начала кажется мало-важнымъ, но естли его оставишь безъ всякаго примѣчанія или пользуемо будетъ не очень дѣйствительными лекарствами, то дѣлается неизлечимымъ.

Изъ сего видно, сколь худо поступають нѣ больные, которые не хотяишь поишь часъ себя успокоить, и сіи припад-ки почитая маловажными, не повинуются благимъ совѣшамъ и наставленіямъ людей искусныхъ въ врачебной наукѣ.

ГЛАВА XVI.

О кашлѣ или насморкѣ.

Насморкѣ обыкновенно происходитъ отъ простуды, тогда у больного давитъ и нѣ-сколько ломитъ голову, не можетъ онъ свободно носомъ дышать; при томъ час-то чихаетъ и изъ носу у него идетъ осип-рая и водяная маперія; которая не рѣдко пакожде истекая въ горло, причиняетъ въ гортани и въ груди безпокойство, по-томъ больной начинаетъ кашлять и ослабѣвши ощущаетъ въ тѣлѣ ознобъ и дрожь при приумноженіи кашля и сла-бости по большей части вечеромъ. Бѣненіе жилъ у него бываетъ часто лихорадоч-

ное, иногда онъ имѣетъ великую жажду съ крайнимъ отвращеніемъ отъ пищи.

Сей болѣзни побольшей часи причиню бываетъ простуженіе, особливо когда послѣ солнечной теплоты вдругъ наступитъ холодная погода и воздухъ сдѣлается студеной съ туманомъ.

Хотя кашель кажется наноситъ болѣе досады, нежели опасности; но если онъ будетъ оставленъ въ небреженіи и безъ всякаго леченія, то часомъ превращается въ воспаленіе легкаго или въ другую какую нибудь долговременную болѣзнь, и такимъ образомъ можетъ причинить чахотку или сухотную лихорадку.

Не рѣдко стѣсненіе въ груди и кашель происходятъ отъ холоднаго и чрезвычайна студенаго питья, что очень часто случается лѣтомъ съ тѣми, которые отъ великихъ движеній тѣла разгорячившись пьютъ что нибудь весьма холодное; и хотя сей припадокъ кажется иногда неважнымъ, но какъ изъ того легко можетъ приключиться воспаленіе въ легкомъ, то онаго не должно почитать за малосиѣ.

При всякомъ кашлѣ, а особливо когда бываетъ очень сильной, когда больной чувствуетъ въ себѣ великую слабость и частыя подиранія по кожѣ, весьма полезно быть спокойнымъ, оберегаться всякаго холоду и пить много теплыхъ смягчительныхъ и разводящихъ матерію отваровъ, какіе означены подъ №. 8. 13. 40. 88.

Отъ

Отъ сего часто въ скороспн прохо-
дитъ жаръ какъ въ горпани такъ и въ
груди, а съ симъ самимъ уменьшается
оспрая матерія истекающая изъ носу, и
дѣлается гуше, напослѣдокъ слѣдуетъ хар-
котина, отъ которой бываетъ облегченіе,
и такимъ образомъ кашель оспраетъ въ
короткое время.

Иногда во время кашля случается
сильная лихорадка, великая жажда, жесто-
кой жаръ и безпреспанное стѣсненіе въ
груди.

Въ такомъ случаѣ нужно пустить
кровь, и еспли бѣеніе въ жилахъ ощу-
щается еще твердое и неперестаетъ да-
вить въ груди, то потребно повторить
кроволусканіе.

А сверьхъ мягчительныхъ отваровъ дол-
жно давать больному порошокъ подъ No. 1.
означенный или микстуру подъ No. 32. въ
день раза по три или по четыре.

Есплижъ харкотина уже изъ рта идетъ,
но очень гуща, и ощущается въ груди
хрипѣніе, при томъ больной не имѣетъ
довольныхъ силъ опхаркать оной мокро-
ты, то должно давать ему лекарства
подъ No. 33. 34. предписанныя.

Еспли больной ночью не спитъ по
причинѣ сильного кашля, то въ вечеру
когда спать ложится, надлежитъ давать
боль унимающія лекарства, которыя подъ
No. 83. 84. 85. показаны.

Спра-

Страждущіе насморкомъ когда вых-
дятъ на холодной воздухъ, то иногда
опъ того вдругъ перестаютъ кашлять,
почему думаютъ и хвастаются, что они
уже сбѣлались здоровы.

Но они въ томъ обманываются, и послѣ
дуютъ, что такое облегченіе было лож-
ное, когда кашель спустя не много вре-
мени усиливается еще съ болѣею жесто-
костью и долгое время ихъ мучитъ.

А хотя кашель болѣе уже и не возвра-
щается, но часто клейкая матерія въ
легкомъ стуспившись, затвердѣваетъ и та-
кимъ образомъ подаетъ случаи родиться
сильной одышкѣ или занеманію духа и
водяной болѣзни въ груди.

И попому весьма благоразумно тѣ
дѣлаютъ, которые въ болѣзняхъ, хотя
повидимому и легкихъ, надлежащимъ об-
разомъ поступаютъ, оныя перпѣливо сно-
сятъ и всемірно спараютъ, освободивъ
ся совершенно опъ таковыхъ болѣзней.

Еслили кашель совокупится съ дру-
гою какою нибудь болѣзнію, то припадки
всегда еще болѣе увеличиваются.

ГЛАВА XVII.

*О удушливомъ или судорожномъ кашлѣ
или кохлюшѣ.*

Сей кашель есть болѣзнь весьма злая
и опасная, кошорая очень часто нападаетъ

на младенцовъ и на дѣшей юношескаго возраста, а рѣдко на взрослыхъ людей.

Такой кашель по большой части случается весною и осенью, онъ вдругъ и въ одно время пристаетъ къ многимъ; и тогда онъ бываетъ повѣтреннымъ а не рѣдко и заразительнымъ или прилипчивымъ.

Еслили къ дѣтямъ пристанетъ сей кашель, когда они больны оспою, корью и прорѣзываніемъ зубовъ, то симъ самымъ бываетъ онъ для нихъ весьма опасенъ.

Такой кашель съ начала не описывается почти никакими примѣтными знаками онъ обыкновеннаго кашля, и будучи такимъ продолжается чрезъ нѣсколько недѣль, когда же онъ дойдетъ до совершенной своей степени, то вдругъ появляется съ судорогою, и больные получаютъ тогда въ груди тоску съ бѣніемъ жилъ лихорадочнымъ.

Сей кашель по большей части приходитъ по временамъ извѣстнымъ, то есть, больные хотя и бываютъ спокойны часа на два или на три, но на послѣдокъ чувствуютъ въ груди тоску съ сильнымъ волнованіемъ крови, и щемотаніе въ груди и въ горнани, также у нихъ часто тогда болишь и давишь подъ ложкою, изъ чего вѣрно узнавъ приближающееся такое зло, приходящъ въ великой страхъ и всѣми силами стараются отвратить наступающій кашель, однако не долго могутъ ему сопротивлянься, ибо кашель безпрестан-

но усиливаясь дѣлаетъ имъ великое затрудненіе въ дыханіи, которое всегда бываетъ соединено съ хрипѣніемъ въ груди, по томъ вдругъ нападаешь на нихъ толь удушливой кашель, что почти совсѣмъ захватываетъ духъ, и будучи очень близки къ задушенію, жадно хватаютъ въ себя воздухъ и съ великою тоскою; такимъ образомъ сіе печальное терзаніе попеременно дѣйствуя продолжается нѣсколько минутъ, иногда полчаса, а иногда и цѣлой часъ, напоследокъ сіи больные будучи приведены въ чрезвычайную усталость, по опущеніи такового болѣзненнаго припадка, успокоиваются.

Въ продолженіи такого припадка больной часто имѣетъ въ груди тоску и хрипѣніе, лице пухлѣетъ и красной его цвѣтъ перемѣняется въ темносиневатой, глаза очень выкапываются, давленіе и стѣсненіе въ груди бываетъ чрезвычайное, языкъ наружу очень высовывается, руки иногда холодѣютъ, біеніе въ жилахъ совсѣмъ пріостанавливается и больные находятся въ великой опасности задушенія, часто кровь сильно идетъ ртомъ и носомъ, часто также ихъ рветъ много склизью, послѣ чего сей припадокъ въ скоромъ времени утихаетъ. Нерѣдко такой болѣзненной припадокъ возвращается въ извѣстные и какъ бы опредѣленные себѣ часы.

Чѣмъ скорѣе, чѣмъ чаще и чѣмъ съ большею жестокостію приходитъ опять

такая болѣзнь и чѣмъ долговременнѣе продолжается, тѣмъ она наноситъ большую опасность.

Сія болѣзнь по большей части мучитъ по два или по три мѣсяца, а иногда и болѣе, особливо когда съ самаго начала она будетъ оставлена безъ леченія и больные не хотѣя принимать предписанныхъ имъ лекарствъ.

Въ леченіи должно больше смѣяться на жестокость припадковъ; но когда въ трудномъ дыханіи и во время кашля безпрестаннымъ въ груди хрипѣніемъ, болѣзненной выхаркиваетъ клейкую мокроту, то сіе значить, что легкіе у него наполнены густою склизью.

Въ семъ случаѣ пригодны всѣ тѣ лекарства, которыя склизь разбиваютъ, опончающіе и способствуютъ къ изверженію оной, такія можно видѣть подъ No. в. 32. 33. 34. 122. 123.

Когда же больные по причинѣ многого накопленія въ роту склизкой мокроты, спанивъ глотать, или такая мокрота сама собою соберется въ желудкѣ и въ кишкахъ, которая возбуждаетъ у нихъ кашель и дѣлаетъ его сильнѣйшимъ, то надлежитъ черезъ день или черезъ два давать имъ проносное лекарство, и при томъ взрослымъ людямъ тѣ, которыя означены подъ No. 4. 5. 14. 38. а для дѣтей довольно лекарствъ подъ No. 124. 125 означенныхъ.

Также не вредно для больныхъ, естѣли у нихъ упомянутыя подѣ №. 34. 122. 123. лекарсва произведутъ рвоу. Ибо они весьма часто получаютъ облегченіе, когда у нихъ выйдетъ рвою мною склизкой мокроты.

Такой способъ леченія должно продолжать до тѣхъ поръ, пока склизъ уменьшился или совсѣмъ изъ тѣла выйдетъ.

Естѣли же и послѣ сего жестокой кашель больному мѣшается ночью спать, то всякой вечеръ должно ему давать сонъ производящее лекарство.

Такія усыпляющія лекарства бываютъ и днемъ нужны, когда склизъ уже сдѣлалась жидкою и довольно уменьшилась, и естѣли кашель происходитъ болѣе отъ судорожныхъ стягиваній. И такъ какъ скоро примѣчено будетъ, что болѣзнь сія уже приближается, то пока она наступитъ, можно давать больному каждую четверть часа или въ половинѣ по одной либо по двѣ ложки лекарства подѣ №. 52. или 126. 127. означеннаго, отъ чего получаетъ онъ великое облегченіе и болѣзнь вовсе пресѣкается.

А когда по прошествіи времени, въ которое обыкновенно нападаетъ сія болѣзнь, примѣчается въ легкихъ, въ животѣ, и въ кишкахъ склизкая матерія, то въ свободное отъ оной болѣзни время должно давать прежде упомянутыя лекарства,
ко-

которыя склизъ разбивающъ и выгоняютъ ее изъ тѣла.

Естьлижѣ окажется, что болѣзнъ происходишъ не только отъ излишества мокроты, но болѣе отъ многокровія, то нужно больному пускать кровь, и смотря по силамъ и жестокости припадковъ оное повпорять; только съ тою осторожностію, чтобы таковымъ леченіемъ не привесити больного въ слабость, которая можетъ усилить кашель. Сверхъ того въ семъ случаѣ полезны лекарства подѣ No. 2. 6. 8. 32. 33. предписанныя.

Еслили кашель будетъ столько силенъ, что опасно, чтобы не порвалась какая нибудь кровная жила въ легкомъ, или не сдѣлалось бы въ немъ воспаленія, и еслили лекарства унимающія боль не могутъ принести спокойствія, то больнымъ многокровнымъ потребно тотъ часъ пускать кровь или позади ушей приспавить пиявицы.

Иногда нападаетъ на людей сухой жестокой кашель, (*tetina sicca*) которой всегда бываетъ громокъ и соединенъ съ болью, хотя въ прочемъ онъ не зависитъ ни отъ многокровія, ни отъ чрезмѣрной мокроты. Въ семъ случаѣ должно употреблять лекарства смягчительныя, масляныя, влажнительныя и унимающія боль, какія подѣ No. 40. 41. 80. 88. 188. показаны, и еслили нѣтъ свободно на низѣ, спавить легкія промывательныя.

Естьли же больной при семъ чрезмѣрно сильно и долго кашляетъ, такъ что опасно дабы такой кашель его не удушилъ, то часно получаетъ онъ скорое облегченіе, когда по чаще и съ осторожностію бить его кулакомъ по спинѣ, особливо въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинающся поясные позвонки, ибо такимъ образомъ грудобрюшная преграда и легкое приводятся въ другое движеніе или положеніе.

Но часно всѣ сіи средства бывають упошребляемы безъ всякой пользы, и кашель въ своей жестокости ни мало не унимается; въ такой упорной болѣзни лекарства подъ No 270. 275. предписанныя дѣлають великое пособіе и скорое облегченіе.

Такоже лекарство подъ No. 275. показанное премного пособляетъ, особливо въ то время, когда дѣти спраждутъ не только кашлемъ, но бывають больны сиднями или аглинскою немощью, (rhachitis) либо имѣють въ разныхъ частяхъ тѣла зашвердѣлыя желѣзы.

Естьлижъ такой кашель случается каждой день въ обыкновенной и извѣстной часъ, передъ которымъ больные всегда ощущають легкое по кожѣ подираніе; или по ошпущеніи сего припадка выпускають мочу густую и мушную, изъ которой вскорѣ отсѣдается на дно порошокъ имѣющій цвѣтъ шерстаго кирпича, въ такомъ случаѣ весьма скорое и надежнѣйшее облегче-

ченіе подаетъ перуанская лихорадочная корка, какъ подѣ №. 70. 150 означено.

ГЛАВА XVIII.

О воспаленіи преграды грудобрюшной.

Сіе воспаленіе, которое можно почитать опаснѣйшею изъ всѣхъ жестокихъ болѣзней, бываетъ по большей части смертельно для тѣхъ, которые изобилуютъ острыми соками, или между прочимъ имѣютъ тѣло худого свойства; при томъ, когда пристанетъ къ другой острой болѣзни, которая уже привела больного въ великую слабость или испоршила у него соки, то предзнаменуетъ, что больной очень близокъ къ смерти.

Люди прочимъ тѣломъ здоровые, многокровные и имѣющіе хорошее расположеніе тѣла, отъ сей болѣзни часто вылечиваются, если заблаговременно только начнутъ себя пользоваться.

Точные признаки, по которымъ можно узнать сію болѣзнь, суть слѣдующіе: въ то время больной чувствуетъ около лопатки и по ниже грудной кости сильную боль и жаръ, вздухи у него будучи приведены въ великое движеніе съ причиненіемъ толчки внутрь выпягиваются, отъ чего дыханіе какъ бы останавливается, и больной дышитъ только верхнею частію груди, при томъ очень скоро, слабо и съ великою трудностію сшараясь сколько можно, чтобы

преграда грудобрюшная и животъ были безъ движенія, сверхъ сего мучится непрестанною икоюю, во время которой чувствуетъ въ томъ мѣстѣ жестокою боль: примѣчаются на лицѣ у него въ различныхъ мышцахъ судорожныя движенія, особливо около рта, по причинѣ которыхъ больной кривящъ свой ротъ иногда такъ, что еслии на него посмотришь, то можно легко подумать, что онъ хочеть смѣяться, притомъ сіи больные брѣдять и наконецъ впадающъ въ сильное бѣшенство, къ которому присовокупляются всѣ прежде объявленные припадки, какіе бывающъ въ горячкѣ съ безпрерывнымъ брѣдомъ или паче въ воспаленіи мозга.

Еслии воспаленіе не очень сильно и не касается чрезвычайно чувствительной части находящейся по срединѣ преграды грудобрюшной, то припадки бывающъ тихіе, и бѣненіе въ жилахъ ощущается скорое, полное и твердое.

Еслилижъ занимаетъ сію чувствительную часть, то объявленные припадки вдругъ усиливаются, больной спановится слабъ и тоскуетъ такъ, что всякую минуту должно ожидать смерти, блѣднѣетъ у него лице, руки и ноги холодѣющъ, бѣненіе въ жилахъ примѣчается дрожащее, малое и перерывчивое.

А еслии въ сіе время не можно будетъ скоро узнать болѣзни, то не много слу-

спустя времени, обращается она въ ан-
поновъ огонь, отъ котораго больной въ
скорости умираетъ.

Въ семъ случаѣ тотъ часъ должно
пустить много крови, хотя больной ка-
жется очень слабъ и изнеможенъ, потому
что нѣтъ столь сораго средства къ сохра-
ненію его жизни какъ кровопусканіе; при-
томъ надлежитъ сіе наблюдать, чтобы
у него пущенная кровь шла до пѣхъ поръ,
пока біеніе въ жилахъ станетъ свободнѣе
и крѣпче: естли сіе такъ по желанію слу-
чился, и припадки сдѣлаются тише, то
можно надѣяться выздоровленія, особливо
когда такое облегченіе не перемѣнчиво про-
должается.

Въ прочемъ съ сею болѣзнію надле-
житъ такимъ образомъ поступать, какъ
предписано въ главѣ о колошѣ въ бокахъ
и о воспаленіи мозга.

Г Л А В А XIX.

О воспаленіи печени.

Во время воспаленія печени больные
по большей части шоскуютъ и при вды-
ханіи въ себя воздуха чувствуютъ вели-
кую боль, вздухи у нихъ сильно тянешъ
и такое напряженіе часто доходитъ къ
самой шеѣ, не могутъ на лѣвой бокъ ло-
житься, чтобы не ощущать въ немъ ве-
ликой боли, и естли на сей бокъ спа-
нутъ нагибаться, то чувствуютъ тя-

жестъ и колошье въ правомъ воздухѣ, безпресшанно имѣютъ понужденіе на рвоту, на икоту и на кашель, біеніе въ жилахъ лихорадочное, полное и тугое, жестоко кашляющъ, испущенная ими моча бываетъ желта, а испражненія низомъ бѣлыя. Такіе больные имѣютъ отвращеніе отъ пищи и при томъ весь животъ у нихъ пучитъ и швердѣетъ.

Сію болѣзнь должно лечить такъ какъ колошье въ бокахъ, которая часто оканчивается выплевываніемъ харкопины, но чаще легкимъ поносомъ, которымъ испражняется желчная маперія, и для того съ начала болѣзни должно прилѣжно стараться опворяшь задній проходъ посредствомъ мягчительныхъ промывательныхъ, а когда кромѣ сего случится поносъ съ облегченіемъ болѣзни, то споспѣшествовашь оному лекарствами нѣсколько кисловатыми; какія подъ No. 11. 12. 39. видѣть можно.

При началѣ болѣзни пригодно снаружи прикладывать къ правому воздуху мягчительныя и густыя припарки, также можно скоро развестъ сіе воспаленіе, естли чаще въ день слегка намазывать правую сторону мягчительною и разбивательною мазью подъ No. 128. означенною, и сверхъ прикладывать припарку.

Естли воспаленіе занимаетъ въ печени много мѣста, то часто желчь разлившись по всему пѣлу раждаетъ желтуху. Однако и въ семъ случаѣ должно употреб-

прелять прежде объявленныя лекарства, ибо желпуха не требуетъ перемѣны въ леченіи, развѣ больной имѣетъ въ своемъ тѣлѣ оспрые и испорченные соки, силы его сдѣлались очень слабы, кровь начала гнить и проч. То въ то время имѣютъ мѣсто лекарства укрѣплятельныя и сопротивляющіяся гнилости, такъ какъ въ гнилой горячкѣ; но сіи случаи всегда почти смертельны.

Иногда при воспаленіи печени великое бываетъ облегченіе, когда почечуйныя кровныя жилы вздуются шишками; и поному естли больные спраждутъ такимъ почечуемъ и чувствуютъ понужденіе на низъ съ напругою, (*tenesmus*) должно вспомошествовать мягчительными густыми припарками, и спараться сколько можно сдѣлать почечуй тепучимъ. А естли онъ сихъ припарокъ не послѣдуетъ желаемыхъ успѣховъ и больной не чувствуетъ въ себѣ никакого облегченія, то надлежитъ припустить къ проходу пѣявицы.

Также сія болѣзнь очень часто приноситъ облегченіе, когда пойдетъ изъ носу кровь, особливо изъ правой ноздри.

Иногда передъ окончаніемъ воспаления печени выиспываетъ сильной вонючей потъ, или выиспаетъ по всему тѣлу чесотка, и въ то время лихорадка вмѣстѣ съ прочими припадками совсѣмъ покидаетъ.

Сія чесоточная сыпь часто продолжается нѣсколько недѣль, но помощію кро-

кровочистительныхъ отваровъ подъ No. 45. 46. 72. 116. или проносныхъ подъ No. 47. 110. 115. означенныхъ щасливо вылечиваются.

Воспаленіе печени, будучи съ самаго начала оставлено въ небреженіи, или когда оно очень жестокое, весьма легко обращается въ нагноеніе, отъ котораго въ печени дѣлается великой нарывъ, такой гной разбѣдая прочія части печени, не рѣдко наводитъ сухонную лихорадку. (febris hectica) Часто отъ такого нарыва раждается неизлечимая желтуха.

Однако иногда бываетъ щасливое окончаніе такого нарыва, еслили только гной сыщетъ себѣ свободную дорогу въ кишки, и такимъ образомъ приключивши легкой поносъ, выйдетъ самъ собою изъ тѣла, отъ чего напоследокъ всѣ припадки уменьшаются и лихорадка покидается.

Не меньшее бываетъ облегченіе, еслили вмѣсто поносу больной спанетъ выхаркивать много мокроты.

Но не рѣдко гной, когда прорвется нарывъ, вытекаетъ въ пупочную брюшную, и еслили онъ не имѣетъ куда выйти, то отъ сего самаго заспоенія, сдѣлавшись острымъ, разбѣдаетъ кишки, и приключаетъ весьма часто сухую водяную болѣзнь, (tympanitis) которая трудно вылечивается.

Еслилижъ сверхъ того нарывъ сдѣлается на наружной поверхности печени, то сросшися съ плевою окружающею внутрен-

трени-

ренность брюха (peritonium) и съ прочими брюшными покрывалами, производящъ опухоль, которую снаружи можно ощупать руками.

Какъ скоро сія опухоль окажется, и подлинно извѣстно будетъ, что гной уже довольно въ ней собрался; то тотъ часъ должно по правиламъ искусства оную вскрыть или разрѣзать и долгое время не зашваривать, пока припадки покажутъ, что внутренняя часть сего нарыва уже зажила и гной весь вышелъ.

Часто на печени остаются маленькіе нарывы въ великомъ числѣ, однако лихорадка покидаетъ, и въ разсужденіи здоровья не примѣчается ничего противнаго; сіи нѣсколько лѣтъ пребывающъ безвредны, которые можно видѣть только въ то время, когда больной умретъ и вскроютъ его трупъ.

Благоразумно и осторожно тотъ поступаетъ, кто по излеченіи воспаленія печени прилѣжно ощупываетъ у больного правой рукой, не находишься ли въ сей часъ сии какой нибудь тугости и затверденія.

Еслии такое затверденіе примѣчается, то должно тотъ часъ употребить разбивательныя лекарства подъ No. 46. 72. 132. 133. 135. 144. 174. предписанныя.

Также каждой день раза по два тереть сей тугой воздухъ мазью подъ No. 128. пока оной получитъ свою природную мягкость.

Если-

Естьли таковая оспорожность не будетъ употреблена, то часто отъ сего небреженія приключается неизлечимое зашверденіе печени или долговременная желтуха.

Естьли сія болѣзнь приспанетъ къ людямъ черножелчнымъ или къ зараженнымъ французскою нечистью, либо цынгою, у которыхъ въ тѣлѣ кровь оспрая и жидкая, то она нерѣдко обращается въ анипоновъ огонь, вся печень согнивается, больные скоро въ силахъ ослабѣваютъ, и сдѣлавшись у нихъ сильной поносъ, котораго причиною анипоновъ огонь, наноситъ часно скоропостижную смерть.

ГЛАВА XX.

О болѣзняхъ, кои случаются въ желудкѣ и о воспаленіи онаго.

Воспаленіе желудка познается, когда больной жалуется, что онъ чувствуетъ въ немъ безпрестанный жаръ, сильное колошье, боль, когда все, что ни проглатываетъ, съ неснсною болью и икотю опяшь выкидываетъ чрезъ рвоту; при томъ чрезвычайно тоскуетъ, мучится сильною жаждою, біеніе въ жилахъ имѣетъ швердое и слишкомъ скорое, а часно во вся оспанавливающееся и какъ бы сжатое.

Иногда такая боль, тоска и цемленіе бываетъ подъ ложкою и до тѣхъ поръ не-

неопшшупно мучишъ больного, пока онъ весь поблѣднѣетъ, вспотѣетъ, руки и ноги начнутъ у него зябнуть, въ то время жилы бьются очень слабо и скоро, и болѣе дрожатъ нежели бьются.

Можно сію болѣзнь лечить шѣмъ же самымъ порядкомъ, какимъ воспаленіе преграды грудобрюшной и прочія воспалительныя болѣзни, а когда больной все, что ни приметъ, или по крайней мѣрѣ большую часть шого, выкидываетъ рвою, при шомъ не можетъ ршомъ принимать никакихъ или весьма мало лекарствъ, то такое сосшояніе больного подаетъ случай умножиться еще болъшей опасності.

Въ такихъ обшоянелъствашъ немедленно должно больному пущить много крови, и когда воспалительныя припадки очень усиливаются, то должно выпустить столько крови, пока онъ почувствуетъ въ головѣ легкой обморокъ, тогда по болъшей части начинаетъ боънаго рвать, послѣ чего бываетъ ему иногда нѣсколько полегче. А чтобы желудокъ могъ удобнѣе сносить и въ себѣ удерживать какъ пищу такъ и лекарства, то больной долженъ пипаться жидкими мясными похлебками, жидкою овсяною кашницею, куда надлежитъ положить нѣсколько гранъ селипры, шолько такую пищу долженъ онъ употреблять по не многу и не очень часто.

Между

Между тѣмъ иногда къ великому щастію больного случается, что его желудокъ удерживаетъ въ себѣ одну либо двѣ ложки изъ лекарствъ подъ No. 2. 9. или нѣкопоруую часть лекарства подъ No. 40. предписаннаго. Густыя припарки снаружи прикладываемыя часто причиняютъ больному шокъ и боль, и по тому должны сии бысть легкія и часто перемѣняемыя.

Чашное настаиваніе промывательныхъ въ семъ случаѣ дѣлаютъ великое пособіе, и для того съ самаго начала должно употреблять легкія слабительныя промывательныя подъ No 10. 224. и очистивъ хорошо шло, надлежитъ настаивать черезъ два или черезъ три часа мягчительное промывательное, которое, ежели будетъ долгое время держаться въ шлѣ, то много пользы сдѣлаетъ. Также весьма полезно промывательное состоящее изъ одного льнянаго масла.

Когда посредствомъ кровопусканій лихорадка и жаръ приведены въ умѣренность, когда чрезъ чашное впусканіе промывательныхъ жестокая боль и шокъ уменьшилась, однако рвота еще не переставитъ, то не только можно, но и нужно давать по ложкѣ легкихъ лекарствъ укрощающихъ боль подъ No. 80. 81. 82. 92. 126. 127. означенныхъ. Сии весьма часто упимаютъ судорожную рвоту, укрощаютъ припадки, и наконецъ такъ дѣйствуя, что больной уже можетъ и прочія нужныя лекарства безъ

безъ рвоты удерживать въ себѣ; однако съ самаго начала должно давать оныя лекарства осторожно и въ маломъ количествѣ, но почаще.

Если больной уже въ состояніи сносить лекарства, и густыя припарки, прикладываемыя къ брюху не причиняющъ ему никакой боли, къ тому же бѣшеніе въ жилахъ спановится свободнѣе и крѣпче, то можно надѣяться, что онъ выздоровѣетъ, и въ леченіи должно поступать такимъ образомъ, какимъ обыкновенно поступаютъ во всякой другой воспалительной немощи, однако съ тою осторожностію, дабы сими не ошлягнись желудка.

Иногда сие воспаленіе обращается въ нагноеніе, а гораздо чаще, если оно жестокое, переходитъ въ смертельную аншоновъ огонь, въ такомъ случаѣ вся чувствующая въ желудкѣ боль вдругъ утихаетъ, больной и при немъ находящіеся думаютъ, что ему сдѣлалось полегче; однако лице у него блѣднѣетъ, глаза впадаютъ, жилы бьются слабо, не порядочно или совсѣмъ замираютъ, конечности тѣла холодѣютъ, но вскорѣ слѣдуетъ неизбѣжимая его жизни кончина.

Между прочимъ надлежитъ всемирно стараться различить прочія болѣзни въ желудкѣ случающіяся отъ его воспаленія, кошорому другія болѣзни бываютъ подобны, пошому что прочія истребующъ во вся

инаго способа въ леченіи, нежели какой нуженъ въ воспаленіи желудка.

Г Л А В А XXІ.

О щемотѣ или сосаніи сердца.

Болѣзнь сія есть жестокое и соединенное съ болью судорожное сжиманіе желудка, причиняющее чрезвычайную тошкоту; отъ чего у одержимыхъ сею болѣзнію непрестанно собирается въ ротъ въ великомъ количествѣ часто солѣная и кисловатая слюна какъ вода, которая не рѣдко возбуждаетъ у нихъ рвоту.

Иногда сія болѣзнь долгое время продолжается и не рѣдко вылечивается съ великою трудностію.

Мушцины подверженные ипохондріи и женщины страдающіе мажочною болѣзнію, которые имѣютъ всегда слабыя чувствительныя жилы и мучатся судорогами, часто страдаютъ сею болѣзнію, происходящею отъ одного судорожнаго спягиванія желудка и частей около его лежащихъ.

Заподлинно увѣриться можно, что болѣзнь происходитъ отъ сей одной только причины, когда такіе больные кромѣ сего, часто мучатся судорогами и мажочною немочью, при томъ сей припадокъ случается, или болѣе усиливается послѣ какого нибудь душевнаго возмущенія, и когда иѣтъ никакихъ знаковъ, по которымъ бы можно

можно судить, что въ желудкѣ много находится желчи, или кислоты, либо иной какой оспироты, или опягощенъ онъ пакою пищею, которую желудокъ трудно варитъ.

Въ семъ случаѣ лекарства пропивусудорожныя подѣ №. 106. 107. 126. 127. означенныя приносятъ весьма скорое вспоможеніе. А для предохраненія отъ повторнаго нападенія бывшей болѣзни, надлежитъ долгое время принимать легкія крѣпительныя лекарства подѣ №. 21. 73. 117. дабы отъ сего ослабѣвшія части могли получить надлежащую крѣпость и такимъ образомъ исцѣлилась бы причина болѣзни.

А естли больные жалуются не только на тошкоту, стягиваніе съ болью желудка, но еще теряютъ охоту къ ѣдѣ, или имѣютъ великой и необычайной позывъ на ѣду, испускаютъ горькія, гнилыя или вонючія опрыганія, то сіе значить, что такая болѣзнь произошла отъ нѣкоторой оспрой нечистоты, опягощающей желудокъ, или отъ пищи неспособной къ варенію. Нѣкоторые сверхъ сего жалуются, что у нихъ въ желудкѣ непрестанно грезетъ и какъ бы огнемъ сжигетъ. Таковая болѣзнь принятымъ словомъ въ обыкновеніе называется *изгага* или *печей*.

Естли въ роту горько, опрыганія также горьки и издають запахъ гнилыхъ

лищъ или прогорклую масла, то должно давать кисловатые лекарства или легкія слабительныя подѣ №. 3. 12. 39. 167. предписанныя.

А когда больной имѣетъ отвращеніе отъ пищи и непрерывное понужденіе на рвоту, то тогда часъ должно дать рвотное подѣ №. 24. 25. 26. отъ котораго часто вся болѣзнь утихаетъ; но еслили болѣзнь еще не совсѣмъ прекратилась, то остатки ея надлежитъ изъ желудка выгонять вышеобъявленными лекарствами.

Больные, у которыхъ оная оцѣнъ желудка гнилою или испорченною матеріею, охотятся часто къ пище и нишью кисловатому, которое можно имъ безпрепятственно позволить.

Еслилижъ они испускаютъ изъ рта опрыжку кислую и подобіе уксусу, то въ семъ случаѣ весьма пользуясь лекарствами кислотъ сопротивляющимися и легкія проносныя, какія подѣ №. 103. 129. 130. 131. предписаны.

Часто сіи больные имѣютъ необыкновенной позывъ на бду, и когда у нихъ помощію приличныхъ лекарствъ отнять кислоту, то вся такая чрезмѣрная охота пропадаетъ.

Страждущіе сею болѣзнію иногда чувствуютъ въ желудкѣ холодъ и тяжесть, не имѣютъ никакой охоты къ бдѣ, и когда примутъ какую пищу, то тогда
часъ

часъ слѣдуетъ у нихъ снѣсеніе въ груди, шоска и непріяныя отрыганія, мочу выпускаютъ густую и бѣлую, въ которой склизистыя волокна плаваютъ, или опѣдается на дно склизкая матерія; часто ихъ рвентъ, но одною только клейкою, склизкою и вязкою маперією.

Сіи сунъ достовѣрные знаки показывающіе, что причину сей болѣзни есть склизъ опячающая желудокъ.

И такъ если больной чувствуетъ безпреспанной позывъ на рвоту, то данное ему однажды рвотное, дѣлаетъ весьма скорое пособіе. Въ прочемъ всѣ болѣзненные припадки дѣйствиительно испребляются лекарствами разбивающими склизъ и легкими проносными подъ №. 3. 5. 38. 109. 110. также опварами жидкими и слегка крѣпительными, какія подъ №. 21. 143. 257. означены.

Часто сія болѣзнь рождается также и опъ того, что если кто пьетъ много вина, пива или иныхъ крѣпкихъ напитковъ, особливо когда напиваются до пьяна такие люди, которые къ симъ напиткамъ не привыкли.

Въ семъ случаѣ больной пошъ часъ долженъ напиться теплаго понкаго чаю или проспой теплой воды, опъ чего часто слѣдуетъ рвота, по шомъ ирѣидетъ на него сонъ, опъ котораго пробудившись находитъ себя гораздо въ лучшемъ порядкѣ.

Естьлижѣ по учиненіи сего и на другой день продолжается слабость, боль въ головѣ, круженіе, ошѣ пици отвращеніе или тошнота и позывѣ на рвоту, то должно опять дать ему рвотное или проносное и не позволяя ничего не упоитреблять въ пищу кромѣ жидкой мясной похлебки. Еслили больной въ вечеру еще чувствустѣ холодѣ и давленіе въ желудкѣ, то дасть ему лекарство подѣ №. 140. означенное, ошѣ котораго во всю ночь бываетѣ ошѣ спокоенѣ и на слѣдующій день находитѣ себя въ добромѣ здоровьѣ.

Всякое закисаніемѣ дѣлаемое питье во время своего броженія ошѣ онаго удержанное или ошѣ смѣшенной въ немѣ дрожжевой раки не хорошо очищенное, напишки и пици рождающіе вѣшры, также и шѣ, которые еще не довольно или вовсе не сквашены и всякая грубая клѣйкая пища рождаютѣ весьма часто въ желудкѣ сильныя вѣшры и надуванія, ошѣ чего не рѣдко приключается жестокая щемота съ несною тоскою.

Еслили сія болѣзнь получила свое начало ошѣ закисательныхъ напишковѣ, то для излеченія оной довольно будетѣ ошѣ ушончающихъ и слегка разбивающихъ вѣшры лекарствѣ подѣ №. 21. 72. 117. 133. предписанныхъ. А еслили будетѣ сего за причину пища производящая вѣшры, клѣйкая и къ варенію трудная, то надлежитѣ упоитреблять шѣ, которыя разбиваютѣ та-
кой

кой пищи клейкость и выгоняютъ оную чрезъ испражнение низомъ, какія видѣшь можно подѣ №. 3. 109. 132. также можно съ пользою наставлявати промывательныя, когда щемоша производилъ онъ умножившихся въ желудкѣ вѣшровъ.

Часто сія болѣзнь, особливо естли она чрезъ долгое время мучилъ и усиливается онъ легчайшей причины, приводитъ больныхъ въ великую слабость и изнеможеніе даже и въ то время, когда судорога унимается, однако такіе рѣдко возвращающъ вскорѣ хорошій позывъ на ѣду; но отъ малаго количества пищи чувствуютъ тоску и въ желудкѣ тяжесть, что продолжася до тѣхъ поръ, пока въ желудкѣ что нибудь будетъ находиться, и тогда развѣ получающъ облегчение, когда желудокъ опять очистишься.

И поному не обходимо нужно, чтобы больные тогда, какъ щемоша кажется бывъ уже излеченною, употребляли чрезъ долгое время горькія лекарства подѣ №. 133. 143. 150. озаченныя, дабы такимъ образомъ желудокъ могъ получить прежнія силы, и воспріятливовати сей болѣзни опять усилившея.

Во время употребленія сихъ отъ живота лекарствъ прилѣжно надлежитъ наблюдать, чтобы было довольно на низѣ.

Не рѣдко причиною сей болѣзни бывающъ зашвердѣнія или окрѣплости же-

лудка либо близъ его лежащихъ внутреннихъ часпей.

Запвердѣнія сіи по большей части можно узнатьъ ощупаніемъ въ томъ мѣстѣ рукою.

Таковой родъ щемоты весьма часто бываетъ продолжительный и упорный, и ни какими средствами неизлечимый.

Однако не рѣдко доспаваяющъ великую пользу всѣ наливки разбивающія мокроту подъ №. 46. 72. 136. написанныя, также и лекарства подъ 109. 132. 134. 135. 174. вмѣстѣ съ прикладываніемъ снаружи припарокъ и произведеніемъ легкихъ треній. Сии средства безпрерывно должно продолжашъ; также много споспѣшествуеиъ къ разогнанію сихъ запвердѣній тихое движеніе тѣла, особливо верховая ѣзда, елики только ничто не препятствуетъ ея пользоваться.

Но сіи запвердѣнія часто такъ малы бываютъ и находящя въ столь глубокомъ мѣстѣ, что однимъ ощупываніемъ не лзя узнатьъ; слѣдовательно во всякой упорной щемотѣ, когда причина неизвѣстна, должно отпѣдывать лекарства разбивающія, которыя очень часто дѣлаютъ скорое и явное пособіе и не рѣдко возвращающъ совершенное здоровье.

И такъ елики подолговременномъ употребленіи сихъ лекарствъ болѣзнь начеиъ уменьшаться, и окрѣпая части спановишъя мягкими и меньшими, то должно ладѣишъя выздоровленія.

Есть-

Естьлижѣ всѣ таковыя припадки пребываютъ безъ всякой перемѣны къ лучшему; или прошиву всякаго чаянія, когда были употреблены дѣйствиельнѣйшія лекарства, окрѣпости еще болѣе увеличивающіяся, то болѣзнь неизлечима, и часто подаеиѣ случай произойти смертельной водяной болѣзни.

Г Л А В А XXII.

О отвращеніи отъ пищи или тошнотѣ и о рвотѣ.

Всѣ причины упомянутыя въ прежней болѣзни, хотя бы онѣ были не очень важныя, могутъ испорчить позывъ на ѣду, причинивъ отвращеніе отъ пищи или произвести и совершенную рвоту.

Припадки сей болѣзни познаются изъ знаковъ въ предшествовавшей главѣ показанныхъ, для отвращенія которыхъ тошнѣ же самой приличенъ способъ леченія.

Однако весьма часто тошнотѣ и рвотѣ происходящѣ отъ воспаления желудка, кишекъ и близлежащихъ къ нимъ частей, сіе познается изъ знаковъ показанныхъ о воспалении желудка, гдѣ должно смотрѣти, какой предписанъ способъ леченія сей болѣзни, ибо въ семъ случаѣ другое расположеніе леченія можетъ причинить великой вредъ.

Часто приключается жестокая и обезсиливающая рвота, которою извергается зеленая мащерія, отъ полученной въ голову раны, отъ ушибовъ и отъ воспаления мозговыхъ оболочекъ, въ то время всѣ лекарства удерживающія рвоту не дѣйствительны, ежели находящаяся причина въ мозгу не будетъ прежде испреблена.

Не рѣдко жестокую рвоту причиняютъ грыжи или килы, слѣдовательно естли оныя главною причиною рвоты окажутся, то части, въ которыхъ обыкновенно случаются килы, должно прилѣжно изслѣдовать, и естли примѣчено будетъ, что рвота происходитъ отъ килы, то надлежитъ избирать способъ леченія сей болѣзни приличной.

ГЛАВА XXII.

О рвотѣ кровью.

Должно сколько возможно стараться различать рвоту кровью отъ кровоотеченія изъ горпани, ибо въ кровоотеченіи изъ горпани кровь выходитъ изъ легкихъ пѣнистая и алая, при которомъ всегда бываетъ кашель. Напротивъ въ рвотѣ съ кровью кашля не случается, но примѣчается въ желудкѣ гнѣшеніе, тошнота и рвота.

Прежде нежели кровь рвотою покажется, то больные нѣсколько времени шоску-
ютъ

ютъ и чувствуютъ подъ ложкою сжиманіе, тяжесть и напряженіе въ воздухахъ особливо въ лѣвомъ бока около селезенки или въ правомъ около печени, на послѣдокъ будучи приведены въ великой безпорядокъ, выбрасываютъ съ рвою кровь черную и закипѣлую.

Послѣ чего, по причинѣ освобожденія отъ шоски и напряженія боковъ, чувствуютъ въ скорости облегченіе, и еслили рвота была не очень жестокая, также силы не весьма изнеможены, то и не жалуются, что они приведены въ великую слабость нанесенную такимъ случаемъ.

Но большей части рвота съ кровью приключается, когда въ желудкѣ, въ селезенкѣ или въ печени жилы очень наполнены кровью, ибо изъ селезенки кровь течетъ чрезъ корешкіе сосуды, а изъ печени чрезъ желчный проходъ (ductus choledochus) въ двенадцатую кишку, и оттуда въ желудокъ, однако въ послѣднемъ случаѣ большая крови часть выходитъ низомъ.

Такое въ сихъ мѣстахъ умноженіе крови часто случается отъ полнокротія, отъ густоты крови, а чаще отъ запершагося почечуя и остановки мѣсячныхъ кровей.

Еслили бѣеніе въ жилахъ ощущается полное и нѣсколько твердое, то должно шомъ часъ пустить кровь и во время нужды опять повторить, больной долженъ взять совершенной покой, спавишь себѣ по-

почаще мягчительныя промывательныя, также спарайсья надлежитъ, дабы помощію лекарствъ легкихъ проносныхъ, и кисловатыхъ разбивающихъ подъ №. 2. 6. 7. 9. 11. 12. 39. разбить запеклую кровь и тихимъ образомъ выгнать изъ тѣла чрезъ испраженіе низомъ.

Но прежде всего надлежитъ изслѣдовать, не находится ли внутреннихъ или наружныхъ почечуиныхъ шишекъ, если они окажутся, то поипъ часъ должно произвести изъ нихъ печеніе парами горячей воды или припусшишь къ онымъ мѣстамъ пиявицы, либо по правиламъ искусства вскрышь ихъ ланцетомъ или ножичкомъ, ибо часпо такое испеченіе почечуевъ дѣластъ скорое облегченіе и предохраняетъ какъ отъ настоящей болѣзни такъ и могущей бы впредь случиться.

Лекарства унимающія боль, особливо вяззательныя въ сихъ случаяхъ не имѣютъ мѣста, развѣ кровь въ великомъ множествѣ и долгое время будетъ итти, и отъ того больной начнетъ ослабѣвать, тогда можно испытать лекарства подъ №. 93. 94. 95. означенныя; также приносятъ великую пользу прикладываемыя къ живому примочки изъ холоднаго уксусу или изъ студеной воды. Не меньше полезно присавливать и сухія банки или накладывать горшки къ брюху выше пупа или къ обоимъ вздухамъ.

Одна.

Однако естли усиписельныхъ лекарствъ употреблять не нужно, то должно продолжати прежде объявленныя лекарства до пѣхъ поръ, пока желудокъ и кишки во вся освободятся отъ изтекшей въ нихъ закипѣлой крови.

Естли всѣ сѣ лекарства употребляя больной еще жалуется на понужденіе на рвоу, или по причинѣ душевнаго безпокойства не можетъ спать, то надлежитъ давать въ вечеру, когда спать ложится, лекарства наводящія легкой сонъ подъ №. 41. 92. 93. означенныя.

Часто отъ жестокой и непрерывной рвоы кровью больные будучи приведены въ крайнее безсиліе блѣднѣютъ, лицомъ кажутся надуны и отъ малѣйшаго шлодвиженія получаютъ пренетаніе.

Въ сихъ случаяхъ кромѣ легкой пищи давать черезъ три часа по чашкѣ лекарства подъ №. 70. предписаннаго, къ которому надлежитъ примѣшать нѣсколько молока.

Естлижъ сѣ лекарство мало подѣйствуетъ, то должно употреблять подъ №. 74. 75. написанныя.

Почитається за весьма опасную, та кровавая рвоа, которая происходитъ отъ острошы соковъ въ желудкѣ находящихся и отъ поврежденія другихъ внутренностей, какъ обыкновенно случается отъ долговременной цынготной болѣзни, злой воспы и другихъ тому подобныхъ гнилыхъ лихора-

радокъ, въ которыхъ такая рвота всегда бываетъ смертельна.

Также рвота приключившаяся отъ наружнаго поврежденія, какъ то паденія, удара, ушиба и проч. имѣетъ всегда худыя слѣдствія.

А когда изъ сихъ причинъ будетъ важная и къ тому поврежденію внутренности прежде сего уже ослабѣлая, то не только рвотою, но и низомъ великое количество крови выходитъ, или какъ не рѣдко случается, и въ самую пустоплу брюшную. Въ то время животъ вдругъ надувается, лице осунется и поблѣднѣетъ, дыханіе спавишися тяжелое, бѣненіе въ жилахъ слабое и дрожащее, руки и ноги холодѣютъ, напослѣдокъ слѣдуютъ судорожныя движенія и корчи, которыми вскорѣ конецъ полагаетъ смерть.

Въ семъ случаѣ иѣтъ никакой надежды въ больномъ, ибо у него большія внутреннія жилы, чрезъ которыя проходятъ кровь, разорвались, и по тому не возможно удержаніе теченія крови изъ сихъ сосудовъ.

Есильлижъ причина болѣзни не очень жестока, то такіе больные часто въ скоромъ времени выздоравливаютъ.

Но они должны всемерно стараться быть въ покоиствіи, припомъ чаще себѣ кровь отворять, спавишь мягчительныя промывательныя и принимать въ великомъ количествѣ разводяща лекарства
подъ

подъ №. 9. 12. 121. 187. предписанныя, пока они не станути чувствовать въ себѣ никакой боли и сдѣлаются совершенно здоровыми.

Однако, когда сии больные начнутъ довольно выздоравливать, то должны дѣлать недѣлю или двѣ каждой день дѣлать для себя теплую ванну, въ которую надлежитъ положить полфунта бараньей или чахошной травы, (arnica).

ГЛАВА XXIV.

О боли въ кишкахъ или о коликѣ.

Боль въ кишкахъ очень часто рождается отъ воспаления въ нихъ; въ то время больной чувствуетъ, что животъ у него тяжелеетъ и попеременно какъ бы что внутри горитъ съ несносною болью естели допронутся къ животу хопя мало рукою, даже и самое дыханіе умножится сію боль, имѣетъ при томъ частое поноженіе на рвоту, не ходитъ ни мало на низъ, языкъ у него сухъ или обведенъ бѣлою плевою, очень жестоко иногда кашляетъ, чувствуетъ сильной жаръ, бшеніе въ жилахъ скорое, твердое и полное, испускаетъ мочи не много и то красную, которая иногда возбуждаетъ въ мочеиспускательномъ стволѣ боль жгущую съ рѣзкомъ.

Узнавши мѣсто боли и зная положеніе кишекъ можно иногда судить, въ которой кишкѣ находится воспаленіе.

Воспалительная боль безпрестанно пребываетъ въ одномъ и томъ же мѣстѣ, хотя часто больные жалуются, что у нихъ то въ томъ то въ другомъ мѣстѣ болитъ или колелѣтъ.

Леченіе сей болѣзни не имѣетъ различія отъ леченія предписаннаго въ воспаленіи желудка, однако воспаленіе кишекъ не бываетъ соединено съ такою опасностію, естли только не приключится вмѣстѣ съ сею болѣзнію жесткая рвота, которая пренятсвуенію приниманъ нужны лекарства.

Въ началѣ сей болѣзни пошѣ часѣ должно пустить много крови, и такое кровопусканіе сколько разъ повторять, сколько бленіе жилъ и боль будущѣ требуютъ и силы больного позволяютъ

Въ сей болѣзни особливо съ самаго начала должно давать много смягчительныхъ опваровъ подѣ №. 5. 40. 38. кромѣ холодительныхъ лекарствъ подѣ №. 1. 2. 9. предписанныхъ, также возбуждать на низъ смягчительными промывательными.

Естлижѣ не будетъ довольно свободно на низъ, то вмѣсто оныхъ надлежитъ употреблять лекарства подѣ №. 11. 12. 39. 141. предписанныя.

Сна-

Снаружи должно слегка тереть животъ рукою, помазавъ прежде мазью подѣ №. 128. означенною, а по окончаніи тренья надлежитъ безпрестанно прикладыватьъ смягчительныя припарки.

Еслилижъ примѣчено будетъ что твердоспъ и напряженіе живота уменьшается, больной уже легче сноситъ прикосновеніе руки и болѣе уже не плоскуетъ, также и прочіе припадки становящіяся тише, то должно знать, что воспаленіе и опасноспъ уже уменьшилась, въ такомъ случаѣ надлежитъ только чаще ставить смягчительныя и холодительныя промывательныя.

Еслилижъ по довольномъ выпущеніи крови, по употребленіи надлежащихъ какъ внутреннихъ, такъ и наружныхъ лекарствъ и происшедшихъ отъ того тѣлесныхъ испражнений болѣзнь нисколько не унимается, и не оказывается никакихъ хорошихъ знаковъ, то въ такихъ обстоятельствахъ должно по разнымъ мѣстамъ къ животу приставить сухія банки или на больное мѣсто положить нарывной пластырь. Такимъ образомъ не рѣдко въ короткое время боль утихаетъ и вся опасноспъ проходитъ.

Но когда сдѣлался очень сильной запоръ, и какъ отъ прежнихъ лекарствъ, такъ и отъ наставливанія смягчительныхъ промывательныхъ нѣтъ никакого пособія, то должно отвѣдать наставишь крѣпкое промывательное подѣ №. 137. 138. 224.

предписанное и давать проносныя лекарства нѣсколько покрѣче, какія подѣ №. 5. 14. 149. положены.

Однако такія средства надлежитъ тогда употреблять, когда уже выпущено довольно количество крови, лихорадка приведена въ надлежащую умѣренность, и употребленныя прежде показанныя лекарства ничего не дѣйствуютъ; иначе можно умножить какъ воспаленіе такъ и съ нимъ соединенную опасность.

Еслили въ сей болѣзни безпрерывно рвотъ больного, и онъ мало или никакихъ не можетъ принимать лекарствъ, то жизнь его находящаяся въ великой опасности.

Однако часто послѣ довольногo выпущенія крови, послѣ наставленія промывательныхъ, послѣ прикладыванія припарокъ, рвота перестаетъ и больные могутъ принимать нужныя лекарства. Но часто бываетъ потребно унять упорную рвоту лекарствами подѣ №. 80. 81. 82, 92. положенными.

А какъ скоро рвота утихаетъ, больной принятыя лекарства довольно въ себѣ удерживаетъ, то часто онъ сихъ лекарствъ на низъ свободно спавовишся и больной въ себѣ чувствуетъ великое облегченіе. Однако еслили во время употребленія мягчительныхъ и проносныхъ лекарствъ рвота усиливается, то должно давать попеременно лекарства унимающія боль, дабы зло оная не возобновилось.

А естли не лзя удержатъ ни коимъ образомъ рвоны, то по большей часи приключается безпрестанная и мучительная икота, животъ пухнетъ, силы ослабѣваютъ, бѣненіе въ жилахъ становится малое и слабое, руки и ноги и прочіе конечности шѣла холодѣютъ, большой брѣдинѣ или лежнѣ въ безпамятствѣ; тогда должно сіе признавать за знакъ приближающейся еѣ смерти.

Слѣдовательно колика естъ болѣзнь всегда сопряженная съ великою опасностію, особливо когда она произошла отъ воспаления кишекъ.

Не рѣдко колика раждается отъ простуженія, и при томъ весьма часто, когда во время очень жаркихъ дней бывають холодныя ночи, или естли кто напьется тогда чрезвычайно студеной воды, либо зимою одѣвается очень легко, особливо когда люди босыми ногами долгое время стоятъ или ходятъ по полу холодному, мокрому и выкладенному камнями или кирпичами, и проч. въ такомъ случаѣ боль не бываетъ безпрерывная, но въ скоромъ времени то утихаетъ, то опять усиливается, и по большей часи ощущается подъ пупомъ, которая часто дѣлается такъ жестокою и съ такою тоскою, что больной упадетъ въ обморокъ и выспуститъ по всему шѣлу у еѣ холодной потъ, но когда затихнетъ боль, то больной находитъ въ лучшемъ состояніи, и не жа-

лущется ни на жажду, ни на жаръ, ни на тошноту и свободно допускаетъ допрогигиваться къ животу безъ всякаго ощущенія боли.

Въ такихъ объявленіяхъ больной долженъ содержать себя въ теплотѣ и чаще пить по одной или по двѣ чашки чаю подъ No. 13. 21. 257. означеннаго, кромѣ сего безпрестанно прикладывать ему къ животу нагрѣтыя и цвѣтомъ мушкатнаго орѣха, сѣменами волоскаго укропу или шимона накуреныя салфетки либо, хлопчатую бумагу, также наставлявъ промывательныя изъ настоянныхъ въ горячей водѣ ромашковыхъ цвѣтковъ и равной части льнянаго масла. Еслижъ по учиненіи всего сего колика въ своей жестокости пребываетъ, то не рѣдко очень скорую и безопасную производящъ пользу лекарстваслегка горячипельныя и унимающія боль, какія подъ No. 107. 126. 140. видѣны можно.

Такимъ способомъ должно пользоваться колику, копорая случается мужчинамъ подверженнымъ ипохондріи или женщинамъ спраждущимъ маточною немочью, въ которыхъ ближайшею причиною колики есть только судорожное сжиманіе кишекъ или спершіеся въ нихъ вѣпры.

Еслижъ сія болѣзнь происходитъ отъ излишней или испорченной желчи, отъ кислой или гнилой оспроты, отъ пици твердой, клейкой, раждающей вѣпры, отъ напшкковъ окисающихъ; то въ семъ

семь случаѣ могутъ имѣть мѣсто тѣже самыя лекарства, какія предписаны въ подобныхъ припадкахъ щемошы въ своемъ мѣстѣ.

Но когда очистивъ уже желудокъ и кишки, боль не перестаетъ, то опять должно приступить къ лекарствамъ унимающимъ боль, какія подъ No. 107. 126. 140. положены.

Очень часто случается, что люди всѣмъ нѣломъ будучи здоровы, не ходящъ на низъ нѣсколько дней сряду. Опять чего у нихъ по долговременности изпражнений часъ отъ часу скопляются, твердѣютъ, на послѣдокъ ощущается въ животѣ тяжесть и нѣкошорая боль, приключается безпрерывное позываніе на низъ съ надутіемъ, такъ что больной чрезвычайно силился изпразниться низомъ, но безъ всякаго дѣйствія.

Въ такомъ случаѣ часто животъ такъ стягивается, что въ кишкахъ, снаружи оцупать руками можно твердой калъ на подобіе шариковъ, иногда кромѣ сего бываетъ животъ раздутъ и напаянутъ, но сие надутіе не по всѣмъ мѣстамъ живота одинаково, такъ что одна сторона примѣчается выше другой.

Въ семъ случаѣ худо тотъ поступилъ, кто спанетъ больному давая вдругъ сильныя и крѣпкія проносныя; но болѣе должно стараться размягчить затвердѣлой калъ и потихоньку выгнать

его изъ шѣла помощію мягчительныхъ промывательныхъ, мягчительнаго и разбивающаго пипья подѣ №. 39. 46. 141. также и наружныхъ легкихъ шреній.

А когда уже изпращенія размягчены, однако къ изстребленію изъ шѣла такія лекарства не сильны, по можно употребить крѣпящія лекарства подѣ №. 5. 14. 38. 139. предписанныя.

Долговременной просной поносъ, или жестокой поносъ съ кровью не рѣдко оставляющій по себѣ колику съ внутреннимъ жаромъ, которая всегда бываетъ соединена съ позываніемъ на низъ съ напругою, въ семъ случаѣ полезны лекарства масляныя, слизншательныя и легкія усыпляшительныя подѣ №. 80. 82. 83. 85. 126. предписанныя.

Опаснѣею коликою почитается та, которая называется *коликою производящею отъ чувствительныхъ жилъ въ составѣ кишекъ находящихся*: (colica nervosa или colica pectorum:)

Сія обыкновенно начинается около желудка и около часпи повыше пупа лежащей; съ начала ощущается боль скрипная и не очень жестокая, однако она не на долго такую продолжалася; но по малу становится жесточе и постояннѣе, больной теряетъ всю охоту къ ѣдѣ, жалуются на надуваніе желудка и на опрыгание, часто присоединяется рвота съ сильнымъ всегда запоромъ, животъ сжимается, и часто такъ спягивается пупъ, что

ка-

кажется, какъ бы онъ къ самой спинѣ былъ припаянъ; больной ослабѣваетъ и сохнетъ, между нѣмъ боль непрерывно усиливается, моча останавливается или во вся не идетъ, задній проходъ сжимается и въ средину такъ крѣпко зажатъ, что часно не возможно бываетъ выпустить въ оной никакого промывающаго, наконецъ разныя часпи дѣлаются парализованными, а иныя особливо вышнія члены нѣла изсыхаютъ.

Сею болѣзнію по большей часпи аспраждуютъ нѣла люди, которые принуждены получаютъ себѣ пропитаніе работою и всегдашнимъ обращеніемъ ококо свинца, ртути или мышьяка, и по тому сія болѣзнь свойственна копающимъ золотыя и серебряныя руды, серебряныхъ и золотыхъ дѣла мастерамъ, горшечникамъ и живописцамъ. Также часно сею болѣзнію мучаются, которые пьютъ вина свинцовымъ соспавомъ для обману подслащенныя, или которые употребляютъ сей металлъ въ лекарствахъ, либо въ кушаньяхъ; также примѣчено, что сія болѣзнь не рѣдко происходитъ отъ напитковъ закисающихъ и отъ незрѣлыхъ плодовъ.

Часно случается, что сія боль утихаетъ и повремени оная возвращается, она иногда цѣлой день или два дня сряду не бываетъ, а часно приходя каждой день нѣсколько часовъ продолжается, иногда въ одинъ и тотъ же день нѣсколько

ко разъ возвращается, отъ чего больной чрезвычайно измучивается, и приходитъ въ такую слабость, что всякую почти минушу должно опасаться смерти.

Еслили сія болѣзнь съ самаго ея начала будетъ извѣстна изъ преждебывшихъ, знаковъ, то часто можно больного предохранить отъ всѣхъ жестокихъ припадковъ и все сіе въ томъ состоитъ, дабы тѣло приличными лѣкарствами, подъ №. 39. 141. слегка очистивъ, такія лекарства еспльи окажутъ свое дѣйствіе, тогда болѣзнь бываетъ въ состояніи болѣе усиливаться.

И по тому тѣ, которые принимаютъ пользоваться людей работающихъ такіа мѣталлы, должны томъ часъ съ великимъ раченіемъ разсмотрѣть всѣ припадки, и еслили примѣнятъ хотя малѣйшія знаки сии болѣзни, томъ часъ должны давать самыя дѣйствительнѣйшія лекарства, которыя должно непремѣнно продолжать еще нѣсколько недѣль, хотябы больной и говорилъ, что онъ уже здоровъ.

Но очень часто сии легкія лекарства не производятъ желаемого дѣйствія, и по тому надлежитъ присовокупить къ нимъ сильнѣйшія или употребить другія крѣпчаіиія проносныя, какія подъ №. 4. 5. 14. 47. 110. 132. предписаны.

Частое наснавливаніе промывательныхъ въ сей болѣзни дѣлаетъ великое облегченіе, при томъ съ начала должно отвѣдать масляныя, смягчительныя; еспльи
лижѣ

лижъ сѣи не подѣйствуютъ хорошо, то надлежитъ вмѣсто оныхъ употребить крѣпкія подѣ №. 137. 138. 224. означенныя. Но иногда и сѣи не производятъ никакого дѣйствія, въ такомъ случаѣ нужно поснавить клестиръ изъ табачнаго дыму, отъ чего часто больной получаетъ на низъ къ великому своему облегченію.

Какъ скоро сдѣлается на низъ свободно, то должно еще споспѣшествовать ему дѣйствію мягчительными и легкими слабительными промывательными, при томъ надлежитъ воздерживаться отъ всякой грубой клеикой и производящей вѣтры пищи.

Еслили употребивъ сѣи средства, притянутой къ спинѣ пупъ придетъ опять въ свое мѣсто, и сжавшей задній проходъ отворится по прежнему, животъ сдѣлается мягче, и прочіе припадки, хотя продолжаются, однако не столько мучительны, то можно надѣяться, что больной выздоровѣетъ.

Въ то время можно употреблять съ желаемымъ успѣхомъ чрезъ долгое время лекарства подѣ №. 18. 61. 72. 73. 91. 119. 134. 142. показанныя, дабы такимъ образомъ больные могли возобновить свои силы, изсохлыя часны тѣла восстановитьъ и получить свое прежнее дѣйствіе.

Еслили отъ сихъ лекарствъ параличныя части не поправляются, то сѣрные бани и электрическая сила приносятъ великую пользу.

Пока у больного исходящъ низомъ испражненія сухія и подобныя козьему каалу, то всегда должно опасаться, что бы прежняя болѣзнь опять не возвратилась, и по тому надлежитъ ему давать смягчительныя и легкія проносныя лекарства, пока спанетъ онъ каишься порядочно и испражненія сии будутъ мягки и клеики.

Еслили больные могутъ сносить масло, то должны они принимать по унцу и въ вечеру или три раза въ день по три либо по четыре унца, то есть по шести или по осми споловыхъ ложекъ, льнянаго масла или иного свѣжаго, по тому что оно унимаетъ какъ боль, такъ и дѣлаетъ, чтобъ было порядочно на низѣ.

Еслилижъ такая колика произошла отъ окисающихъ напипковъ или лѣтнихъ плодовъ незрѣлыхъ, то оную начинать лечить такимъ же образомъ какъ прежде, по томъ чрезъ долгое время давать лекарства подъ №. 93. 110. 135. кромѣ отвара подъ №. 116. означеннаго. Сими лекарствами такіе больные всегда почти благополучно приходящъ въ прежнее свое здоровье.

Еслили припадки сей колики очень жестоки и продолжительны, при томъ промывательныя и прочія лекарства, хотя въ прочемъ дѣйствительнѣйшія, не дѣлающъ въ болѣзни ни малѣйшаго облегченія, то должно приступить къ лекарствамъ

сипамъ унимающимъ боль подѣ №. 80. 82. 83. 126. означеннымъ, которыя очень часто безъ помощи другихъ лекарствъ унимають боль, разгоняють сильную тоску и избавляють больного отъ наступающей опасности.

Больные освободившіеся отъ сей жестокой болѣзни, должны всемѣрно стараться избѣгать всякой возбуждающей ее причины, остерегаться, дабы не получить запору, иначе они могутъ легко привлечь опять къ себѣ сію болѣзнь.

Еслилижѣ въ разсужденіи состоянія своей жизни, и въ разсужденіи необходимости доставать себѣ вседневное пропитаніе, не могутъ избѣгнуть причинъ сію болѣзнь производящихъ, то для предохраненія себя отъ оной, должны каждой день по утрамъ, прежде нежели приступяшь къ своей работѣ, принимать нѣсколько унцовъ деревяннаго масла, коровьяго масла, жирной вѣщины или иного чего нибудь жирнаго.

Также могутъ они себѣ для завтрака приготовить овсяную кашу съ молокомъ варенную, въ которую надлежитъ класть довольно количество коровьяго масла.

ГЛАВА XXV.

О поносѣ простомъ или мытѣ.

Естьли кто чаще обыкновеннаго ходитъ на низъ, и испражняется въ великомъ количествѣ матерією очень жидкою и водяною; то такое состояніе называется *простымъ поносомъ* или *мытомъ*.

Поносъ такой не всегда должно почитать болѣзнію, ибо онъ по большей части есть то спасительное природы дѣйствіе, чрезъ которое она себя освобождаетъ отъ скопившейся излишней мокроты или разнаго рода оспроты: слѣдовательно оно споспѣшествуетъ человѣческому здоровью.

Вообще всякой простой поносъ есть полезенъ, только бы онъ былъ ни очень сильной, ни очень продолжительной, и не дѣлаетъ больному не только никакой слабости, но еще приноситъ ему облегченіе.

Напротивъ естьли онъ будетъ очень сильной или весьма продолжительной съ изнуреніемъ пѣлесныхъ силъ, то такой поносъ всегда называется худымъ и припадочнымъ (*symptomata*).

И по тому простой поносъ, который самъ по себѣ есть полезенъ, можетъ быть вреденъ, естьли онъ съ самаго начала сдѣлавшись сильнымъ, и продолжаясь чрезъ долгое время, лишаетъ больного силъ.

еснѣ-

Естьли въ острѣхъ болѣзняхъ, когда знаки варенія болѣзненной маперіи уже были, и при шомъ въ переломной день случился поносъ, то надлежитъ его признавать всегда почти полезнымъ, особливо еслили ни мало не усиливаясь приноситъ облегченіе въ болѣзненныхъ припадкахъ, въ то время ничего особливаго не должно предпринимать, но продолжая тѣже самыя лекарства, все прочее поручить дѣйствію природы.

Еслилижъ при самомъ началѣ будетъ очень сильной, изнурительной и продолжившейся нѣсколько времени, то нужно его съ осторожностію привести въ умѣренность, однако вдругъ никогда не останавливать; въ семъ случаѣ всегда хорошее дѣйствіе производятъ лекарства подъ №. 80. 94. 133. предписанныя; а какъ скоро такой поносъ сдѣлается умѣреннымъ и болѣе не приводитъ въ слабость, то сіи лекарства опять надлежитъ оставить.

Но въ лихорадкахъ и притомъ злыхъ, когда больные очень уже слабы, нужно давать имъ лекарства крѣпительныя, а еслили такія лихорадки будутъ съ поносомъ, то вмѣсто лекарствъ подъ №. 80. 94. предписанныхъ давать одно лекарство, какое подъ №. 139. означено.

Еслилижъ къ укрощенію поноса прежнія вяжущія лекарства не довольны, то надлежитъ давать съ такою же осторож-
но-

носпію лекарсва, какія подѣ №. 95. 96. 97. показаны.

Но еспіли примѣчено будетѣ, что больной испражняенся низомѣ не надлежащимѣ образомѣ, припомѣ мучиенся спершимися вѣ кишкахѣ вѣпрами, и имѣенѣ часное на низѣ позываніе сѣ напугую, то должно шакому трудному дѣйсвию споспѣшесивоватѣ мячипельными промывапельными, или иными приличными лекарсвами, какія подѣ №. 3. 11. 12. 38. 39. 141. видѣнѣ можно.

Вѣ продолжипельныхѣ болѣзняхѣ поносѣ простой, вѣ разсужденіи шѣхѣ же обстояпельсвѣ, не иначе какѣ и вѣ оспрыхѣ болѣзняхѣ можетѣ бынѣ или полезнымѣ или припадочнымѣ шо еспѣ вреднымѣ.

Но припадочнымѣ всегда бываснѣ, еспіли случипнся вѣ болѣзняхѣ либо оспрыхѣ, либо вѣ продолжипельныхѣ вѣ шо самое время, когда уже болѣзнь долговременно продолжаенся, больной очень ослабѣлѣ, и соки вѣ немѣ уже испорчены и распуцены.

И по тому поносѣ случипннся вѣ гнилыхѣ лихорадкахѣ, водяной болѣзни, чахопкѣ, цынготной немочи, вѣ ракѣ, еспѣ всегда предвѣщаніемѣ смерпи.

Однако вѣ такомѣ случаѣ можно его сдѣлапѣ сноспнншнмѣ и умѣреннѣншнмѣ помощію лекарсвѣ подѣ №. 80. 94. 188. предписанныхѣ.

Часно поносѣ случается отѣ другой болѣзни или отѣ проспуженія, особливо
когда

когда дни будутъ очень жарки, а ночи холодны, или есѣли во время очень жаркой погоды напѣлся человѣкъ очень много студеной со льдомъ воды, такъ чпо опъ шого почувствуетъ онъ въ желудкѣ и въ кишкахъ чрезвычайной холодъ.

Есѣли поносъ простой произошелъ отъ одного проснуженія, то больные по большей части, прежде нежели спануть часно ходить на низъ, жалуются на колику, однако не чувствующъ великой жажды, ни жеспокаго жару, ни ошвражденія онъ пиши.

Такой поносъ очень легко вылечивается, есѣли только больной спанетъ держанъ себя въ теплошъ, чаще пиши чай насноянной изъ цвѣтшвъ ромашковыхъ или мяшъ, и прикладываетъ къ живону шершныя салфенки; сими средствами онъ возбуждается потъ или въ великомъ количествѣ моча, а поносъ по большей части и колика ушпахаютъ: есѣлижъ тому подобнаго не случится, то надлежитъ въ вечеру давать ему лекарство подъ №. 140. означенное. Есѣли больной употребивъ сѣ лекарство хорошо уснетъ и на слѣдующій день находитъ себя въ лучшемъ состояшии, то употреблять болѣе лекарствъ не нужно, но только содержа себя въ умѣренной теплошъ, пиши по чашкѣ прежняго чаю.

А есѣли поносъ не переснаетъ, то поутру надлежитъ опять давать лекарство

ство

ство подѣ №. 140. и когда нужда пре-
бываетъ, повторять оное же въ вечеру.
Симъ образомъ поносъ очень часто выле-
чивается, котораго причиною простуда,
притомъ не соединенъ ни съ какими ху-
дыми припадками и желудокъ не повре-
жденъ.

А когда кромѣ сего будетъ повреж-
денъ желудокъ, больной въ самомъ началѣ
болѣзни имѣетъ склизъ въ роту, жалуе-
тся на давленіе или на вѣтры, но пошѣ
часъ должно ему поставить мягчитель-
ное промывательное, или что всего лучше
дать лекарство подѣ №. 39. означенное.

Еслили желудокъ и кишки отъ сего
лекарства будутъ хорошо очищены, но
для укрощенія поносу довольно лекар-
ство подѣ №. 140. означенное.

Пища грубая, клейкая, трудная къ варе-
нію, желудка питье окисающее, излишнее
яденіе свѣжихъ и незрѣлыхъ лѣтнихъ ово-
щей, наипаче когда желудокъ слабъ, или
кто сверхъ сего много воды пьетъ, такъ
же испорченной хлѣбъ, гнилыя яйца, мя-
со, которое скоро порипится, и излишнее
опиященіе желудка, или объяденіе при-
чиняютъ поносъ. Такой простой поносъ
всегда бываетъ опасенъ и можетъ удобно
превратиться въ сильной кровавой поносъ,
еслили не употребить съ начала прилич-
наго леченія.

Есть.

Естьли больной признается въ такомъ своемъ проступкѣ, или очень отягощилъ свой желудокъ, естьли при томъ имѣетъ шошнопу или ошвращеніе отъ пищи, жалуется, что у его горько въ роту, безпрестанно исходящъ изъ желудка отпрыганія, и позываетъ его на рвопу; то тогда часъ должно дать ему рвопное подѣ No. 24. или подѣ No. 190. предписанное, дабы такимъ образомъ нечистота могла выпити изъ желудка рпомъ и низомъ, а въ вечеру послѣ сего давая лекарство подѣ No. 85. или 140. написанное.

Естьли по принятіи сихъ лекарствъ больной ночью спитъ спокойно, и на слѣдующій день болѣе не жалуется ни на отпрыганія, ни на шошнопу или позывъ на рвопу, и поносъ явно утихаетъ, то въ этотъ день никакихъ не должно употреблять лекарствъ, кромѣ чаю изъ цвѣтловъ ромашковыхъ или мяшъ, и въ вечеру опять давая лекарства подѣ No. 85. или 140. означенныя.

Естьли отъ того болѣзнь уменьшится, сдѣлается позывъ на пищу порядоченъ, то сей способъ леченія должно продолжая нѣсколько дней, пока болѣзнь во вся прекратится.

Однако естьли больной на третій день не имѣетъ никакой охоты къ ѣдѣ, въ роту еще горько и склизко, естьли давленіе въ желудкѣ, выпры въ кишкахъ еще не переставя, то поущу надлежитъ ему дать порошокъ подѣ No. 38. и въ вечеру повторить лекарство подѣ No. 140. предписанное.

Часть I.

О

Есть-

Естьли отъ того поносъ еще не унимается, то надлежитъ давати лекарства подъ No. 80. 94. 188. 191. означенныя, и естьли сѣи не скоро произведутъ желаемое облегчение, то потребно прибѣгнуть къ лекарству подъ No. 95 или 192. показанному.

Какъ скоро онъ употребленія такихъ лекарствъ примѣчено будетъ поправленіе, то тогда часъ надлежитъ оныхъ пріемъ уменьшитъ или давати ему такія, которыя полегче дѣйствуютъ, и естьли не случится новыхъ припадковъ, оныя продолжати, пока совсѣмъ прекратится поносъ.

Находятся нѣкоторые люди, у коихъ послѣ сильнаго гнѣва, великаго страха, послѣ нечаянной какой снраси поносъ дѣлается, при которомъ по большей части желчная мокрота въ великомъ количествѣ испражняется.

Такой поносъ всегда почти полезенъ, и по сему, естьли онъ умѣренъ и не долго продолжается, оснанавливати не должно; однакожь ежели больной чувствуетъ тяжесть въ желудкѣ, отвращеніе отъ пищи и превозмощіи въшры; то не бесполезно будетъ дать ему легкое слабительное, а на вечеръ порошокъ боль уполяющій подъ No. 193. означенный. Естьли же по употребленіи всего онаго поносъ еще продолжается и больного приводитъ въ слабость, то принимать онъ долженъ лекарство подъ No. 94. предписанное.

На-

Находясь также и такіе, у которыхъ бываеиъ поносъ каждую весну и осень.

Сии по большей части за день или за два до поносу ощущають въ бокахъ пониже реберъ и подъ ложкою тугость или напряжение, не имбють довольной охоты къ бдѣ, чувствуютъ легкую колику, вѣтры въ животѣ, ломъ въ поясницѣ, слабосиъ и дрожаніе въ колѣнахъ, наконецъ слѣдуетъ поносъ и спустя не много времени сии припадки сами собою утихаютъ, возвращаеиъ прежняя крѣпосиъ и бодросиъ въ силахъ.

Слѣдовательно когда все идеиъ симъ надлежащимъ порядкомъ, то лекарства возмущая природу могутъ нанести больному вредъ, однако иногда случаетъ, что больные не имѣя довольнаго очищенія низомъ, только тоскуюиъ и по тому надлежитъ имъ давать лекарство подъ No. 193. означенное. А лекарство подъ No. 94. положенное прилично даватиъ тогда, когда поносъ долгое время продолжаясь приводитъ больного въ расслабленіе.

Всякой жестокой и очень продолжительной поносъ, особливо когда съ нимъ выходитъ много слизи, причиняетъ сильную боль какъ въ животѣ, такъ и въ самомъ концѣ прохода съ напужнымъ испугимъ изпражненіемъ.

Въ семъ случаѣ пользуются лекар-
ства подѣ №. 80. 83. 94. 188. и про-
мывапельныя подѣ №. 194. 195. предпи-
санныя.

Г Л А В А XXVI.

О кровавомъ поносѣ.

Та болѣзнь называется поносомъ съ
рѣзомъ, когда страдающій не только ча-
сто ходитъ на низъ, но и сверхъ того
мучится жестокою, непрерывною и чрез-
вычайно тяжелою коликою.

Если изпражненія низомъ исходящъ
съ кровью, то называется поносомъ кро-
вавымъ.

Всякой проспой поносъ очень продол-
жительной и жестокой можеть удобно
превратиться въ поносъ кровавой.

Острая скопленная въ кишкахъ желчь,
худое питаніе шѣла, хлѣбъ не хорошо
выквашенный, испорченный, сдѣланный
изъ поврежденной или гнилой муки, мясо,
которое начало гнить или уже гнилое,
или которое изъ животныхъ зараженныхъ
сродною имъ болѣзнію, либо изъ животныхъ
отъ болѣзни умершихъ, стоячая гнилая
вода, въ которой много червей и прочихъ
наѣдомыхъ, воздухъ нечистой, гнилой,
притомъ сырой и теплой, словомъ всѣ шѣ
причины, отъ которыхъ можеть родиться
проспой поносъ, въ состояніи произвести
очень

очень опасный и сильной поносъ кровавый.

Не рѣдко кровавой поносъ бываетъ повѣтренный и заразительный и часто у многихъ въ короткое время опниваетъ жизнь.

Сей поносъ всегда гораздо съ большею соединенъ опасностію, нежели простой.

Еслили причину кровавого поноса нечистота и оспрая матерія находящаяся въ первыхъ пищепріемныхъ проходахъ, т. е. въ желудкѣ и кишкахъ то излеченіе онаго часто бываетъ не трудно.

Если ли жѣ оспрота уже испортила кровь и оную сдѣлала оспрою и разведенною, или еслили кровавой поносъ сдѣлался отъ соковъ въ шѣлѣ испорченныхъ, либо отъ другой болѣзни или инымъ какимъ нибудь образомъ или отъ заразы, то всегда бываетъ гораздо опаснѣйшимъ, упорнѣйшимъ, не рѣдко неизлечимымъ.

И такъ, еслили отъ приключившагося кровавого поноса больные пришли въ такую слабость, что жизненные силы не могутъ болѣе дѣйствовать, или когда соки уже такъ испорчены, распущены и сдѣлались гнилы, что поправитъ оныхъ ни коимъ образомъ не можно, то такой поносъ всегда оканчивается неизбѣжною смертію.

Еслили сей поносъ имѣетъ свое начало отъ испорченной крови, то должно все сипараніе къ тому единственно при-

лагать, чтобъ приличными лекарствами выгнать изъ крови нечистоту, поправить испорченные соки, и возбудить ослабѣвшія въ больномъ силы.

Спраждающимъ кровавымъ поносомъ, тогда часъ надлежитъ запретить имѣть обращеніе съ прочими какъ здоровыми такъ и больными, ибо сіи по большей части лека въ комнатахъ и больницахъ такъ заражаятъ и нечистымъ дѣлаютъ воздухъ, что и прочіе съ ними живущіе получаютъ или хуже самую болѣзнь, или злую гнилую лихорадку.

Также должно смотрѣть, чтобы никто не садился на то ночное судно и не выпускалъ бы мочи въ уринальной посудѣ, въ которые спраждающие кровавымъ поносомъ испражняются.

Въ сей болѣзни должно всемѣрно стараться, что бы воздухъ въ комнатѣ, въ которой лежитъ такой больной, былъ часто перемѣняемъ, чистъ и свѣжъ, ибо сей воздухъ къ возобновленію здоровья весьма много способствуетъ.

И по тому съ самаго начала должно во первыхъ прилѣжно извѣскивать причины кроваваго поноса.

По томъ надлежитъ смотрѣть, начинается ли только еще кровавой поносъ, или онъ уже давно мучитъ?

И примѣчать каковъ онъ былъ при самомъ началѣ, съ лихорадкою ли, или безъ лихорадки?

Также

Также не меньше должно наблюдать, съ самаго ли начала сдѣлался онъ жестокимъ, опаснымъ и обезсиливающимъ, или имѣетъ ли еще больной у себя довольныя силы, напослѣдокъ примѣчать, опасны ли съ нимъ сопряжены припадки?

Еслили сей поносъ безъ лихорадки, безъ великаго пошерянія силъ произошелъ онъ причинъ выше объявленныхъ, то съ самаго начала больному должно дать пошпру порошокъ подъ No. 24. или 190. а въ вечеру лекарство подъ No. 140. предписанное.

На другой день, когда болѣзнь не уменьшается, а больной еще въ силахъ, надлежитъ поступить такимъ же образомъ какъ и въ первый день.

Еслилижъ больной на другой день сдѣлался очень слабъ, то вмѣсто прежнихъ лекарствъ, пошребно ему давать лекарство подъ No. 94. означенное, а когда тошнота еще продолжается, также боль въ головѣ и въ животѣ не уменьшается и испражнения его еще очень дурно пахнутъ, то на третій день опять должно повторить пошпру порошокъ подъ No. 24. или 190 а въ вечеру лекарство подъ No. 190. означенное.

Ибо ничто болѣе и столько не пользуетъ, какъ еслили съ самаго начала выгнать оспроу рвотнымъ или слабительнымъ, въ противномъ же случаѣ тихой кровавой поносъ часно превращается въ опасной или тяжелой.

Примѣчено, что лекарства подѣ №. 24 и 190 употребленные больного не только не ослабляютъ, но еще болѣе дѣлаютъ облегченія, еслии будутъ они употреблены при началѣ болѣзни.

И такъ, еслии такимъ пользованіемъ причина болѣзни уменьшится, то надлежитъ давать лекарства подѣ №. 80. 94. 188. 191. показанныя, дабы симъ образомъ остатки оспроты находящейся еще въ нѣдрахъ могли поперянь всю свою силу и боль бы съ колющемъ и чрезмѣрная въ кишкахъ чувствительность утихла.

Еслии боль сдѣлается легче, больной не такъ часто ходитъ на низъ, испражненія не только дурно пахнущи и имѣютъ цвѣтъ пригодной, то болѣе ничего не остается дѣлать, какъ только выше объявленные продолжать лекарства.

Еслииже кровавой поносъ не унимается и сверхъ сего больной еще жалуется на непреспаанное падуваніе живота, отпрыганіе, тошноту, то знакъ, что сіи одни лекарства не могутъ истребить нечистоты. И для того въ семъ случаѣ надлежитъ давать ему черезъ три дни по утрамъ порошокъ подѣ №. 193. а по вечерамъ лекарство подѣ №. 85. или 140. предписанное, въ промежуточные же дни употребляя лекарства прежде показанныя.

Еслии не будетъ болѣе уже никакихъ знаковъ, по которымъ бы можно догадываться, что въ первыхъ пищапріемныхъ

каналахъ находяпся еще какія либо нечистоты, однако при томъ болѣзнь не упи-хаетъ, то можно употреблять легкія вязательныя лекарства, какія подъ No. 95. 192. предписаны.

Вообще всѣхъ крѣпко вязательныхъ до шѣхъ поръ не должно употреблять, пока вся острота будетъ во взя выгнана изъ шѣла, иначе останетъ шупъ запертой непріятель, копорый произведетъ жестокою и опасную болѣзнь.

Еслилижъ кровавой поносъ есть чрезмѣрно жестокой, онъ копорого больной приходитъ въ великую слабость, при томъ изъ показанныхъ лекарствъ ни одно не дѣлаетъ облегченія, то въ такомъ случаѣ не должно опасаться давать вязательныя лекарства; когда же припадки нѣсколько утихнутъ, то оныя опять надлежитъ оставитъ, а пользоваться прежними легкими лекарствами.

Когда при самомъ началѣ сей кровавой поносъ соединенъ былъ съ лихорадкою или жаромъ, то надлежитъ примѣчать, какое больной имѣетъ бие въ жилахъ? естьли полное, твердое и шугое, то томъ часѣ должно пуститъ ему кровь и смотря по его силамъ и по болѣзненнымъ припадкамъ располагать леченіе. При томъ должно смотрѣть, нѣтъ ли воспаления въ кишкахъ или въ другомъ какомъ мѣстѣ; еслили жъ окажутся знаки воспаления, то надлежитъ сему приличныя лекарства,

ибо прежнія въ такомъ случаѣ вредятъ. Однако должно всемѣрно спарашься, чпобы холодительными лекарствоми не умножишь кроваваго поносу, но сколько возможно его унимать.

И по шому въ семъ случаѣ надлежитъ чого давань мягчительныхъ отваровъ подъ No. 8. 40. 88. предписанныхъ, ибо они не только имѣютъ противную силу воспаленію, но и припупляютъ остроу соковъ причиняющихъ кровавой поносъ, слѣдовательно жеспокость болѣзни унимаютъ.

Есшли жъ больной имѣетъ въ роту горечь, часныя съ шошолою опрыганія, чувствуетъ шяжестъ въ желудкѣ, сильное надуваніе и колику въ живонѣ, есшли испраженія низомъ дурно пахнутъ, гнилы, и будутъ знаки показывающіе, что въ желудкѣ и въ кишкахъ много находится оспрой матеріи, то вмѣсто прежнихъ лекарствъ, надлежитъ больному давань лекарства подъ No. 11. 12. 39. 141 показанія, дабы такимъ образомъ очистивши первые пицеврѣмные проходы, уменьшить или вовсе испребишь причину кроваваго поноса.

Когда выпустивъ довольное количество крови и употребивъ приличныя лекарства, лихорадка и воспаленіе прекратится или утихнетъ такъ, что уже не остается ничего опасаться, то надлежитъ давань лекарства пригодныя для излеченія кроваваго поноса; есшли жъ сей

сей поносъ утихнеть и употребляемыя лекарства кажутся быть довольны къ совершенному прогнанію болѣзни, то оныя должно продолжати безъ всякой перемѣны.

А естли съ начала кроваваго поносу бѣненіе въ жилахъ хотя ощущается лихорадочное, однако нешвердое, неполное и нешугое, и нѣтъ знаковъ воспаления и многокровія, то крови пускати не нужно, но естли больной имѣетъ довольныя силы, то въ такомъ случаѣ шотъ самой способъ леченія имѣетъ мѣсто, который былъ похваляемъ въ кровавомъ поносѣ безъ лихорадки, однако не должно почитати за ненужныя тѣ отвары и лекарства, какія упомянушы были въ поносѣ съ лихорадкою.

А когда больной при самомъ началѣ сей болѣзни очень ослабѣлъ, бѣненіе въ жилахъ ощущается слабое, мягкое, малое и дрожащее, или медлительное, неровное, то такой знакъ всегда есть худой и предзнаменуетъ опасной кровавой поносъ.

Почему прилѣжно надлежитъ испытать, можно ли больному дать рвотное или проносное безъ нанесенія ему вреда? естли окажется, что такія лекарства не причиняютъ его силамъ и здоровью никакого урону, то шотъ часъ должно ему дать одно какое нибудь изъ лекарствъ подъ №. 24. 192. или по крайней мѣрѣ лекарство подъ №. 193. означенное.

Ко-

Когда сіи произведутъ ожидаемое дѣйствіе, то надлежитъ дать лекарство унимающее боль подѣ №. 80. 94. 188. 191. а по вечерамъ ставитъ промывательныя подѣ №. 194. 195. предписанныя, и велѣтъ больному кромѣ всего сего пить чай подѣ №. 21. 251. 257. показанный; на слѣдующій день опять должно сіи лекарства продолжать, а по утрамъ и по вечерамъ ставить обѣявленное промывательное. Если бѣненіе въ жилахъ сдѣлается полнѣе, силы умножатся, большой чрезъ часъ или чрезъ два спитъ спокойно, изпраженія низомъ уже не такъ жидки, водяны, водяни и проч. то можно надѣяться, что онъ выздоровѣетъ.

Въ семъ случаѣ надлежитъ продолжать тѣ же самыя лекарства; если же при возобновленіи тѣлесныхъ силъ будутъ знаки находящейся еще въ кишкахъ нечистоты, то при прежнихъ лекарствахъ нужно дать одинъ или два раза порошокъ подѣ №. 193. предписанный, дабы такимъ образомъ больной могъ скорѣе выздороветъ.

Если такія лекарства къ укрощенію жестокости кроваваго поносу не будутъ довольны, то чтобы унять столь сильной поносъ, должно давать лекарства, кошорыя подѣ №. 95. 96. 97. 192. показаны.

Но когда больной въ началѣ болѣзни сдѣлается такъ слабъ, что нельзя ему
дать

дасть никакого лекарства испражняющаго, то должно разсмотрѣть, не произошла ли такая его слабость отъ того, что онъ очень часто ходитъ на низъ? или отъ того, что естественныя его силы отъ злой и заразительной причины приведены въ крайнее изнеможеніе?

Въ первомъ случаѣ тогда часъ надлежитъ дать больному лекарства унимающія поносъ, какія подъ №. 95. 97. 192. показаны; а какъ скоро примѣчено будетъ, что болѣзнь уже уменьшилась, то такія крѣпко вяжущія лекарства или съ великою осторожностію или вмѣсто сихъ давать не слѣдуетъ, которыя полегче дѣйствуютъ.

А во второмъ случаѣ надлежитъ способствовать ослабѣвшимъ естественнымъ силамъ лекарствами возбуждающими и укрѣпляющими, какія подъ №. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 27. 28. 30. 31. 177. 189. видѣны можно, также приложить къ запялку и къ ножнымъ икрамъ нарывной пластырь.

Если примѣчено будетъ, что бѣненіе жилъ отъ того снаноившся полнѣе и силы умножаются, съ которыми по большей части поносъ утихаетъ, то въ то время больной можетъ съ особливою своею пользою употреблять лекарства, какія приличны въ злой гнилой лихорадкѣ.

Если жъ больной хотя получилъ довольныя силы, но поносъ кровавой не
уни-

унижается, то должно его пользоваться прежде показаннымъ образомъ.

Изъ сего слѣдуетъ, что есѣли больной не чувствуетъ въ своихъ силахъ ни малѣйшаго укрѣпленія, то жизнь его находится въ великой опасности.

Когда поимѣчено будетъ по мутной мочѣ имѣющей опвратипельной запахъ, по гнилымъ и вонючимъ испражненіямъ и смѣшаннымъ съ распущенной кровью, или по другимъ знакамъ, что соки уже испорчены и начинаютъ гнить, то надобно непремѣнно давать такому больному лекарства подъ No. 29. 93. 166. и 169. предписанныя.

Когда сѣи больные не спятъ и безпрестанно мучаются колошемъ въ кишкахъ или, понужденіемъ на низъ съ сильною напругою, но безъ испражнения или съ задержкою, то кромѣ прежнихъ лекарствъ нужно еще каждой день два или три давать по десяти или пятнадцати капель лекарства подъ No. 197. означеннаго.

Опъ чего часто случается, что припадки уменьшающіяся, больные ощущаютъ въ душѣ и въ шлѣбѣ бодрость; біеніе въ жилахъ становится крѣпче и слѣдуетъ спокойной сонъ, послѣ котораго бываетъ полегче.

Въ семъ случаѣ часто высыпаютъ по всему шлѣбу или гнилыя пятна (petechiæ) или прыщевая сыпь (milliaria).

Есѣ-

Естьли опѣ сего сдѣлается явное и вѣрное облегченіе, то можно надѣяться, что больной въ скорости выздоровѣетъ.

Естьлижѣ всѣ сіи лекарства не сдѣлаютъ никакого вспоможенія и прыщевая сыпь или пяпина пурпуроваго, чернаго цвѣту выступающѣ на поверхность пѣла съ холоднымъ потомъ, біеніе въ жилахъ непрестанно уменьшается и слабѣетъ, дыханіе спановишся тяжелѣе, моча выходящѣ темная, черная и вонючая, испражненія низомъ гнилыя или смѣшанныя съ гнилою кровью, живощѣ надуваются, руки и ноги холодѣющѣ, губы блѣднѣющѣ или изъ черна синѣющѣ, показываются судороги и бреженъе, то нѣтъ ни малѣйшей надежды въ больномъ, ибо сіи знаки сущѣ предзнаменованіемъ смерти.

Естьли послѣ жеспокаго кроваваго поноса больной чувствуешѣ въ кишкахъ жженіе и понужденіе на низъ съ великою но пустою напугою, то сіи припадки должно пользоваться шѣмъ способомъ, какой предписанъ прежде въ самомъ кровавомъ поносѣ.

Естьли поносъ простой или кровавой будешѣочень рано по неосторожности остановленъ крѣпкими вяззепельными лекарствами, то часто опѣ таковаго скоропостижнаго леченія живощѣ твердѣетъ, больные имѣющѣ отвращеніе опѣ всякой пищи, и бываетъ у нихъ на лицѣ цвѣтъ желтой и земляной.

Тако-

Таковымъ больнымъ надлежитъ давать черезъ два или черезъ три дни порошокъ подъ No. 38. означенный и дабы они не занемогли опять прежнюю болѣзнь, то въ тотъ же самый день, въ которой они приняли проносное должно въ вечеру имъ давать лекарство подъ No. 85. или подъ No. 140. предписанное.

Если къ простому поносу или поносу съ кровью присоединится жестокая рвота, такъ что больного верхомъ и низомъ сильно и чрезвычайно несешь, то должно знать, что сія болѣзнь сдѣлалась уже крайне опасною, и не рѣдко случается видѣшь, что такіе больные въ нѣсколько часовъ становящіяся вовсе сухи, худы и слабы, а иногда въ короткое время умирающъ, если тотъ часъ имъ не пособить дѣйствишельнѣйшими лекарствами.

Сія болѣзнь, называемая поносъ съ рвотою, (cholera) часно происходитъ отъ чрезмѣрной желчи сдѣлавшейся уже острою, или когда обременится желудокъ и кишки гнилою мащеріею, масляною, пригорьклою, или пищею неспособною къ варенію желудка, также причиняютъ сію болѣзнь молодое виноградное вино и прочіе закисающіе напитки.

И такъ если что нибудь тому подобное приключится, и больной имѣетъ еще въ себѣ столько силъ, что можетъ сносить изпразнятельныя лекарства, то при-

прилично давашь ему въ разсужденіи раз-
личной причины, какъ то бываетъ въ
щемошѣ, рвошное или проносное, либо
пишье жидишельное, кисловапое, или
спавишь промывательное, и сіи средства
должно продолжашъ сколько времени,
сколько припадки будутъ того требовать
и силы больного позволятъ.

Часто такимъ образомъ какъ причина
такъ и самая болѣзнь испребляющія, и
не оспаются болѣе опасаться никакихъ
худыхъ слѣдствій.

Но часто бываетъ, что желудокъ и
кишки отъ нечисшны освобождаются,
однако болѣзнь ни мало не уменьшается,
рвота не утихаетъ, поносъ не перестаетъ
и больной часъ отъ часу приходитъ въ
большую слабость. Въ семъ случаѣ безъ
замедлѣнія должно даваъ черезъ пол-
часа по двѣ ложки лекарства подѣ No. 126.
или 192. означеннаго, пока болѣзнь нѣ-
сколько утихнетъ.

Естьлижъ больной чрезвычайно поху-
дѣлъ, шѣло его имѣетъ видъ трупa, очень
сухо и такъ уже слабо, что не лзя от-
важиться дать больному никакого испра-
вишельнаго лекарства безъ нанесенія ему
великой опасности въ разсужденіи его жиз-
ни, то шотъ часъ надлежитъ такому
больному даваъ каждую четверть часа
по двѣ ложки лекарства подѣ No. 199.
означеннаго, пока почувствуетъ онъ въ
себѣ облегченіе, а какъ скоро сіе пока-

Часть I.

П

жеться,

жеться, то сего лекарства не нужно такъ часто давать, однако продолжанъ его до тѣхъ поръ, пока все непорядочное движеніе утихнетъ.

Естьлижъ какъ сіи такъ и прежнія лекарства ничего не пособяишь, то больные будучи приведены въ крайнее безсиліе начинаютъ впадать въ обморокъ, конечности тѣла у нихъ холодѣютъ и судорогами сосавы тѣла сводитъ, на концѣ при судорожныхъ движеніяхъ и въ чрезвычайной тоскѣ все сіе дѣйствіе оканчивается смертію.

ГЛАВА XXVII.

О воспаленіи почекъ.

Воспаленіе можетъ случиться въ обѣихъ почкахъ, однако чаще бываетъ въ одной только, и при томъ весьма часто примѣчается въ лѣвой.

Одержимые сею болѣзнію жалуются, что у нихъ въ поясницѣ, гдѣ почки лежатъ, очень болитъ, колѣтъ, сжѣтъ; и сіи часни, если допронуться къ нимъ руками, очень горячи и чрезвычайную боль чувствуютъ; въ постели особливо перяной или шерстяной по причинѣ теплоты не могутъ лежать, боль по большей часни бываетъ оцупишельна около паховъ и мочевого пузыря, часто нога съ той споро-
ны,

ны, въ которой воспаленіе, корчится съ болью и нѣмѣнѣ, у мужчинъ иногда шуляна болятъ и вверху припнягиваются, при шомъ больные мучатся неснсною жаждою и сильною лихорадкою. Когда воспаленіе занимаетъ обѣ почки, то въ такомъ случаѣ моча почини всегда запирается или хопя и-иснекаепѣ, но только очень мало, а припомъ съ превеликою болью и рѣзомъ, имѣепѣ цвѣтъ красный, однако гораздо чаще бываетъ она бѣла и водяна.

Лекарства мочегонительныя въ семъ случаѣ очень вредятъ, ибо могутъ умножить воспаленіе и въ короткое время произвести антоновъ огонь.

Не рѣдко сія болѣзнь совершенно вылечивается помощью смягчительныхъ холодительныхъ опваровъ, какія подѣ №. 8. 40. 98. предложены, также должно снаружи къ больнымъ мѣстамъ прикладывать теплыя припарки, составленныя изъ смягчительныхъ травъ, и слегка перепѣ мазью подѣ №. 128. означенною, спавишь больному смягчительныя промывательныя и смонря по своему лихорадки, по жестокости боли, и по силамъ немоцнаго нужно пустить кровь; такой способъ леченія всегда бываетъ съ желаемымъ успѣхомъ какъ и въ прочихъ воспалительныхъ болѣзняхъ.

При самомъ началѣ воспаленія почекъ, естли опкроепѣ у мужчинъ текучей почечуй, часно въ короткое время испре-

блаетъ оную немощь или по крайней мѣрѣ дѣлаетъ ее довольно сносною, такуюже пользу доставляетъ въ женскомъ полѣ довольное испеченіе мѣсячныхъ кровей.

Еслили на третій или на четвертой день станетъ истекая моча густая, мушная, шемная, или смѣшанная съ кровью, то лихорадка и боль уменьшается, отъ чего не рѣдко воспаленіе нечувствительноразходившися и пропадаетъ.

Часто случается видѣть на четвертой или на седьмой день болѣзни мочу густую, мушную, кошорая какъ только будетъ выпущена въ стеклянной какой сосудѣ, потѣ часъ оказываеиъ у себя внизу много осадки, состоящей изъ нѣкакой склизы на гной похожей, по кошорой можно судить о прекращеніи болѣзни, когда сверхъ сего припадки уже явственноразутихли.

Еслили въ воспаленіе почекъ не унимается, и нѣтъ никакого нѣлеснаго испражненія переломнаго, то часто оно превращается въ нагноеніе.

Сие познается изъ знаковъ описанныхъ въ своемъ мѣстѣ о нагноеніи воспаленія легкаго, гдѣ показано, какимъ образомъ должно оно лечишь; однако въ семъ случаѣ, еслили изъ нарыва сдѣлавшагося отъ нагноенія почекъ, выйдетъ матерія чрезъ мочевыя дороги и на днѣ стекляннаго сосуда усмотренъ будетъ насупающій гной, должно давать больному легкія мочегонитель-

ипельныя лекарства, какія подѣ №. 46. 72. видѣны можно.

Въ то время мочу должно прилѣжно рассмотреть и испытать, припомѣе ли примѣчено будетъ, что лихорадка помалу отступаетъ, гнойной отсѣдъ въ мочи убавляется, то надлежитъ давати пилюли подѣ №. 86. или 108. показанныя, дабы такимъ образомъ очистившуюся рану заживити.

Иногда при нагноеніи почекъ снаружи бываетъ видна на поясницѣ опухоль, къ которой поспѣе часъ должно приложить смягчительную припарку, и какъ скоро окажется въ ней гной, то не теряя ни мало времени, надлежитъ ее по правиламъ искусства прорѣзати, и открытую держати до тѣхъ поръ, пока внутреннія части сей раны будутъ приведены въ первое ихъ состояніе, однако въ семъ случаѣ очень часто на семъ мѣстѣ остаются неизлечимые рыпики (fistula).

Еслилижѣ нарывъ не прорвется ни снаружи къ поверхности тѣла, ни внутрь въ мочевые проходы; но гной въ немъ часъ отъ часу умножаясь, часто изнуряетъ всю почку и причиняетъ сухотную неизлечимую лихорадку. Но часто гной дѣлаетъ самъ дорогу въ ближайшія части, которыя разбѣдая новыя рождаетъ раны, и производитъ въ нихъ ямки и рыпики, за которыми по перевертыванію многихъ мученій слѣдуетъ самая смерть. А часто

такой нарывъ прорывается внутрь, изъ котораго гной вытекаетъ и садится въ пустоту таза, (pelvis) отъ чего наконецъ рождается ничемъ не отвратимая сухая водяная немочь или, иная не меньше опасная болѣзнь.

ГЛАВА XXVIII.

О простудѣ или простудной лихорадкѣ, о ломѣ въ составахъ и о грыжѣ.

Когда въ одной или во многихъ частяхъ тѣла нечаянно сдѣлается опухоль сопряженная съ жаромъ и болью, то такая немочь обыкновенно называется *простудою* или *флюсомъ*, но *горячимъ* или *лихорадочнымъ*; еслилижъ будетъ безъ жару и безъ великой боли, называется *холоднымъ* или *простудою безъ лихорадки*.

Флюсъ безъ лихорадки часто бываетъ долговременнѣе и продолжительнѣе лихорадочнаго, но сей какъ бываетъ всегда соединенъ съ лихорадкою или съ жаромъ, то по сему онъ именуется *горячкою простудною*.

Еслили такая флюсная матерія засядетъ въ членахъ и составахъ, и въ нихъ произведетъ съ жаромъ мучительную боль, то въ то время называется *ломъ въ составахъ*; (arthritis) еслилижъ сія боль остановится въ какой нибудь мягкой части тѣла.

тѣла, особливо въ томъ мѣстѣ, гдѣ соединяются мѣсистыя части, называется *грыжею* (rheumatismus)

Различныя сѣи наименованія не пребываютъ въ леченіи великой разности, по тому что причина ихъ таже и одна, по чему въ грыжѣ тѣ же самыя лекарства имѣютъ мѣсто, какія въ ломѣ соспа-вовъ производящъ хорошее дѣйствіе.

Въ прочемъ важность дѣла въ томъ только состоитъ, чтобы порядочно примѣнить, соединена ли болѣзнь съ лихорадкою и скоротечна ли, или безъ лихорадки, то есть продолжительна?

Ломъ въ соснавахъ, который сопряженъ съ лихорадкою, по большей части случается въ то время, когда послѣ теплой погоды вдругъ сдѣлается стужа или воздухъ съ шуманомъ долгое время продолжается.

При самомъ началѣ такихъ болѣзней бываютъ ощутительны въ тѣлѣ дрожь, ознобъ и великая слабость, жилы начинаютъ биться скорѣе и шибче, больной мучится головою болью, жаромъ, жаждою и выпускаетъ много мутной мочи.

Спустя нѣсколько времени, а часто и въ самомъ началѣ больные чувствуютъ жестокую боль, которая будучи переходящая, ощущается то въ томъ то въ другомъ мѣстѣ; но по большей части такая боль ходитъ по составамъ, и иногда за-

разивъ подреберныя части раждаетъ жестокое колошье въ бокахъ.

Послѣ какъ сія боль, переходя день или два изъ одного мѣста въ другое, напоследокъ останавливается крѣпко къ одной какой нибудь части или во многихъ и на оныхъ не рѣдко производитъ бѣловатую опухоль, но иногда шугую и соединенную съ жаромъ и болью; еслили такая боль въ то время ушверднися во многихъ соснавахъ, то часто шѣло спановишися вовсе неподвижнымъ, и бываешъ боль весьма жестокая особливо когда она засядешъ въ поясницѣ, крестницѣ и въ плечахъ. Но иногда на поверхности шѣла не примѣчается великой опухоли, однако зараженная часть всегда горитъ, рѣшетъ и онъ легчайшаго прикосновенія жестоко болитъ.

Такия боли усилвишися къ вечеру, не даютъ больному почти всю ночь спать, наносятъ ему великое безпокойство и часто причиняютъ брѣдъ.

Не рѣдко случается, что сія боль занимаетъ какъ наружныя, такъ и внутреннія части, и напоследокъ засѣдаетъ въ однихъ внутреннихъ и въ оныхъ на долго остается, онъ чего иногда приключается жестокой кашель и трудное дыханіе, часто нестерпимая головная боль, сильная боль въ животѣ вмѣстѣ съ рвою, колика, запоръ мочи, воспаленіе почекъ и проч.

Но

Но чтобъ узнать, съ колько великою опасностію сопряжена сія болѣзнь, то надлежитъ вниманіе усилить на одержимыя ею часши, особливо шѣ, которыя необходимы къ сохраненію жизни.

Часто сія боль при самомъ своемъ началѣ, не переходя другихъ частей тѣла засѣдаетъ крѣпко въ одномъ какомъ либо мѣстѣ.


Иногда сія болѣзнь спустя не много дней, отступаетъ и проходитъ весьма благополучно; но гораздо чаще она бываетъ упорною, и продолжается такою чрезъ нѣсколько недѣль или мѣсяцовъ сряду, либо перемежается въ продолжительныя болѣзни, ослабляетъ всѣ тѣ сосисавы, которыя она занимаетъ, и часто наноситъ сухошную лихорадку.

Еслили первое нападеніе или приступъ (paroxysmus) сей болѣзни не очень жестокъ, и больной пошъ часъ съ самаго начала спаненіа осиперсгашся отъ всякой вновь проснуды, будетъ спосибшесгговать испаренію легкимъ поповымъ питьеиъ и лежашъ въ шеплой носшели, то можетъ въ два или три дни онъ оной ссвободиться.

Въ легкихъ припадкахъ довольно будетъ, еслили онъ спаненіа три раза въ день принимать порошокъ подъ №. 1. означенный, и заивать чаики по двѣ шравныиъ чаемъ подъ №. 13. также весьма

II 3

пользу-



пользуютъ и лекарства подъ №. 8. 40. 46. 72. 116. предписанныя.

Но при всемъ семъ должно совѣщовать больному, что бы онъ нѣсколько времени поудержался выходить на холодной воздухъ особливо на сырой, и сколько можно осиперегался бы онъ сквознаго вѣтра, иначе, естли онъ не послушаетъ такихъ совѣщевъ, можетъ въ скорости оный впаси въ сію болѣзнь, которая впрочемъ напавши бываетъ опаснѣе и чорнѣе нежели прежде.

Естлижъ съ самаго начала болѣзни окажется жестокая лихорадка и боль, то должно лечить болѣзнь нѣмъ самымъ образомъ, каковъ предписанъ въ воспалительной лихорадкѣ.

И такъ въ семъ случаѣ смотря по силамъ больного и припадкамъ должно ему пускати кровь, давати пить много ошваровъ мягчительныхъ, разводящихъ, холодительныхъ и другихъ тому подобныхъ, какія подъ №. 6. 7. 8. 9. 121. предписаны, парити больныя часи густыми разбивающими припарками, однако должно всемирно сщаранься, что бы больной непростудился, ибо такой проступокъ не проходитъ безъ наказанія.

Естли больной не довольно ходитъ на низъ, то надлежитъ ему посщавити промывательное и давати лекарства подъ №. 11. 12. 39. 141. или давати черезъ три дни

дни проносное подѣ №. 3. 5. 14. 167. предписанное.

Естьли моча выходитъ въ довольно количествѣ, при томъ густа и мушная, то всегда скорое и великое приноситъ облегченіе въ болѣзни, копорая, естьли будетъ бѣла и воляна, то показываетъ, что болѣзнь еще продолжися долгое время.

Естьли боль уже утихнеть, лихорадка уменьшился, опухоль сдѣлается мягче и слабѣе, то проносныхъ повпорядку сполько разъ не нужно, однако надлежитъ прилѣжно употреблять прежнія лекарства и отвары.

Жестокая боль, копорая всегда съ большею силою свирѣпствуетъ при наступленіи ночи, заспавляетъ больныхъ проводить многія ночи безъ сна, копорая хотя на разсвѣтъ нѣсколько и утихаетъ, однако не на долго.

Когда при продолженіи чрезъ нѣсколько дней потребныхъ лекарствъ и пустивъ въ надлежащемъ количествѣ крови, лихорадка сдѣлалась уже умѣреннѣе и нужныя шѣлесныя испраженія въ порядкѣ: то можно больному давать легкое усыпительное лекарство подѣ №. 41. 80. 92. означенное, копорое естьли данъ съ начала болѣзни, то не только не дѣлаетъ никакого пособія, но еще большій причиняетъ вредъ.

Одна-

Однако въ сей болѣзни никогда не должно давать въ вечеру (какъ въ прочихъ болѣзняхъ обыкновенно бываетъ) усыпительныхъ лекарствъ, ибо въ то время по большей части, какъ лихорадка такъ и боль умножается, и по тому сіи лекарства могутъ произвести въ больномъ еще большій жаръ, безпокойство, тоску и слабость, однако не производя никакого сна; почему полезнѣе давать сіи лекарства по утру, когда лихорадка и боль утихнутъ, когорыя принявъ приходишь пріятной сонъ и продолжася нѣсколько часовъ, онъ когорого больные пробудившись чувствуютъ въ себѣ облегченіе и нѣкоторое укрѣпленіе въ своихъ силахъ,

Еслили боль столько утихнетъ, что больная часть можетъ допускать къ себѣ легкое прикосновеніе и двигаться безъ великой боли, то можно надѣяться, что боль въ скорости совсѣмъ прекратится; въ такомъ случаѣ смягчительныя припарки должно оставить, а довольно много естьли больную часть тереть слегка нагрѣтою байкою или фланелью и хранишь больное мѣсто въ теплотѣ, однако вышеобъявленныя лекарства надлежитъ продолжать до тѣхъ поръ, пока больной выздоровѣетъ.

Еслили жъ всѣ показанныя лекарства употребивъ, боль не перестаетъ, то кромѣ прежнихъ надлежитъ давать порошокъ подъ №. 130. означенный, или когда ли-
хо-

хорадка по прежнему свирѣпствуетъ съ жестокостію, то вмѣсто того упошреблянь подѣ №. 186. показанной, посредствомъ котораго часто болѣзни въ короткое время и явно утихаетъ.

Но когда лихорадка нѣсколько утихла и находясь только на поверхности тѣла по разнымъ мѣстамъ мягкія опухоли, припомъ ощущается еще нѣкоторая боль, то сіи болѣзненные осипки удобно извлекаются, есѣли при произведеніи легкихъ треній давать больнымъ лекарствъ подѣ №. 18. 68. 144. 178. означенныя.

Иногда по выступленіи по всему тѣлу прыщевой сыпи съ немалымъ облегченіемъ больного, утихаетъ какъ ломъ въ составѣхъ шакъ и лихорадка; есѣли въ то время не случится никакого особливаго припадка и больные находясь въ силахъ, то въ леченіи ничего не нужно перемѣнянь, но продолжатель прежде объявленные отвары и легкія лекарствъ.

Иногда не только составы но и все тѣло, голова и лице распухаютъ; въ такомъ случаѣ продолжаемый до сего времени способъ леченія имѣетъ мѣсто, есѣли только жестокая лихорадка и прочіе припадки будутъ тѣ же самыя, какіе и прежде сего были.

Не рѣдко случается, что опухоль занимающая нѣкоторые составы и члены нечаянно пропадаетъ и вскорѣ на другомъ мѣстѣ оказывается въ большемъ видѣ.

Тако-

Таковую опухоль, когда ощущается въ ней колыханіе, тотъ часъ должно вскрыть и выпустить содержащуюся въ оной матерію, дабы она не могла опять перейти въ другое мѣсто, и симъ самымъ подвергнуть больного жизнь новой опасности, сія истекающая матерія обыкновенно бываетъ желта, склизка и клейка.

Изъ вскрытыхъ сихъ опухолей часто долгое время лечитъ матерія, иногда шакія опухоли съ трудностію заживаютъ, однако въ началѣ не должно препящивать сему исцеленію, но только покрыть рану сухою корпсью, и по прошествіи нѣсколькихъ дней прикладывать къ ранѣ корпсью обмоченную въ отварѣ изъ омеги или боли-голова (сисута) травы, которую перемѣняющъ должно четыре раза въ день, отъ чего леченіе сей матеріи умньшается и рана благополучно засыхаетъ.

Еслилижъ сии опухоли занимающія сосисавы и члены вдругъ скроются, и не окажутся нигдѣ на наружной поверхности тѣла, при чемъ больной съ трудностію дышашъ спашетъ, или лежатъ, погруженъ въ глубокой сонъ, то такой знакъ очень худое предзнаменуетъ, ибо сии больные не рѣдко бывающъ потомъ очень близки къ смерти.

Въ такомъ весьма опасномъ случаѣ тотъ часъ должно положить на зашылокъ и къ ножнымъ икрамъ нарывные пластыри, сшавить чаще промывательныя и да-
вать

вать лекарства подъ №. 46. 71. 72. предписанныя.

Когда послѣ сего больные чувствуютъ въ поясницѣ боль и напряжение и частое позываніе къ испусканію мочи, то такіе припадки по большей части бывають хорошимъ знакомъ, ибо въ это время всегда почти испускаетъ моча густая, мутная и съ осадкою. Если сие случится съ облегченіемъ больного, то такія средства надлежитъ прилѣжно продолжать, и ранѣ произведенныхъ нарывными пластырями не надобно вдругъ заживлять; но приходя къ нимъ такія лекарства, которыми бы изъ нихъ теченіе мокроты продолжали.

Если сдѣлается поносъ, которымъ испражняется склизкая и водяная маперія, то сему надлежитъ споспѣшествовать легкими лекарствами подъ №. 11. 12. 39. означенными, который поносъ часто приноситъ опмѣнную пользу.

Иногда сии больные начинаютъ кашлять и въбѣсно прежнихъ плѣсныхъ испражнений выплевываютъ много клеккой и склизкой мокроты, въ такомъ случаѣ приличны лекарства подъ №. 8. 32. 33. 34. 111. предписанныя.

Еслижъ не случится ни какихъ такъ испражнений, то сии больные въ короткое время прекращаютъ свою жизнь, которыхъ трупы если вскрыть, то въ лупомѣ грудной или въ головѣ много находится водяной и клеккой маперіи.

Часто

Часто послѣ жестокаго лому въ состававѣ больные чрезъ долгое время чувствуютъ еще въ своемъ тѣлѣ великую слабость, и хотя они не жалуются ни на какую боль, но съ трудностію могутъ дѣлать движеніе, при томъ очень слабы и похудѣли. При сихъ обстоятельствавѣ нерѣдко они хотя имѣющіе бѣненіе жилъ чрезъ весь день порядочное, но оное въ вечеру ощущается лихорадочное и показывающее великой въ тѣлѣ жаръ.

А иногда у больного бываетъ бѣненіе жилъ всегда скорѣйшее натуральнаго, имѣющіе они жажду и слабой позывъ къ ѣдѣ, при томъ говорятъ, что они безпрестанно чувствуютъ въ себѣ иѣкошорый внутренній жаръ.

Въ первомъ случаѣ часто приносятъ скорое вспоможеніе лекарствва подѣ No. 144. и 178. или 163. предписанныя; такжежъ дѣйствіе могутъ произвести, кошорыя подѣ No. 18. 23. 46. 61. 68. 72. 116. 135. 142. 179. 180. означены.

А во второмъ случаѣ лекарства слегка холодительныя и влажныя подѣ No. 1. 2. 8. 9. 40. 35. должно употреблять до тѣхъ поръ, пока сильное движеніе крови утихнеть и больной не будетъ чувствовать никакого жару, и бѣненіе въ жилахъ покажетъ, что лихорадка совсѣмъ уже покинула. Больные получаютъ также весьма великую пользу, когда они всякой часъ или чрезъ два пишь будутъ по

по чашкѣ лекарсва подѣ №. 45. положеннаго, которое для нихъ служить какъ пишемъ такъ и лекарствомъ.

Опѣ употребленія сихъ лекарствъ во вся лихорадка покидаешъ, члены начинающъ двигашъ безъ всякой боли, сонъ бываетъ спокоенъ и довольной позывъ къ ѣдѣ, естли силы не возобновляющъ, то такіе больные должны долгое время принимать лекарсва подѣ №. 36. 70. 150. предписанныя.

Но еще гораздо скорѣе сїи больные выздоравливающъ, когда они кромѣ сихъ полезныхъ лекарсвъ, снанушъ обращать на легкомъ сельскомъ воздухѣ, употреблять въ пищу молоко или иныя молочныя кушанья.

Когда ломотныя боли или грыжа начинающъ легко и безъ лихорадки, то больной опѣ много не чувствустъ великаго мученія, и попому такія боли съ самаго начала починаятся маловажными, и бывающъ всегда почти оставлены въ небреженіи до тѣхъ поръ, пока боль сдѣлаешъ чрезвычайно жестокою, и зло такъ глубоко вкоренится и затвердѣетъ, что часнъ, въ которой обитаетъ сїя боль становитъ неподвижною и мало дѣйствительною.

Люди, которые обращаются на холодномъ воздухѣ или опѣ сквознаго вѣтра простуживаются, которые имѣютъ въ своихъ жилахъ кровь острую, вязкую, или

пьющъ съ великою неумѣренностію виноградныя кисловязкія и молодыя вина и проч. очень легко подвергающія сей болѣзни, кошорая ихъ мучишъ чрезъ многія недѣли, мѣсяцы и нѣскольکو лѣтъ, особливо когда больные мало думаютъ о своемъ здоровьѣ, или когда они прежнюю свою болѣзнь худо лечили.

Въ семъ случаѣ лекарствъ горячительныхъ какъ внупръ употребляемыхъ, такъ и снаружи къ нѣбу прикладываемыхъ по большей части болѣзнь дѣлаютъ еще жесточайшею.

Въ сихъ ломотахъ рѣдко бываетъ нужно кровопусканіе, развѣ потребуешь сего бѣніе жилъ твердое и многокровное нѣбо.

Однако опшары подъ №. 46. 72. 116. 143. показанныя должно употреблять въ довольномъ количествѣ и долгое время; между нѣмъ болѣзную часъ поутру и въ вечеру шереть теплыми суконками и потомъ прикладывать къ ней сверху мыльной пластырь.

При продолженіи лекарствъ такимъ образомъ черезъ нѣскольکو дней надлежитъ давать проносное подъ №. 4. 5. 14. 38. предписанное.

Когда отъ того боль уменьшится, то можно сіе признашь за хорошій знакъ, однако прилѣжно продолжатъ оныя лекарства. Равнымъ образомъ, спустя нѣскольکو дней, когда больнаго силы въ состояніи снесши, можно повторить проносное,
та-

такимъ образомъ часто жесточайшія ло-
мотныя боли укрощаются.

Въ сихъ болѣзняхъ весьма пользуетъ
лекарство подъ No. 110. означенное, особ-
ливо когда больные сверхъ того спанушъ
пить много лекарства подъ No. 143. пред-
писаннаго; многократно примѣчено, что
посредствомъ таковыхъ лекарствъ нерѣдко
самыя жесточайшія и упорнѣйшія боли слу-
чающіяся въ крестцѣ (*) во вся вылечиваю-
тся и не пребудушъ болѣе никакихъ средствъ.

Естьлижъ сіи и прочія всѣ лекарства
ни мало не дѣйствуютъ, то можно еще
давать порочнокъ подъ No. 180. котораго
по малу умноживъ приемъ надлежишъ упо-
требляшъ долгое время.

Съ такою же пользою можно употреб-
ляшъ лекарства подъ No. 49. 91. 174. озна-
ченныя, а для людей холоднаго и мокрот-
наго сложенія приличны лекарства подъ
No. 171. 172. предписанныя.

Но часно случается, что никакое
лекарство внутрь принимаемое не пособ-
ляетъ, а боль однимъ только прогоняет-
ся нарывнымъ пластыремъ, которой какъ
скоро матерію напаянетъ, надлежишъ по-
тихонокъ сняшъ и мѣсто, къ которому
онъ былъ приложенъ, чрезъ нѣсколько вре-
мени держашъ въ теченіи или опяшъ по-
ложивъ новой нарывной пластырь. При-

Р а с с е л ѣ н і е

(*) Такую боль обыкновенно называющъ у насъ
простые люди утиномъ.

семѣ въ грыжахѣ и въ ломотѣ составовъ весьма полезно употребляшь элекспирическую машину; равнобрно съ успѣхомъ бываетъ, когда сверху выпускашь холодную или теплую воду на больную часть, не меньше иногда пользуется, есѣли тереть оную льдомъ.

Въ лихорадочной же ломотѣ бани теплыя мягчительныя за наилучшее средство почитаются, или еше лучше держаъ больную часть надъ паромъ исходящимъ изъ сихъ бань; но въ продолжительной ломотѣ составовъ, особливо когда больной есѣ болѣе холоднаго и мокрошнаго сложенія, нежели горячаго, сѣрныя бани всегда предпочитаются мягчительнымъ, есѣли приличныя лекарства были уже употреблены.

Часто ломотная мащерія оставивъ внѣшнїя части переходить во внутреннїя и по различїю зараженной части различныя и опасныя раждаются болѣзни, есѣли послѣ шакого переходенія приключится жестокая боль съ великимъ жаромъ и лихорадкою, то съ больнымъ надлежитъ поступать равнымъ образомъ, какъ бы онъ былъ одержимъ воспалительною лихорадкою.

Есѣли нѣтъ ни сильной боли ни лихорадки, то для разжиженія и разогнанія перешедшихъ соковъ довольно лекарствъ подъ №. 8. 13. 40. 46. 72. 88. 116. означенныхъ, которыя могутъ сдѣлать соки жидкими и чрезъ легкой потъ или мочу выгнать

нашь оныя изъ шѣла. Припомъ больному чаще спавишь мягчительное промывательное, особливо когда онъ не имѣетъ порядочно на низъ, а къ мѣсну, въ копоромъ прежде находилась боль, положишь крѣпкую гущую припарку или нарывной пластырь. Симъ способомъ по большей части маперія вступившая внутрь опять переходитъ въ прежнее свое мѣсто.

Естли боль въ какомъ нибудь составѣ будетъ пребывать упорно и неопступно, то не рѣдко такая часть остается навсегда неизлечимую или на долгое время лишающаго своего движенія.

Иногда ломотная маперія самая кости, раждая въ нихъ гнилость, совершенно портитъ.

Изъ сего явствуетъ, что сію болѣзнь, хотя она кажется иногда бытъ легкою, не должно запускать или оставяшь безъ всякаго пользованія, особливо шѣ должны сіе спрого наблюдать, копорые имѣютъ кровь зараженную какою оспрою.

Г Л А В А XXIX.

О в о с п ѣ

По большей части воспа нападаетъ на младенцовъ и малолѣпныхъ; однако взрослые и возмужалые не имѣвшіе еще на себѣ воспы, не бывають отъ оной свободны.

Сія болѣзнь часто скоропостижно при-
стаетъ, заражаетъ многихъ и не рѣдко
свирѣпствуетъ въ одно время во многихъ
сторонахъ. -

Иногда бываетъ воспа помѣстная и
свирѣпствуетъ только въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ (sporadice).

Случается также воспа злая, кото-
рая многихъ умерщвляетъ; а часто бы-
ваетъ такъ тиха и легка, что едва кто
изъ зараженныхъ ею умираетъ.

А злою воспою та называется, ко-
торая не наблюдаетъ надлежащаго своего по-
рядка, и сопряжена съ худыми и весьма опа-
сными припадками, при томъ великое мно-
жество людей ею одержимыхъ умерщвляетъ.

Воспа, которая продолжается тихимъ
и надлежащимъ порядкомъ и не соедине-
на съ жестокими или опасными припад-
ками, всегда почитается хорошею.

Жестокость воспы рѣдко зависитъ
отъ разносши годовыхъ временъ, потому
что воспа какъ хорошая такъ и худая слу-
чается во всякое время.

Однако нечаянная перемѣна времени,
или худое онаго свойство можетъ произ-
вести злую воспу во всякое годовое время;
по большей части злою бываетъ помѣст-
ная, когда внутренняя острая или иная
злая причина имѣется въ тѣлѣ, или,
что не рѣдко случается, когда слѣдуя
своему неблаго разумію содержатъ одер-
жимаго воспою въ неумѣренной теплотѣ

или

или дающъ ему иныя неприличныя лекар-
ства.

Но воспа, хорошая ли или злая, всегда
есть заразительна, (contagiosa) и зараза ея
сообщается не только прикосновениемъ; но
и посредствомъ вѣшняго воздуха.

Еслили сія болѣзнь нападаетъ обык-
новеннымъ порядкомъ, то она по боль-
шей части ознобомъ, за которымъ слѣ-
дуетъ жаръ и такой жаръ иногда непре-
рывно продолжается, а иногда на нѣсколь-
ко времени утихаетъ или бросаетъ боль-
наго попеременно то въ жаръ то въ ознобъ,
но въ вечеру всегда бываетъ жаръ силь-
нѣйшій и продолжительнѣйшій. Бѣненіе въ
жилахъ ощущается скорѣе нежели въ
натуральномъ состояніи, больные жалу-
ются, что у нихъ болятъ члены, давитъ
подъ ложкою, ломитъ голову, спину,
поясницу и болятъ суставы, имѣютъ ве-
ликую жажду, пошливость и понужденіе
на рвоту, непрерывно мучатся сонли-
востію, безпокойствомъ и тоскою, языкъ
у нихъ покрытъ бѣлою склизью, выпуска-
ютъ мочу краснаго цвѣту, глаза у нихъ
горятъ и краснѣютъ.

Такіе припадки всегда почти продол-
жаются при дни сряду, но потомъ явля-
ются на лицѣ, шеѣ и иногда на груди
пятна маленькія, красныя, нѣсколько возвы-
шенныя, и въ то время, когда сіи пятна
начнутъ высыпать, то прежніе припадки
утихаютъ, а при семъ и самая лихорадка

покидаеѣ. По томѣ такія пятна помалу показывающа на рукахъ и на ногахъ, и на послѣдокъ по выступленіи всей воспинной матеріи на поверхность шѣла вышеобъявленные припадки воея пропадаютъ.

Сіи красныя пятна слегка и шѣмъ же порядкомъ, въ которомъ высыпали, поднимаются вверхъ и получаютъ видъ воспы, которая въ окружности своей краснѣетъ, кожа находящаяся между сими пупырышками натягивается, рдѣетъ и не рѣдко болитъ.

По прошествіи шести или въ началѣ седьмага дни воспины начинаютъ нагноиваться, въ то время лихорадка опять возвращается, больной чувствуетъ въ себѣ великой жаръ, жажду и боль, особливо въ шѣхъ мѣстахъ, кои покрыты воспинами, не можетъ спокойно спать, лице у него и не рѣдко вся голова такъ распухаютъ, что самыя глазныя рѣсницы отъ опухоли закрываются и закрываютъ совершенно глаза. У взрослыхъ людей часто въ сіе время бываетъ слюнотеченіе изъ рта.

По томъ сіи воспинныя пупырышки увеличиваются, вспухаютъ и наполняются желтымъ гноемъ, по прошествіи же девяти или десяти дней на лицѣ или на прочихъ вышшихъ частяхъ нагноеніе воспицъ оканчивается. Въ то время лихорадка вмѣстѣ съ пухлинами сихъ частей и напряженіемъ промежуточной кожи минуетъ, наконецъ воспины опадаютъ и начинаютъ подсы-
хаютъ,

хашь; и тогда, буде воспа есть не весьма сильная и порядочная, вся почти опасность проходишь.

Когда шугость и опухоль на высшихъ частяхъ уже уменьшилась, то онѣя умножаются на рукахъ и спустя не много времени на ногахъ, воспины такимъ же порядкомъ нагноиваются и опадающъ; иногда на нижнихъ частяхъ воспа еще только что наполнилась, а на лицѣ уже совсѣмъ почти подсохла.

По совершеніи нагноенія и самая нагноительная лихорадка покидаетъ.

Когда же опухоль съ лица и съ высшихъ частей шѣла начнеть сходить и уменьшаться, то вмѣстѣ и слинотеченіе изъ рта у взрослыхъ перестаетъ.

Подсыханіе и спадываніе воспы по большей части бываетъ четырнадцатаго, шестнадцатаго, и восемнадцатаго дня, или когда воспа очень сильна, то подсыхаетъ двадцатаго дня, и такимъ образомъ сія болѣзнь при наблюденіи надлежащаго порядка благополучно оканчивается.

Порядочная воспа въ теченіи своемъ или пролженіи имѣетъ четыре различныхъ времена.

Первое ея время начинается съ начала самой болѣзни и продолжается до четвертаго дня; тогда лихорадка бываетъ непрерывная, которой причиною есть воспинная остропа, и по тому такая лихорадка называется *воспинною* или *заразительною*.

Второе воспы время, когда она высыпаетъ на поверхность шѣла, и такое дѣйствіе продолжается до шести, или, что очень рѣдко случается, до седми дней, въ сіе время больной не чувствуетъ въ себѣ никакого безпокойства, свободенъ отъ лихорадки, и такое время *высыпаніе воспы* называется.

По прошествіи сего времени слѣдуетъ нагноеніе или наливаніе воспы, которое есть преніе время и оканчивается десятаго либо одиннадцатаго, или еслили поздно, двенадцатаго дня, что случается въ хорошей воспѣ, а въ злой часто продолжается до четырнадцатаго дня, въ сіе время обыкновенно бѣеніе въ жилахъ ощущается лихорадочное, почему сія лихорадка называется *нагноительная* или *вторичная*.

Напоследокъ слѣдуетъ подсыханіе воспы, которое есть четвертое время ея продолженія.

Въ каждомъ времени различные бываютъ припадки, изъ которыхъ иные уменьшаютъ опасносшь, а иные умножаютъ, слѣдовательно они бываютъ знаками хорошими и худыми, опасными или и смертельными.

Чѣмъ легчайшіе припадки болѣзнь съ начала имѣетъ, и чѣмъ больной въ продолженіи перваго времени чувствуетъ меньше въ себѣ безпокойства, особливо, когда онъ имѣетъ довольныя силы и при томъ

помѣ веселѣ, тѣмѣ болѣе можно надѣяться, что воспа порядочно и легко высылетѣ, а изъ сего можно заключить, что и прочее продолженіе болѣзни будетѣ спокойное.

Часто сѣя болѣзнь бываетѣ такѣ умѣренна, что больные въ первые дни чувствуютѣ только въ тѣлѣ легкій ознобѣ и не большой жарѣ, теряютѣ нѣсколько охоты къ ѣдѣ, и жалуются, что у нихѣ не очень и не непрерывно болитѣ голова, ломиѣ спину и соснавы, тогда у нихѣ бѣшеніе жидѣ ощущается мало чѣмѣ скорѣе отъ природнаго, однако не чувствуютѣ ни жажды ни великаго расслабленія въ членахѣ, и на четвертой день оказываются у нихѣ изрѣдка на поверхности тѣла небольшія красныя пятна безѣ всякой перемѣны здоровья въ больномѣ, иногда послѣ сего чпакія пятна числомѣ умножаются, а иногда большая изъ нихѣ часть на слѣдующій день скрываются, прочія же порядочно вспухаютѣ, а по прошествіи шести либо седми дней нагноиваются, или наливаетѣ и одинадцатаго или двенадцатаго дня совершенно подсыхаютѣ.

Такая воспа почищается самою лучшею и легчайшею.

Вспылижѣ при самомѣ началѣ болѣзни будетѣ ощутительна въ тѣлѣ жестокая дергота и долгое время ознобѣ, за которымѣ всегда слѣдуетѣ сильной жарѣ; еслии больной жалуется на нестерпимую
боль

боль въ головѣ, въ поясницѣ и въ суставахъ, на расслабленіе членовъ, чувствуетъ чрезмѣрную и непреспанную тоску, часто и съ великою трудностію его рветъ, брѣдитъ, тяжело дышетъ, еспльи біеніе въ жилахъ очень скорое, полное, твердое и не ровное, по сія болѣзнь предвѣщаетъ великую опасность и больные получающъ очень сильную воспу и не рѣдко сливную (*variolae confluentes*).

Но еще большей надлежитъ ожидать опасности, когда больной съ самаго начала сдѣлается чрезвычайно слабъ, однако не жалуется ни на какую боль, но будучи погруженъ въ задумчивость все сноситъ терпѣливымъ духомъ, имѣетъ на лицѣ цвѣтъ блѣдной или подобной землѣ, еспльи біеніе въ жилахъ скорое, малое и слабое или очень медленное, еспльи кожа на поверхности пѣла очень вяла и выпупитъ по ней клейкой и густой пошъ, и еспльи больной чувствуетъ частое понужденіе на рвоту, однако не имѣетъ достаточныхъ силъ къ произведенію оной по такіе знаки весьма худые, которые предзнаменуютъ злую и по большей части смертельную воспу.

Во всякой воспѣ въ то самое время, когда окажется лихорадка, не рѣдко случается съ самаго начала жаба въ горлѣ, но въ хорошей воспѣ, когда спанетъ высыпанъ, очень часто оная жаба опять пропадаетъ.

По-

Порядоочная воспа никогда не высыпаетъ прежде окончанія прехъ дней или въ началъ чешвершаго.

Часто младенцы а иногда и взрослые, когда приближается время высыпанія воспы, спраждутъ сильнымъ трясеніемъ сухихъ жилъ, корчею и судорогами, кошорыя не рѣдко предзнаменуютъ хорошую воспу, но когда воспинныя пятна сдѣлаются видны, то такія судорожныя дѣйствія упицаютъ; а естли они будутъ продолжаться, то всегда можно заключить, что воспа высыплетъ очень сильная или худая.

Естли въ то время, когда воспа высыпаетъ, по одиначкѣ красныя пятна выступаютъ на поверхность тѣла и помалу числомъ умножаются, краснѣютъ, и ликорадка съ прочими припадками ушибаетъ или во вся прекращается, то можно надѣяться много хорошаго, и въ такомъ случаѣ больной не только будетъ имѣть умѣренное число воспинъ, но и самая воспа будетъ у него хорошая, естли только не помѣшается сему скрывающаяся въ тѣлѣ какая нибудь особенная и неизвѣстная оспроша, которая симъ случаемъ оживотворившись можетъ хорошую воспу обратишь въ злую.

Когда по высупленіи воспы, воспинныя пятна одно отъ другаго находящся въ-далекомъ разстояніи, слегка и одинаково вспухають, цвѣтъ имѣютъ свѣтло-кра-

красный, и кожа между ими находящаяся натягивается, краснѣетъ, горитъ и болитъ, но сіе показываетъ, что природа имѣетъ довольныя силы, и что воспа будетъ хорошая, особливо когда не ощущается въ головѣ, въ шеѣ и въ груди никакой боли.

По симъ хорошимъ знакамъ можно всегда ожидать счастливаго произшествія, хотя воспа высылетъ въ великомъ количествѣ, толькобы воспитанные пупырышки не совокупились одинъ съ другимъ и многіе бы совсѣмъ не слились, ибо сливная воспа всегда бываетъ трудна и опасна, хотя начало болѣзни и время высыпанія были довольно тихи и спокойны.

Когда воспа въ опредѣленное время начинаетъ высыпать, и припадки отъ того не уменьшающіеся, но біение въ жилахъ ставишися скорѣннее, малое и слабое, при томъ выступившіе наружу пятна очень краснѣющіе, больной брѣдитъ, или безпрестанно спитъ, весьма трудно дышитъ и покусуетъ, глотаетъ съ трудностію и чрезвычайно потѣетъ, еслили во многомъ или и маломъ количествѣ паковые пупырышки покажутся безъ явнаго облегченія, то такіе знаки суть худые, потому что или естественныя силы уже ослабѣли и не въ состояніи вынестъ воспитанной матеріи на поверхность тѣла, или сія матерія споль осшра и зла, что кровь разжигаетъ либо
такъ

такъ смѣшалась съ кровью, что никоимъ образомъ не можетъ отъ оной отдѣлиться.

Часто первое и второе время благополучно и порядочно проходишь, воспа въ опредѣленное время хорошо высыпаетъ, всѣ припадки утихаютъ, естественныя силы порядочны, и можно по всему надѣяться благополучнаго окончанія воспы; но когда наступаетъ время нагноенія или наливаія и воспыны должны наполниться гноемъ, то безъ явной причины силы вдругъ ослабѣваютъ, пупырышки, которые прежде были свѣтлоокрасные, блѣднѣютъ или очень сильно краснѣютъ, спавшаяся плоскими либо во вся опадающъ и по срединѣ на нихъ дѣлаются багровыя и черныя ямочки. Въ такомъ случаѣ больной находишься въ великой опасности, особливо, когда сверхъ того случившееся слинопеченіе уменьшилось, и послѣдуетъ безпокойство, судороги, брѣдъ и тяжелое дыханіе.

Еслилижъ дыханіе будетъ не очень трудное и слинопеченіе умножится, руки и ноги весьма распухнутъ, или случится поносъ, которымъ изпражняется склизкая и гноеватая маперія, или моча показывающъ у себя внизу такуюже осадку, жилы бьются шибче, и больной въ памяти, то не должно во вся спчаяваться.

Когда прижестокоемъ начинаніи болѣзни, воспа на другой день выступивши на поверхность тѣла во многомъ числѣ вовся къ верху не поднимается или

или очень мало, припомѣ имѣетѣ цвѣтъ и видѣ худой, по большей часи почивается за смертельную. Ибо иногда на четвертой день болѣзни больные оканчиваютѣ свою жизнь, иногда на седьмой, а рѣдко, и по развѣ великой трудѣ и стараніе будущѣ упоиреблены, доживаютѣ до одинадцатаго или принаицатаго дня, но весьма рѣдко можно сыскать такого счастливаго и искуснаго врача, которой бы могѣ сего больного вылечить.

Когда при нагноеніи восны иѣтъ сильной лихорадки, и каждой воспинной пупырышекѣ помалу наполняется хорошимѣ желтымѣ гноемѣ и имѣетѣ въ окружности своей цвѣтъ свѣтлоокрасный и кожу стугую, припомѣ внутреннія часи ни мало не заражены, то больной находится въ хорошемѣ состояніи.

А еслили лихорадка будетѣ жестокая, воспа не желтѣетѣ, но наполнилась матеріею острою, темноватою или красноватою, то такое состояніе больного очень опасное, хотя прочія обстоятельства кажутся быть порядочны. Ибо сія оспра матерія развѣдая вкругѣ себя лежащія части возбуждаетѣ лихорадку, причиняетѣ тоску, безпокойство, и судорожныя движенія, оиѣ чего рождаются припадки иногда неизлечимые, или сія матерія смѣшавшись съ кровью, заражаетѣ внутреннія часи и иѣтъ иногда приключаетѣ скоропостижную смерть, либо такая матерія

терїя перешедши въ какїя нибудь наружныя часши шѣла, дѣлаеиѣ часшо сихѣ спираждущихѣ неблагополучными на всю ихѣ ошальную жизнь, особливо когда оная машерїя заразишѣ глаза, уши, ротѣ, или составы.

Рѣдкаая воспа или нечаяная, п. е. порозну и изрѣдка другѣ оиѣ друга высыпающіе воспинки (*discretae variolae*) созрѣвши надлежащимѣ порядкомѣ, распрѣскиваются и выпускаюиѣ изѣ себя гнои, копорый помалу сгущаяся дѣлаеиѣ сирупѣ, а оный засохши спадаеиѣ и осипавляеиѣ по себѣ красное пятно.

Противное бываетѣ, естѣли и нечаяная воспа, но не содержиѣ въ себѣ хорошей и густой машерїи, а тонкую, сукровичную и ошрую, копорая въ глубѣ протираеиѣся и разѣѣдаеиѣ, то медлительно подсыхаеиѣ и осипавляеиѣ послѣ себѣ ямки.

Другѣ подлѣ друга близко высыпавашая или чашая воспа, (*cohaerentes*) естѣли порядочна и не сильна, чашо оканчивается не оспѣзвивѣ по себѣ никакихѣ худыхѣ слѣдствїй, а сливная (*confluentes*) напротивѣ того очень рѣдко проходиѣ спокойно.

Иногда въ помянутой чаштой воспѣ, но по большей чашпи въ сливной, случаеиѣся, что въ конѣ нагноенїя и при началѣ подсыханїя дѣлаеиѣся сирупѣ швердый, шемноватый или черноватый, копорый чашпо не только лице, но и все шѣло, или по

крайней мѣрѣ большую его часть покрываетъ, и такимъ образомъ препятствуетъ естественному испаренію и истеченію маперіи или осирошы внутри находящейся, отъ чего подъ снруппомъ лежащія часши разбѣдаются и получающіе раны; сія осирая маперія будучи внутрь пѣла впаинуша всасывающими жилками смѣшиваеиша съ прочею кровью; отъ чего часто въ то время опять прислаеиъ къ больному жестокая лихорадка, иногда вся кровь паршииша, или открываются различные и весьма жестокие, по различію частей зараженныхъ сею осирою маперіею, опасные припадки.

И по тому больной не рѣдко въ послѣднемъ семъ времени, когда долженъ бытъ уже свободенъ и выздоравливать, опять подвергается крайней опасности.

Изъ чего довольно явствуетъ, что какъ воспа бываеиъ очень различна и въ каждомъ времени случаются различные и часто весьма опасные припадки, шо и способа оную лечишь иѣиъ общаго, но надлежииъ располагать леченіе смотря на припадки.

Во всякой воспѣ должно прилѣжно разсмотряиъ и рачишельно изыскать слѣдующія обстоятельство: 1, имѣеиъ ли больной довольныя силы, и хорошее пѣла расположеніе? 2, припадки и лихорадка порядочны ли и соразмѣрны бо-
лѣзни, или непорядочныя, очень жестокие и опасныя? 3, довольныя ли силы больной имѣеиъ чрезъ все продолженіе бо-
лѣ-

лѣзни или оныя вдругъ слабѣють, и воспа, кошорая кажется бытъ хорошею, не пере-мѣняется ли въ злую? 4, съ самага ли начала жизненныя силы сдѣлались вдругъ очень слабы, и притомъ вдругъ ли припадки оказались опасныя? 5, не сви-рѣпсвуеиъ ли воспа повѣтренная, или только ходишь часная по нѣкопормъ мѣстамъ? 6, есильи воспа происхо-дишь отъ повѣтрїя, не имѣеиъ ли она съ собою еще другихъ необычайныхъ при-падковъ? 7, какимъ образомъ должно ее лечишь.

Воспинная лихорадка по справедливо-сти можеиъ назваться лихорадкою броже-нїя, (*Tebriis fermentans*) ибо какъ всякое броже-нїе или закисанїе прсбуеиъ извѣснаго вре-мени, въ кошорое оно должно кончидься, чшобы посредствомъ его нешлезное отдѣ-лилось, равнымъ образомъ и въ порядоч-ной воспѣ прсбуеиъ извѣстное и опредѣ-ленное время, дабы воспинная матерїя, со-вершенно какъ бы перебродившиъ и тѣмъ явно себя опкрывши, могла напослѣдокъ выпши на поверхность тѣла, и притомъ бы кровь шакъ опъ оной очистилась, что бы болѣе никогда не могла уже заразитъ-ся воспою, или бытъ приведенною въ по-добное шому лихорадочное волнованїе и воспинное закисанїе.

Почему ничшо не можеиъ бытъ столь худымъ и опаснымъ, какъ когда кто, желая прежде времени, чшобы воспа

С а

высы-

высыпала скорѣе и слѣдуя мнѣнію простолюдимовъ, дабы ядъ изъ тѣла выгнать, станешъ при самомъ началѣ воспаленной лихорадки держаъ больного въ неумѣренной теплотѣ, мучить его горячимъ пипьемъ или пользоваться горячительными лекарствами.

Вредное оне и испребляющее родъ человѣческій заблужденіе въ древнія времена, какъ у нѣкошорыхъ врачей, такъ и у простаго народа было въ великомъ обыкновеніи; а съ того времени, когда прилѣжные испытатели природы, дабы лучше и совершеннѣе узнать дѣйствіе природы и узнать ближайшее свойство болѣзни, начали все внимательнѣе разсматривать и примѣчать, что самое доказываеиъ явными и убѣдительными примѣрами нынѣ прививаніе воспы; ибо примѣнили такіе испытатели, что содержаніе больного въ неумѣренной теплотѣ и пользованіе горячительными лекарствами вредно, а свободной и чистой воздухъ есиъ одно безопаснѣйшее и лучшее лекарство, почему древній тотъ поступокъ, какъ у врачей, такъ и у простыхъ нѣкошорыхъ людей, въ такое пришелъ забвеніе, что въ нынѣшнемъ просвѣщенномъ вѣкѣ очень мало существуетъ такихъ, которые бы держались онаго безумнаго и смертоноснаго мнѣнія.

Изъ знаковъ вышеобъявленныхъ кажется и не трудно можно узнать, страждетъ ли

ли больной воспою? и какая будетъ у него воспа, хорошая ли или злая?

Въ первое время воспы или во время ся прилипчивоспи надлежитъ такъ поступать, какъ съ безпрерывною горячкою.

И такъ естли лихорадка не очень жестока, больной не многокровенъ, и прочіе припадки суть тихіе, то требуется только, чшобы больной пилъ много жидительныхъ, смягчительныхъ и слегка охлаждающихъ отваровъ, или употреблялъ бы лекарства подъ No. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 40. также еспли нужно, должно отворять ему на низъ смягчительными промывательными; когда жестокая боль въ головѣ чрезъ долгое время продолжится, то къ подшивамъ приложитъ тягучій пластырь, по утру и въ вечеру сипавитъ ему ноги по колѣна въ теплую воду, и такое пользование продолжатъ до шѣхъ поръ, пока вся воспа высыплеть.

А когда примѣчено будетъ, что у больного опѣ непорядочнаго употребленія пищи желудокъ опягощенъ, слѣдовательно въ первыхъ пищепрѣмныхъ каналахъ много еще находится шаккого, котораго желудокъ не можеть сварить, то смотря по обстоятельству надлежитъ дать ему рвошное или проносное, какъ подъ No. 3. 5. 14. 24. 25. 26. показано. Ничего не должно опасаться опѣ шакowychъ изпражнений, какъ скоро только окажутся первые знаки нечистоты содержащейся

ся въ желудкѣ и въ кишкахъ, ибо можетъ принести больному великой вредъ и причинить воспъ худаго свойства, который съ начала, почитая что нибудь тому подобное маловажнымъ, оставивъ въ небреженіи.

Естьлижъ больной имѣетъ жестокую лихорадку и жаръ, біеніе въ жилахъ иѣсколько швердое, или по причинѣ многокрово́я неровное, по надлежитъ пустишь ему кровь, и когда нужда требуетъ, оное повторишь, припомѣ давань жидипельные, холодишельные, легкіе слабишельные отвары подѣ №. 11. 12. 39. предписанные, си и тому подобныя лекарства продолжашъ до нѣхъ поръ, пока лихорадка сдѣлается умѣреннѣе, которая есѣли утихнеть, надлежитъ поступать такъ, какъ прежде сказано.

Однако не нужно столько часто пу-скать больному кровь, и давань столько много холодишельныхъ лекарствъ, когда сиъ вспавши съ поспели и одѣвши въ легкое платье будешъ часто прохаживашъ или лежашъ на свободномъ и благоразворенномъ воздухѣ.

Никто, думаю, не повѣритъ, развѣ извѣдавшій опыномъ на самомъ себѣ, сколько и какъ скорое облегченіе спраждущимъ воспю доставляетъ свободный воздухъ. Ибо въ короткое время уменьшаются всѣ припадки, больной чувствуетъ приращеніе своихъ душевныхъ и тѣлесныхъ силъ, и симъ

симъ однимъ способомъ жестокая лихорадка удерживается въ своихъ обыкновенныхъ предѣлахъ.

Не ложно можно утвердить, что свободный и чистый воздухъ есть одно какъ бы таинственное дѣйствіе при искусственномъ прививаніи воспы и пропиву оной безопаснѣйшее лекарство.

Когда надлежащимъ порядкомъ высыпаетъ воспа, и припадки уменьшаются, то должно продолжать жидкительныя лекарства, какія прежде показаны; также не меньше сіи пользуютъ, когда оказывается нагноительная лихорадка (*suppuratoria*) но не очень сильна, припомъ не примѣчается никакихъ злыхъ припадковъ требующихъ особливаго леченія; слѣдовательно надлежитъ оныя лекарства продолжать до ихъ поръ, пока болѣзнь вся прекратится.

Еслили нагноительная лихорадка очень усиливается, бѣненіе въ жилахъ ощущается полное и шугое, великой жаръ, дыханіе не свободное и болитъ голова, то не меньше нужно и въ сіе время пустить кровь, и укрощать припадки прежними наипаче холодительными лекарствами, савить въ теплую воду ноги по колѣна, прикладывать къ подошвамъ квашенное тѣсто смѣшанное съ толченою горчицею и отвлекательными средствами (*per revulsionem*) удерживать стремленіе крови въ голову.

Но сіи столь жестокіе и опасные припадки можно отворотить, когда больные

вспавши съ свои постели, спануть сидѣть или лежать на свободномъ воздухѣ и припомѣ будучи дѣлать умѣренныя шлодвиженія, такимъ образомъ будучи они удерживаемы днемъ отъ сна, могутъ ночью спокойно и довольно спать.

Несправедливо и ищезно шѣ опасются, копорые по закосѣлымъ своимъ предразсужденіямъ думаютъ, что свободный воздухъ препяиспивуетъ и удерживаетъ высыпаніе воспы, но напропивъ сего многократно научасъ насъ опытъ, что посредствомъ свободного и чистаго воздуха скорѣе, легче и надлежащимъ порядкомъ оная высыпаетъ

Во время нагноенія воспы всѣ припадки на свободномъ воздухѣ бывающіе гораздо сносѣйшими, въ хорошей воспѣ рѣдко или во вся никогда не бывающіе они отъ него опасными, но еше скорѣе отъ того созрѣваетъ воспа и подсыхаетъ.

Все сіе прилѣжно разсмотрѣвъ, всякъ можешъ себя увѣринъ, что содержаніе въ неумѣренной шеплошѣ, запершой, невозобновляемой воздухѣ, словомъ: воздухѣ несвободной, употребленіе горячительныхъ лекарствъ дѣлаютъ воспу злою и весьма опасною.

Иногда случается, что отъ нечаяннаго гнѣва, страха, радости, или инаго сильнаго душевнаго возмущенія, или отъ другой какой нибудь погрѣшности больнаго либо его прислужниковъ, хорошая воспа внутрь скрывается, опадаетъ, и часно

совсѣмъ исчезаетъ, отъ чего больной подвергается весьма великой опасности.

Однако и въ семъ случаѣ не должно держать больныхъ въ чрезвычайной теплотѣ, и для выгнанія на поверхность пѣла скрывшейся воспы не давать имъ горячительныхъ и возбуждающихъ лекарствъ, но выводить ихъ на свободной воздухъ и давать жидительные опвары: не рѣдко сей способъ доспавляетъ больнымъ явное облегченіе, скрывшаяся воспа опять выходитъ наружу и получаетъ прежній свой видъ.

Естьлижъ такое средство мало пособляетъ и примѣчается жестокая лихорадка съ бѣніемъ жилъ нѣсколько твердымъ; то надлежитъ пустить кровь и очистить пѣло промывательными.

А естьли спрячется воспа по причинѣ опягощенія желудка пищею трудною къ варенію, то въ такомъ случаѣ весьма полезно дать больному рвотное или проносное, особливо когда жалуется, что онъ чувствуетъ въ желудкѣ тяжесть или иное безпокойство и имѣетъ безпресипанное понужденіе на рвоту.

Также и для пѣхъ пользуется чистой и умѣренной воздухъ, которые во время нагноенія воспы спраждутъ слиношеченіемъ (pthyalismus) и не могутъ ничего проглотить безъ ощущенія въ горлѣ великой боли; но еще отъ онаго получающъ не малое облегченіе и оживленіе въ силахъ, только больной

долженъ сколько возможно оберегаться нечаяннаго простуженія, сильнаго холоду и сквознаго вѣтру.

Нерѣдко слина бываетъ такъ густа и клепка, что съ великимъ трудомъ можно ее выплевывать изъ рѣва, въ семъ случаѣ должно чаще полоскать ротъ лекарствомъ подъ No. 63. означеннымъ, или оное впускать въ ротъ помощію насоса; а когда слина сдѣлается острою и развѣтвиста въ роту многія часни, или естьли окажутся въ роту маленькіе прыщички причиняющіе боль, либо воспаленные пузырьки, то должно употреблять лекарство подъ No. 62. означенное.

Иногда всѣ часни въ роту даже до горла покрываются швердымъ толстымъ струпомъ, и самый носъ заклеивается такою матеріею, отъ чего нерѣдко больной не можетъ свободно глотать и дышать: въ семъ случаѣ долженъ онъ безпрестанно въ роту держать смягчительный отваръ либо теплую воду, или изъ сихъ паръ выпягивать въ себя носомъ и ртомъ, дабы такимъ образомъ размягчившись сей струпъ отвалился.

Въ нечастой воспъ равно какъ и въ сливной чепвертое время или время подсыханія по большей часни благополучно оканчивается, когда одержимый воспою вставъ съ постели будетъ прохаживаться или сидѣть на свободномъ воздухѣ. И по тому тогда очень рѣдко случается, что
бы

бы воспа остановилась либо во внутренней какой нибудь части тѣла либо въ наружной, и хотя лихорадка опять возвратится, то никогда не бываетъ столь жестокая и столь опасная, какъ въ то время, когда больной не имѣя свободного воздуха безпрестанно лежишь какъ бы погребенъ въ постели.

Однако еслили случится, что при засыханіи воспы опять появится жестокая лихорадка, и будетъ примѣчено перемѣненіе воспы въ какую ни есть внутреннюю или внешнюю часть, то въ то время емошрл по силамъ больного должно ему пускити кровь и во время крайней нужды оное повторить. Послѣ сего надлежишь давати больному чрезъ два или чрезъ три дни проносное подѣ No. 5. 14. и сверхъ сего много лекарствъ подѣ No. 6. 7. 8. 9. 29. 45. 196. предписанныхъ, и дабы онъ всегда имѣлъ свободно на низъ то давати лекарства подѣ No. 11. 39. 141. 167. или спавити подобныя промывательныя; а прочее все должно располагати такимъ образомъ, какъ бы воспалительная лихорадка вновь приключилась.

Еслили голова и грудь у больного очень болятъ, еслили онъ станетъ бредить и мучиться судорогами, то должно положить къ подошвамъ крѣпкіе пягучіе пластыри, или къ ножнымъ икрамъ и рукамъ привязати нарывные, которые какъ скоро наплетутъ матерію, то
надле-

надлежитъ снять и мѣсто самое долго
лежашъ открыто или въ печеніи, дабы
такимъ образомъ вся оспрая и гнилая
манерія опдѣлившись отъ крови вы-
шла.

Если на подсыхающихъ воспиахъ
спрутъ очень жесткой, то должно его
размягчить и опиятъ паромъ теплой воды
и мягчительными припарками; а прочія
воспины, которыя еще не подсохли но
сѣ гноемъ, надлежитъ пошхоньку и
сѣ осторожностію прорѣзывать, и слегка
рукою гной выдавливать, дабы оспропа
не могла взойти въ кровь и ее заразить.

Но всѣ сіи средства мало способс-
твуютъ, когда больной не будетъ поль-
зоваться свободнымъ воздухомъ, почему
и въ сіе время, если не препятс-
твуютъ другія обстоятельства, должно боль-
ного выносить или выводить на откры-
той и чистой воздухъ.

Когда лихорадка по немногу утихаетъ,
внутренняя жоска уменьшается, голова и
грудь спановятся гораздо свободнѣе, то
можно довольно надѣяться, что больной
скоро выздоровѣетъ, если же напрошивъ
не оказывается никакого облегченія, но
еще болѣе умножающія худыя припадки,
то изъ сего надлежитъ заключить, что
онъ умретъ.

Часто случается, что больные, когда
начинаетъ лихорадка проходить, быва-
ютъ очень слабы, почему они мѣ прилично

давать лекарства подъ No. 27. 28. 177. предложенныя.

Иногда во время сей лихорадки, моча выходя въ довольномъ количествѣ опускаетъ у себя на низъ гноистую осадку, сіе показываетъ, что природа намѣреваетъ выгнать изъ тѣла воспинную материю чрезъ мочеиспускательныя дороги, чему должно споспѣшествовать легкими мочегонительными лекарствами подъ No. 71. 72. 173. 215. означенными.

Когда больной кашляетъ и харкаетъ мокрою, то надлежитъ давать ему лекарства подъ No. 8. 32. 33. 34. предписанныя.

Сими холодительными и отончающими соки лекарствами всегда должно пользоваться воспою одержимыхъ, когда въ нихъ кровь примѣчается склонною къ воспаленію, спешившныя силы порядочны, и нѣтъ никакихъ знаковъ показывающихъ опасность, аніоновъ огонь, гнилость или разжиженіе крови, и такъ разсмотрѣвъ со вниманіемъ сіи обстоятельства не трудно будетъ болѣзнь лечить съ помощію жизненныхъ силъ.

Но когда жизненные силы во вся ослабли, кровь въ больномъ очень жидкая или гнилая, то не рѣдко всѣ труды и старанія бывають тщетны.

Однако требуетъ довольно разсужденія, великаго искусства и прилѣжнаго вниманія многими опытами снабѣннаго, что бы

бы вдругъ узнать зло еще начинающееся, предупредѣлишь наступающую опасность и отвратишь оную дѣйствительными лекарствомъ.

Ибо бывають такіе печальные случаи, въ которыхъ во вся не видно, чтобы природа была въ состояніи произвеси чпо нибудь хорошее, иногда все здоровье зависишь болѣе отъ справедливаго разсужденія и многократныхъ опытовъ, въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ предразсужденіе во вся не имѣеиъ мѣста, но часно случается, чпо благополучно излечивается та крайне опасная болѣзнь, отъ которой чпобы выздороветь не было почти никакой надежды.

И такъ необходимо нужно прежде всего совершенно знаиъ все теченіе болѣзни; различныя ея времена и случающіяся въ нихъ перемѣны, однако никогда не должно во вся полагаться на обыкновенной порядокъ; но во всякой болѣзни особливо въ воспѣ и другихъ злыхъ болѣзняхъ, всегда надлежишь сперва прилѣжно разсмотрѣть больного естественныя силы и припадки, и смотря по ихъ свойству избирать способъ леченія.

Если въ воспѣ, въ которой съ самаго начала естественныя силы были порядочны, будетъ примѣчено, чпо сѣи вдругъ такъ ослабѣвають, чпо не могутъ перенести болѣзни, то тогда часъ должно оставить холодительныя лекарства,

а предписывать шѢ, которыя возбуждаютъ естественныя силы и укрѣпляютъ, не взирая ни мало ни на какое время болѣзни.

ЕстьлижѢ въ то время, когда воспаляется высыпать, бѣшеніе въ жилахъ случится очень слабое, малое, неровное и мягкое, больной брѣдитъ или жалуется на сильную ипоску, показываясь слегка на шѢлѢ очень блѣдные воспаленныя пупырышки, которыя въ скоромъ времени опять скрываются, кожа на всемъ шѢлѢ очень мягка и конечности шѢла ш. е. руки и ноги холодѣютъ, то надлежитъ давать легкія укрѣпительныя лекарства подѢ No. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 160. означенныя, а никогда не должно больного душить въ ипелой постелѢ и разгорячающими лекарствами, но сколько возможно спараться доставлять ему свободной воздухъ, поднимають его съ постели и выводятъ изъ его спальни.

Нерѣдко симъ способомъ всѢ воспаленныя высыпаютъ, бѣшеніе въ жилахъ спановившися живѣе, и больной чувствуетъ приращеніе силъ; когда таковыя знаки усмотрѣны будутъ, то прежнія лекарства опять надлежитъ ослабить, а давать только лекарства слегка жидкительныя, прочее же все поручить дѣйствію природы.

Однако еслили жилы бьются еще слабо, больной чувствуетъ въ членахъ также великую слабость, то надлежитъ безпрерывно давать крѣпительныя лекарства,

да-

дабы возбудить въ немъ ослабѣвшія естественныя силы.

Когда послѣ сего воспины начнутъ подниматься имѣя цвѣтъ свѣтлоокрасный, есѣли кожа находящаяся между пунырышками натягивается, рдѣетъ, болишь, есѣли бѣеніе въ жилахъ ровное и крѣпкое, дыханіе свободное и не ощущается въ головѣ никакого безпокойства, приномъ воспины наливаютъ или наполняются хорошимъ гноемъ, то должно думать, что больной опянь пришелъ въ хорошее состояніе; въ такомъ случаѣ надлежитъ удержаться отъ крѣпительныхъ лекарствъ, а продолжать прежде объявленные, пока болѣзнь совсѣмъ прекратится.

Есѣлижъ окажется, что воспины не довольно вверхъ поднимаются, приномъ имѣютъ цвѣтъ темноокрасный, промежуточная кожа обвисла и синеватая, или хотя поднимаются воспины, но середина у нихъ темнѣетъ или чернѣетъ, появляющіяся по разнымъ мѣстамъ на поверхности тѣла синія пятна, моча выходитъ вонючая и черная и смѣшанна нѣсколько съ разжиженною кровью, въ то время больной находится въ худомъ состояніи, и по тому надобно употреблять такія лекарства, которыя могли бы болѣе дѣйствовать, противиться гнилости и пренішествовать разжиженію соковъ, въ семъ случаѣ не исключая прежнихъ лекарствъ, дѣлаютъ великую пользу лекарства подъ No. 27. 28.

29. 30. 31. 148. 149. 150. 177. 196. предписанныя.

А когда сїи и симъ подобныя лекарства не принесушъ въ скоромъ времени никакого вспоможенія, то нѣтъ никакой надежды, чѣмобъ больной могъ выздороветь.

Въ таковыхъ обстоятельствахъ часто перуанская лихорадочная корка особенную доставляетъ пользу, и по тому можно и должно оную давать безъ всякаго опасенія въ великомъ количествѣ, а изпразнишельныя средства особливо кровопусканіе въ семъ случаѣ побольшей части бывающъ ускореніемъ смерти, когда кровь уже совсѣмъ испорчена и разведена и естественныя силы сдѣлашъ крайне слабы.

Въ такомъ потерянїи силъ весьма нужны оспрыя возбудишельныя припарки, нарывныя и шягучіе пластыри.

Когда при самомъ началѣ воспинной лихорадки естественныя силы сдѣлаются очень слабы, и находяшся подлинныя знаки показывающіе жестокою болѣзнь, а на второй день или и позже высыпаетъ во многомъ количествѣ воспа мѣлая, плоская и не одинакая, имѣющъ цвѣтъ синевапой, мало вверхъ поднялась и въ скорости наполняется сукровичною матерією, то не опасаясь ни мало шомъ часъ надлежитъ больному давать лекарства крѣпительныя, возбуждающія природу и со-

Часть I. Т про-

противляющіяся гнилости, копорыя должно избирать, смотря по различію припадковъ.

Также нужно къ надлежащимъ мѣстамъ шѣла привязать нарывные пластыри, и то мѣсто, на копоромъ оныя лежали, надлежитъ долгое время не залечивать, дабы матерія могла свободно изшекать.

Не лзя сыскать во всемъ врачебномъ искусствѣ, ничего такого, чпобы могло болѣе оживить больного, возбудить силы, сопротивляться разжиженію соковъ и гнилости, какъ многократно похваляемый чистой, свободной и возобновляемой воздухъ.

Слѣдовательно не смотря ни на какіе болѣзненные припадки, только бы время и случай благопріятствовалъ, должно таковыхъ больныхъ водить и возить на открытомъ чистомъ воздухѣ, чрезъ что часто они, будучи во вся изнеможенны, получаютъ такую бодрость и крѣпость, что иногда бывающъ въ состояніи сами, или по крайней мѣрѣ съ помощію другихъ ходить; еслии ихъ не лзя вывести на свободной воздухъ, то по крайней мѣрѣ надлежитъ безпреспанно возобновлять и прохлаждать воздухъ въ комнахъ, въ которой они лежатъ. А хотя они обращаясь на свободномъ воздухѣ чувствуютъ нѣкопкой ознобъ и отъ холоду какъ бы содрагаются; но сіе никакого худа не сдѣлаетъ, и по тому во вся ихъ не должно при-

принуждають лежати въ постели, или мучить горячительными лекарствомъ, развѣ того потребуютъ особенные припадки.

Рѣдко случается видѣть, чтобы беременныя женщины спраждущія воспоухомъ въ прочемъ очень сильною и худого свойства, получили бы отъ того кровопеченіе изъ матки, или выкидывали бы недоношенныхъ младенцовъ, если только они будутъ пользоваться свободнымъ воздухомъ и лечиться приспосойнымъ образомъ, не взирая на то, что они беременны.

Если во время воспы нѣкоторыя части шѣла, особливо окружающія глаза, такъ сильно напухнутъ, что глазами смотрѣть во вся не лзя, то не малую пользу можно доставлять больному, когда глаза, какъ скоро появился такая опухоль, черезъ два или черезъ три часа поширанъ грецкою губкою обмоченною въ теплую воду или въ теплое молоко, ибо симъ опиврацается шѣгосъ причиняющая боль; и употребивъ сію предосторожностію рѣдко глаза зашворяются, также не можетъ накопляться клейкая и ошрая матерія, копорая не рѣдко сѣи части воспаляется, развѣдаетъ и производитъ часпо глазныя болѣзни продолжительныя и почти неизлечимыя.

Когда во время воспы лице такъ сильно напухнетъ, что не лзя къ нему ни

мало допронуться по причинѣ великой боли, то можно къ симъ часнямъ чаще прикладывать мягчительныя припарки, либо нагрѣвать грецкою губкою обмоченною въ теплую воду или въ теплое молоко, симъ способомъ сильное и съ болью напряженіе уменьшается, боль и воспаленіе утихаетъ, и воспа скорѣе нагноивается.

Еслили подъ исходъ нагноенія или при началѣ подсыханія воспы, либо по окончаніи сего, оныя переходенія воспаленной маперіи покажутся гдѣ нибудь наповерхности шѣла опухоли и нарывы, то ежели оныя мягки и содержащаяся въ нихъ маперія какъ бы переливается, то оныя часъ должно прорѣзать и прорѣзавши долго держать открытыми, такимъ образомъ скопившаяся маперія не можетъ смѣшаться съ кровью, припомъ чрезъ сіе иссеченіе маперіи кровь очищается отъ своихъ болѣзненныхъ остатковъ.

Еслилижѣ шакія опухоли будутъ тверды и красны, то надлежитъ ихъ размягчить и привести въ гноемъ мягчительными припарками, или чю всего лучше положили къ онымъ опухолямъ мягчительной пластырь составленный съ разными смолами (*emplastrum diachylon compositum cum gummatibus*) а какъ скоро окажется гной въ срединѣ опухоли, то должно ихъ отворить такимъ порядкомъ какъ и первые и не вдругъ ихъ заживлять.

Весь-

Весьма великой вредъ можетъ послѣдовать, еслии такая матерія переидетъ въ какой нибудь соспавъ, и снаружи не примѣчается никакой опухоли; въ такомъ случаѣ оспропта не имѣя свободнаго выхода, котораго сдѣлать ей никоимъ образомъ не лъзя, развѣдася оныя части и часпо причиняетъ гнилость въ косяхъ или неизлечимую неаимоснъ въ соспавахъ (anchylofis).

Еслии по переходѣи матеріи больной не очень слабъ и бѣе въ жилахъ ощущается нѣсколькo тугое, то потъ часъ должно пустить кровь и въ потъ, же самый день дать ему проносное, которое, еслии больной нѣсколькo въ силахъ можно повтораъ черезъ два или черезъ три дни, пока послѣдуетъ явное поправленіе въ его болѣзни.

Такимъ же образомъ должно поступать, когда при окончаніи воспы приаючипся воспаление глазъ, въ семъ случаѣ надлежитъ дваили три раза, еслии больного силы снесуъ, пустить кровь.

Тогда также должно велѣть больному пить много мягчительныхъ и кровочистиельныхъ отваровъ подъ No. 40. 46. 72. 88. 116. означенныхъ, а особливо совѣтовать ему чрезъ долгое время употреблять лекарство подъ No. 45. предписанное.

Но многимъ чрезвычайно пользуется морсѣ пригопвленной изъ бузиновыхъ ягодъ, (tov. sambuci) есипли давать имъ каждого дня по три или по четыре унца ш. е. по шести или по восьми сиполовыхъ лодекъ, раздѣливъ сѣ на нѣсколько приемомъ, дабы отъ сего сдѣ-
лался на нѣсколько дней легкой поносъ.

Когда послѣ воспы продолжается чрезъ долгое время воспаленіе глазъ и на глазахъ оспающа пина, по кромѣ прежде объяв-
ленныхъ отваровъ, должно нѣсколько вре-
мени давать лекарсво подъ №. 48. означен-
ное, копорымъ сѣ болѣзнь часто щаспи-
ливо вылечивася.

Въ упорныхъ и злыхъ воспинныхъ чирь-
яхъ, въ гнилоспи костей, въ жеспокой ло-
мошной боли, и когда также послѣ воспы но-
ющъ коспи, можно употреблять одно изъ
показанныхъ подъ №. 49. 60. 61. 180. ле-
карствъ, которыя пособляютъ, когда дѣй-
ствительнѣйшія и чрезъ долгое время
употребляемыя лекарства не произвели
никакого успѣха.

Лекарства унимающія боль и сонъ
производящія не рѣдко пользующиъ, какъ
въ хорошей, такъ и въ худой воспѣ, ибо
всегда унимаютъ боль, дославляющъ боль-
нымъ спокойный сонъ, возобновляющъ ихъ
силы и прогоняютъ тоску, при томъ сѣ ле-
карства никогда не могутъ причинить вре-
да, естли только будущъ даны въ над-
лежащее время и въ надлежащемъ количе-
ствѣ. И такъ, когда по прошеспвіи перва-
го

то времени воспы, одержимые ею безпо-
коящаяся ночью и не спящѣ, по всегда дол-
жно имѣ въ вечеру давать по одному ун-
цу сыропу изѣ маковыхъ цвѣтковъ, или
одно какое нибудь изѣ предписанныхъ
подъ No. 41. 84. 85. лекарствъ, которыя,
если будетъ нужно, продолжать до
тѣхъ поръ, пока болѣзнь прекратится.

Когда больные во время нагноенія,
днемъ очень неспокойны и тоскуютъ, жа-
луются на жестокою боль въ разныхъ ча-
стяхъ тѣла, на судорожныя движенія и
на сильныя волнованія крови, однако въ
бѣнѣ жилъ не ощущается никакой инвер-
доси или особенной тугоси, то кромѣ
прочихъ лекарствъ должно давать черезъ
три или четыре часа лекарство подѣ No. 92.
93. или 126. предписанное, пока припадки
утихнутъ.

Когда худыхъ свойствъ воспинные
пузырьки на осьмой или девятой день
нѣсколько опадутъ и сдѣлаются темнова-
тыми или почеркнутъ, гнанувшаяся
между ими кожа разслабѣетъ и полу-
читъ цвѣтъ блѣдной или синей, бѣнѣ въ
жилахъ ощущается слабое, лице у нихъ
по краснѣетъ, по блѣднѣетъ, оказыва-
ются по разнымъ частямъ тѣла судорож-
ныя дѣйствія, то кромѣ выше объявлен-
ныхъ лекарствъ, надлежитъ давать черезъ
пять или шесть часовъ по восьми ли-
бо по десяти капель лекарства подѣ No.
197. или черезъ два либо чрезъ три часа

по двѣ ложки лекарства подѣ №. 199. означеннаго.

Иногда случается видѣть, что употребивъ сѣи лекарства всѣ прудные припадки въскоромѣ времени утихающѣ, силы укрѣпляющѣ, воспины хорошо высыпающѣ, и наступающая опасность проходящѣ.

Естьли такое поправленіе болѣзни будетѣ продолжаться непрерывно, то объявленныхъ лекарствъ днемъ давань не нужно, а въ вечеру давань больному оныхъ сѣолько, сколько попребно будетѣ для доснавленія ночью спокойнаго сна, или сѣ такою же пользою можно ему давань прежнія лекарства подѣ №. 41. 84. 85. предписанныя.

Для людей, копорые имѣють чрезвычайно чувствительныя чувственныя жилы, или копорые подвержены частымъ корчамъ и судорогамъ, всегда не обходимо нужны лекарства унимающія боль и усыпительныя.

Очень не много находится такихъ людей, копорые по своему природному расположенію не могутъ сносить сихъ лекарствъ, таковыя люди употребивъ оныя лекарства, чувствуютъ тоску и безпокойство или жестокой жаръ, либо ощущающъ по всему тѣлу зудъ и свербѣжъ, и по тому, какъ скоро сѣе примѣчно будетѣ въ больномъ, должно опѣ сихъ лекарствъ удержаться, хо-

хотя сіе не рѣдко бываетъ со вредомъ больного.

ГЛАВА XXX.

О искусственномъ прививаніи воспы.

Къ великому благополучію человѣческаго рода въ нынѣшнія времена во многихъ странахъ признающъ весьма спасительнымъ и къ отвращенію опасности естественной воспы довольно способнымъ искусственное ея прививаніе, о пользѣ котораго и преимуществѣхъ предъ прочими полезнѣйшими изобрѣтеніями касающимися къ большому распространенію врачебной науки явственно всѣхъ удосновляющъ многократныя и многочисленныя опыты въ разныхъ странахъ учиненныя; думать должно, что ни одинъ изъ просвѣщенныхъ согражданъ не станетъ теперь болѣе сомнѣваться о томъ спасительномъ дѣйствіи, которое производитъ прививная воспа, и что она гораздо съ меньшею сопряжена опасностію, нежели воспа естественная.

Искусственное прививаніе воспы обыкновенно дѣлается на обоихъ плечахъ слѣдующимъ образомъ:

Во первыхъ должно ланцетомъ проколотъ всозрѣлую оспинку, и по томъ вышедшимъ изъ оной твоемъ обмазавъ кончикъ ланцета, надлежитъ оной потчасъ

на прививаемомъ плечѣ легонько впускитѣ между верхней кожицы и подѣ ней лежащей кожи длиною въ одну или въ полторы линей; при чемъ одинъ бокъ или сторону ланцета столько къ верху приподняти, чѣмбѣ нѣсколько кожица отъ того поднялась, въ которое отверстіе топѣ гной симъ образомъ входитъ или впускается, а между пѣмбѣ должно слегка, поспрекопать другимъ ланцетнымъ бокомъ кожу дабы такимъ образомъ гной скорѣе смѣшался съ соками пѣла, наконецъ ланцетъ, борошивши его плоско, вынуть вонъ придавивши притомъ слегка рану указательнымъ перстомъ.

По учиненіи прививанія не нужно перевязывать повязками то мѣсто, на которомъ сдѣлана такая операція но получившій прививаніе можетъ опять надѣть свое обыкновенное платье.

Сей способъ прививанія кажется быть самымъ легчайшимъ и безопаснѣйшимъ.

Должно знать, что воспальной гной хотя не можетъ быть всегда одинакаго свойства: однако были учинены опыты съ гноемъ, которой еще не созрѣлъ, водянъ и тонокъ, дѣланы также и съ гноемъ взятымъ изъ воспалъ, которыя уже совершенно созрѣли, равномерно и изъ воспалъ подсыхающихъ содержащихъ въ себѣ гной клейкой уже и темноватой; иногда гной бранъ былъ изъ естественныхъ воспалъ, не меньше и изъ воспалъ при-

прививныхъ и употребленъ былъ для привишя; но не оказалось въ шаковыхъ опытакъ никакого различія, а шѣ же самыя дѣйствія, и одинакаго свойства дѣлалась воспа.

Также не бываетъ никакого различія, когда гной взятой изъ созрѣвшихъ воспинныхъ пупырышковъ и нѣскольکو дней хранимый хорошо въ стеклянномъ пузырькѣ, будетъ употребленъ для прививанія воспы.

Еслили такимъ гноемъ захочетъ кто привишь воспу, то долженъ прежде пузырькъ наполненной воспиннымъ гноемъ посипавишь на нѣскольکو времени въ теплую воду, дабы гной сдѣлался жидкимъ и теплымъ, потомъ въ сей гной обмочивъ ланцетной кончикъ сдѣлашь прорѣзаніе такимъ способомъ, какъ прежде сказано.

Сирупья собранные изъ присохлыхъ хорошихъ воспинъ и въ мѣленькой порошокъ сѣрные, также бывающъ дѣйствительны къ прививанію воспы, сей порошокъ въ стеклянномъ пузырькѣ хорошо зашкнутомъ хранимой, чрезъ долгое время не теряетъ своей дѣятельности.

Прививаніе воспы порошкомъ дѣлается слѣдующимъ образомъ; во первыхъ должно не много прорѣзать ланцетомъ на плечѣ верхнюю тонкую кожицу, по томъ раздвинувъ нѣскольکو края сей нечувствительной ранки, и взявъ сего порошка,

по-

посыпать имъ ранку, и въ оную его легонько впереть: въ семъ случаѣ для прикрытія такой ранки не нужно употреблять никакого пластыря.

Сіе прорѣзаніе еще можно учинить инымъ способомъ, то есть, запустивши поперекъ ланцета между верхнею кожицею и кожею длиною около одной или полторы линии, должно его одинъ бокъ наискось повернуть такъ, чтобъ кожа отъ кожи нѣсколько приподнялась, а другимъ бокомъ ланцета кожу слегка перепрековавъ, совсѣмъ его вынуть: по томъ взявъ ланцетнымъ кончикомъ сего порошка положить его въ ранку, и прижавъ перстомъ верхнюю кожу къ исподней кожѣ опять ланцетъ вынуть, однако послѣ сего нужно подержать еще перстомъ ранку нѣсколько минутъ, дабы верхняя кожа могла опять какъ бы склеиться съ исподнею кожей.

И такъ если не случится достать свѣжаго воспиннаго гноя, то порошокъ сдѣланной изъ воспинныхъ сирупьевъ можно употреблять гораздо съ лучшею пользою, нежели нитки обмоченныя въ воспинной гной и съ нимъ засушенные, особливо такія, которыя уже давно пригошовлены.

И потому рачительные лекари должны каждой годъ заготовлять для себя довольно количество сего порошка, дабы при наступленіи весны могли они симъ при-

прививать воспу, изъ кошорой могутъ опянь собирашь довольно какъ гною для привитія другимъ воспы, такъ и изъ воспинныхъ сирупьевъ опянь запасти довольно порошка на слѣдующій годъ, и есѣли такое спасительное искусство прививать воспу будетъ производимо въ дѣйство, каждого года особливо въ Маѣ мѣсяцѣ, во всѣхъ сирапахъ, то можно думать, что повальная воспа или воспинное повѣтріе не могло бы случиться болѣе никогда.

По привитіи воспы приключаются слѣдующіе припадки.

Часно въ первые два дни ничего не оказывался въ произведенной искусствомъ ранкѣ, и едва видѣть можно слѣдъ учиненнаго прорѣзанія, но на третій или на четвертой день прорѣзанное сѣ мѣсто иѣсколько рдѣетъ и чешется.

Всегда почти около пятого дня на томъ мѣстѣ, гдѣ учинено прививаніе, оказывается круглое пятнышко подобное угрызенію блохи, которое немного вверхъ поднялось; многіе послѣ сего чувствуютъ въ сей день зудъ и свербѣшу въ ранкѣ, боль подъ мышками и въ плечѣ, какъ бы что его тянешъ.

На шестой или на седьмой день воспаленіе на привитомъ мѣстѣ гораздо болѣе умножается, увеличивается въ своей окружности, пухнетъ, болитъ и швердѣетъ, боль подъ мышками и шугость
на

на плечѣ и на раменахъ усиливается, и въ inomъ же самой день больные жалуются на ломъ въ головѣ, ослабленіе во всѣхъ членахъ и теряющъ охоту къ ѣдѣ, у иныхъ примѣчается моча съ кровью, а у иныхъ бѣненіе въ жилахъ ощущается лихорадочное.

На осьмой день то мѣсто, въ которомъ привита воспа, вокругъ рдѣеи, болии и разширяется въ видѣ кругломъ, многіе въ оной день жалуются, что у нихъ болии голова, поясица и соснавы, иные получающъ рвоу, при inomъ имѣющъ мутные глаза, языкъ бѣлой, бѣненіе въ жилахъ неровное, скорѣйшее обыкновеннаго, и беспокойной сонъ.

Часомъ на девятой день лихорадка становится сильнѣйшею, больные чувствуютъ въ себѣ по переменн жаръ и ознобъ, слабости въ членахъ и круженіе въ головѣ, боль въ глазахъ, въ шеѣ и въ поясицѣ, имѣющъ немалую жажду и поскующъ, дыханіе у нихъ издаетъ дурной запахъ; между тѣмъ воспаленіе въ томъ мѣстѣ, гдѣ привита воспа, чувствительно разширяется и умножается, больной ночью не спитъ, и имѣетъ языкъ бѣлой.

На девятой день по большей части тѣ же самые припадки продолжаются, однако иногда утихаютъ, а иногда еще болѣе усиливаются; когда лихорадка началась

лась седьмого дня, то часто на десятой день нѣкопорые воспинные пупырышки оказываются, и ночь бываетъ гораздо спокойнѣе прежнихъ ночей.

Часто около одиннадцатаго дня воспаляется высыпать, тогда всѣ припад-ки упишуютъ, лихорадка унимается и у нѣкошорыхъ во вся перестаетъ; но воспаление произведенной ранки ни мало не уменьшается и содержишь въ себѣ хоро-шій гной.

На двенадцатой день больной чув-ствуешь довольное облегченіе въ болѣзни, воспаление въ шомѣ мѣстѣ, гдѣ учи-нено трививаніе, уменьшается, воспинные пашна выпушаютъ на поверхность и чи-сломъ умножаются, жилы бьются почти какъ въ здоровомъ.

Около шринашцаго дня или четыр-нашцаго пупырышки вспухаютъ и на-чинаютъ гноиться, воспаление произведен-ной нарочито ранки пропадаетъ, и еслили воспа выпала двенашцаго дня, то чрезъ сіи два дни бѣненіе жилъ всегда почти ощущается природное; еслилижѣ и въ сѣи дни еще высыпаніе воспы продолжается, то и самая лихорадка, хотя довольно шихо, однако будетъ продолжаться.

Но на пашнашцагой день всѣ воспин-ные пупырышки совершенно созрѣваютъ, бѣненіе въ жилахъ ощущается свободное, и привишое мѣсто начинаетъ запягиваться сирупомъ, больной приходишь въ прежнія си-

силы, имѣетъ порядочной позывъ на ѣду и хорошо спитъ.

Въ слѣдующіе дни воспа подсыхаетъ и рана произведенная при прививаніи заструпѣваетъ, которой струи по малу засохши, наконецъ самъ собою опваливается, оспавивъ по себѣ круглое пятно, и сіе есть точное теченіе врывивной воспы.

Но какъ сія болѣзнь есть легкая и приномъ проходитъ почти нечувствительно, то и пребудетъ для себя очень простаго и легкаго леченія.

Всякаго возраста люди суть способны къ понесенію прививной воспы, и не требуется, чѣобы они непременно всѣмъ тѣломъ были совершенно здоровы, а нужно только разсмотрѣнь прилѣжно всѣ признаки и со вниманіемъ изыскать имѣетъ ли больной довольныя силы или нѣтъ? и не предвидится ли какой опасности по причинѣ другихъ какихъ нибудь болѣзненныхъ припадковъ?

Приступая къ произведенію сего прививанія не требуется ни какого прѣупо-вленія въ разсужденіи тѣла; но только должно тѣмъ, которые въ первой день или на второй до прививанія имѣ воспы, жалующся на нѣкоторое безпокойство въ желудкѣ, либо не очень хорошую имѣющъ охоту къ ѣдѣ, или не очень порядочно преждевели свою жизнь, данъ легкое проносное, а для тѣхъ которые здоровы, не нужно ни какое лекарство.

Также

Также и въ самомъ теченіи воспы не должно сихъ больныхъ мучить лекарствомъ; но шолько прилѣжно смопрѣшь, каждой ли день или черезъ день они ходящѣ на низъ; есѣли выходишѣ пропивное, то надлежитѣ имъ въ томъ споспѣшествованіи однимъ или двумя золошниками слабительной полихрестовой соли, или другимъ какимъ легкимъ проноснымъ; но и сіе рѣдко бываеиъ нужно, а по болшей часи сама природа безъ всякаго поспороннаго вспоможенія бываеиъ въ состоянїи перенести сію болѣзнь.

Припомъ не должно имъ строго приказываиъ имѣиъ крайнее воздержаніе опѣ пици и пипья, но въ первые пять дней по привишїи могутѣ они оспаться при своей обыкновенной пици, шолько попребно имъ совѣшовать не упопребляиъ таковой, которую желудокъ сѣ прудностию варишѣ; такожде можно имъ позволитѣ умѣренню и мяса молодыхъ живошныхъ, а для младенцовъ нѣиъ лучшей пици и лекарства, какъ матернее или кормилицино молоко.

На шестой или на седьмой день, въ которой болѣзнь уже почувствуеиъся, должно во вся запрешѣиъ употребленіе мяса, а позволитѣ шолько пишаиъся жидкою мясною похлебкою, въ которой надлежитѣ разваришѣ кусокъ бѣлаго хорошо выквашеннаго и выпеченнаго хлѣба, также полезно давати огородную зелень, вареные лѣшнїе зрѣлые плоды и всякую молочную пицу,

Часть I.

У

однако

однако не должно принуждать къ молочнымъ кушаньямъ, есѣли кто не хочетъ охотно оныхъ употреблять.

Такимъ образомъ надлежитъ кормить больныхъ въ сей болѣзни.

Когда воспа начинается совершенно подсыхаетъ, то нужно дать проносное, послѣ чего опять позволимъ имъ употреблять обыкновенную ихъ пищу, но весьма умѣренно, также можно по немногу давать и вина особливо шѣмъ, копорые прежде употребляли.

Во время самой болѣзни обыкновенное пище состоятъ должно въ чистой водѣ, въ шонкомъ лимонадѣ, но также можно давать и чай, мясныя легкія похлебки, или что болѣе изъ оныхъ больнымъ нравится.

И такъ сихъ больныхъ не нужно приготавливать лекарствами къ понесенію сей болѣзни, равномѣрно и въ самой болѣзни не должно ихъ мучить оными, но надлежитъ имъ позволимъ содержать себя свободно и какъ кому нравится; однако должно рачительно и всемѣрно стараться, чтобъ они всякой день пользовались свободнымъ воздухомъ, и прохаживаясь на открытомъ воздухѣ, дѣлали бы легкое и умѣренное шѣлодвиженіе.

Ничего болѣе и рачительнѣе не должно наблюдать, какъ то, что бы получившіе прививную воспу безпрестанно на свободномъ были воздухѣ, къ которому да-

дабы привыкли, потѣ часѣ на первой день привишїа хотя въ сіе время и не очень нужно еще кажется, должны они заниматься между прогулкою и ѣздомъ легкими и блодвиженїями.

Какъ скоро больные почувствуютъ въ себѣ лихорадку, то ничто столько для нихъ не нужно какъ свободной воздухъ и умѣренное и блодвиженіе; не давань имъ днемъ спать, хотябы они и хотѣли, ибо отъ того лихорадка болѣе усиливается и слабость такъ умножается, что еспли изъ соболѣзнованїа позволишь имъ не много уснуть или лечь въ постелю, то сіе соболѣзнованіе они столько во зло упопреляють, что ихъ привесити опять въ движеніе, бываетъ очень трудно или вовсе не возможно.

Но младенцамъ, которые по крайней необходимости должны днемъ и ѣздомъ часовъ уснуть, не нужно въ томъ препятствованїа; однако они должны спать на свободномъ и чистомъ воздухѣ, а не въ горницѣ.

Правда, что весьма трудно съ начала сдѣлать, что бы больные, чувствуя слабость во всѣхъ членахъ и одержимъ будучи тоскою имѣли какую нибудь охоту, къ и блодвиженію на открытомъ воздухѣ, но когда они однажды получаютъ отъ того происходящую пользу, то спануть всегда онаго желать съ великою охотою.

Кто самъ таковыхъ произшеспвѣй не видѣлъ и собственнымъ опытомъ не извѣдалъ, тотъ едва повѣритъ, коль скоро плѣсное движение, на свободномъ воздухѣ производимое, испребляетъ болѣзненные чувствія и прогоняетъ всѣ худыя припадки. Чѣмъ больше число воспийъ высыпаешь, тѣмъ движеніе плѣла на открытомъ воздухѣ болѣе почиается нужнымъ.

Также не надобно оспаивать и тогда свѣжаго воздуха, боясь по пусшому нѣкотораго худаго слѣдствія, когда во время высыпанія или нагноенія воспы, хотя и чувствуетъ больной въ себѣ нѣкоторой родъ лихорадки; почему не нужно, что бы для сей одной причины лежать въ постелѣ и теплой горницѣ или пить много разгорячительныхъ какихъ пищей.

Однако не должно, что бы получившіе прививную воспу выходили на открытой воздухѣ во время непогоды, ибо всегда полезнѣе для нихъ, когда они будутъ остерегаться отъ воздушныхъ перемѣнъ, кошорыя вредятъ не только таковымъ, но и здоровымъ.

Изъ столь великаго числа съ хорошимъ успѣхомъ произведенныхъ опытовъ, можно сдѣлать общія нѣкоторыя примѣчанія.

Никому почти изъ получившихъ прививную воспу не случается особливою какой опасности: у иныхъ хотя въ немаломъ

ломъ числѣ высыпаетъ воспа, но нечасная и имѣющая хорошее свойство, а у иныхъ великаго числа воспий не бываетъ, у иныхъ же и совсѣмъ весьма рѣдкая: припомъ часто случается видѣть шакихъ людей, которые имѣя прививную воспу, чрезъ все продолженіе болѣзни, не видящъ у себя снаружи ни одного воспиннаго пупырышка.

Возрастъ въ прививаніи воспы не заключаеиъ въ себѣ никакой важности, ибо поворожденные младенцы и младенцы шестимѣсячные столько же благополучно переносятъ, и какъ взрослые и какъ самые люди совершенныхъ лѣтъ. У многихъ дѣтей во время воспинной лихорадки нечувствительны и легко зубы прорѣзываются.

Опытомъ дознано, что къ отвращенію опасности естественной воспы прививаніе ея есть наиболѣзнительный способъ, и чѣмъ оной проснѣе, тѣмъ лучше. Ибо не нужны къ нему никакія прѣупотвлєнія и въ продолженіи болѣзни никакія лекарства, ииъ никакой нужды располагать порядокъ жизни по правиламъ искусства, а только смотрѣть, что бы оной былъ согласенъ съ натурою человека; и такъ въ семъ случаѣ самымъ лучшимъ лекарствомъ почитается свободной воздухъ, которому одному благополучное окончаніе прививной воспы надлежитъ приписывать.

Свободной воздухъ и въ самой худой естественной воспѣ чрезвычайъ полезенъ, ибо

онѣ дѣлаетъ, что больные безъ всякихъ лекарствъ гораздо удобнѣ выздоравливаютъ и скорѣе получаютъ свои потеряныя силы. Однако при всемъ томъ, какъ естественную, такъ и прививную воспу не должно считать маловажною; но поспѣшно со вниманіемъ смотрѣть, все ли идетъ надлежащимъ порядкомъ, не оказываются ли какіе сомнительные и опасные припадки? и какъ скоро что нибудьному подобное будетъ примѣчено, то пренебрегать приличныхъ вспоможеній не должно.

Въ прочемъ не лзя вовсе отвергать, чіобы искусствомъ произведенная воспа не могла когда нибудь обратиться въ худую и сливную; и чіобы не могли приключиться злые и смертельные припадки, хотя ному подобное очень рѣдко видѣнь случается.

У получившихъ прививную воспу, еслили она высплелъ очень чистая, во время изгноенія распухаетъ также лице и прочіе члены, какъ обыкновенно случается въ естественной воспѣ.

Искусственная воспа, равно какъ и естественная, не приходитъ болѣе на нѣхъ, которые сю были уже однажды больны, ибо прививана была воспа раза по два и по три нѣкоторымъ, которые имѣли воспу сильную, нѣкоторымъ которые рѣдную, а нѣкоторымъ, кои и никакой воспы, но въ коихъ быда воспинная лихорадка, не имѣли,

ли; однако никогда паковые оною не заражались: наконецъ были они понуждаемы жить и общаться съ пѣми, копорые на самомъ дѣлѣ болѣзновали воспою; также велѣли имъ лежать и спать съ больными во время нагноенія восны и подсыханія въ пѣсныхъ покойцахъ, въ копорыхъ тогда бываетъ очень пропитной и заразительной запахъ, однако они всегда выходили здоровы и ни мало не заразились воспою. Слѣдовательно имѣвшее прививаніе и прививную воспу, была ли на нихъ точная восна или только воспиною лихорадкою больны были безъ высыпанія, могутъ вѣрно думать, что они чрезъ всю оснательную свою жизнь болѣе не будутъ имѣть вослы, равно какъ и пѣ, копорые уже выдержали естественную воспу.

Искусственная восна не менѣе бываетъ заразительна, какъ и естественная. Однако крайне несправедливо, чтобы зараза искусственной воспы была всегда опаснѣе или смертоноснѣе, нежели зараза естественной воспы.

Равнымъ образомъ ошибаются и пѣ, копорые думаютъ, что свободной воздухъ препятствуетъ воспѣ высыпанъ, и такимъ образомъ будто удерживаетъ въ пѣлѣ остропу, копорая по происшествіи нѣскольکو времени производитъ худыя слѣдствія.

Ибо когда больной на открытомъ воздухѣ имѣетъ довольно шлодвиженіе,

то испареніе тѣла гораздо большее бываетъ на воздухѣ, нежели въ постели, и воздухъ съ жадностію вбирая въ себя все вредное изъ тѣла исходящее съ собою уноситъ, отъ чего больной, пользуясь безпрестанно чистымъ воздухомъ, чувствуетъ великую перемѣну въ своемъ болѣзненномъ состояніи.

Еслилиже больной запертъ въ комнату и покрытъ многими одѣялами для произведенія въ немъ попу, то онъ отъ того еще болѣе слабѣетъ, воздухъ становится нечистъ и вонючъ, ядовитое испареніе изъ больного исходящее смѣшивается съ воздухомъ, который не имѣя куда выходить дѣлается ядовитымъ, такой зараженной воздухъ окружаетъ со всѣхъ сторонъ тѣло больного, который принужденъ безпрестанно оной вдыхать въ себя съ великимъ вредомъ, и природы, будучи не въ силахъ болѣе пропитаться такому скопленію сей остропы, крайне изнемогаетъ, или, хотя больной по какому нибудь случаю и можетъ избѣгнуть смерти, но принужденъ бываетъ проводить остальную свою жизнь въ бѣдственномъ состояніи.

Прививаніе воспы производится съ хорошимъ успѣхомъ во всякое годовое время, однако оно благополучнѣе бываетъ весною.

Сей описанной способъ прививать воспу кажется быть всѣхъ легчайшимъ и без-

безопаснѣйшимъ, и можетъ почестъся предъ всѣми другими общимъ, наипаче по тому, что для людей бѣдныхъ и не весьма достаточныхъ очень малаго стоить.

Многократной доказаль опытъ, что имѣвшие прививную воспу, по выздоровленіи отъ оной, наслаждаются совершеннѣйшимъ здоровьемъ, и никогда не бывають хворы, бѣдны или слабы; да и тѣ самыя, которые прежде были не здоровы, по перенесеніи іакой воспы, бывають гораздо здоровѣе и веселѣе противъ прежняго. По справедливости можно почестъ неблаго-разумными тѣхъ, которые приписываютъ прививанію воспы всѣ болѣзни, какія бы только ни случились послѣ прививанія, хотя прошло тому нѣсколько уже времени или нѣсколько лѣтъ.

Но какъ нѣкоторыя, хотя весьма рѣдко, случаются несчастія, то не должно никого принуждать къ прививанію воспы, а всегда надлежитъ такое дѣло осматривать на произволъ всякаго.

Прививная воспа очень много способствуетъ къ сохраненію въ лицѣ красоты.

• Г Л А В А XXXI.

О кори.

Корь есть болѣзнь, которая не рѣдко бываетъ очень легкая и тихая, а часто, равномерно какъ и воспа, очень опасная, тяжелая и смертельная; приспаетъ гораздо чаще къ дѣтямъ, нежели къ людямъ возрастныхъ лѣтъ или къ старикамъ.

Иногда корь примѣчается на очень многихъ людяхъ въ то наипаче время, когда воспинное бываетъ повѣтріе, но часомъ она слѣдуетъ послѣ онаго.

Въ началѣ болѣзни по большей части ощущается въ тѣлѣ ознобъ, а послѣ содроганіе и жаръ, члены слабѣютъ, голова болитъ и ночь бываетъ неспокойна; на другой день жаръ пошъ же самой продолжается, бѣненіе въ жилахъ лихорадочное, больной имѣетъ великую жажду, но мало охоты къ ѣдѣ, чувствуетъ въ головѣ тяжесть и боль, языкъ у него бѣлый и склизокъ, въ желудкѣ ощущаетъ давленіе и тяжесть, очень сонливъ; безпреспанно у него изъ глазъ и изъ носу течетъ водяная манерія, онъ чего онъ имѣетъ понужденіе къ чиханію подобно шѣмъ, у которыхъ насморкъ, жалуется на стѣсненіе въ груди, безпрерывно кашляетъ а во время глошанія иногда чувствуетъ въ горлани боль. На третій день сѣи припадки еще
болѣе

болѣе умножаются и усиливаются, больной часпо имѣетъ омерзѣніе отъ всякой пищи и еснли что проглотитъ, тотъ часъ выкидываетъ рвотною, спавовится часъ отъ часу слабѣе, неспокойнѣе и ни въ чемъ не терпѣливъ, глазные вѣки, а часпо и все лице пухнетъ и краснѣетъ, которое рдѣніе притиняетъ жестокой жаръ и свербежъ; въ концѣ шретьяго дня или обыкновеннѣе на четвершой день появляющіеся на лбу и по всему лицу красныя прыпышки или пупырышки имѣющие видъ льяныхъ сѣменъ, опухоль на глазахъ и на лицѣ увеличивается и число сихъ пупырышковъ по малу умножается, по томъ прыпышки нѣсколько разширяются и симъ самымъ между собою соединяются и показываются по всему лицу въ видѣ различныхъ фигуръ. Въ окончаніи четвертаго и въ началѣ пятаго дня сн прыпыа высыпаютъ на груди, на плечахъ и на послѣдокъ по всему тѣлу.

Лихорадка въ сей сыпи разнится отъ воспаленной лихорадки тѣмъ-наипаче, что сія лихорадка всегда сопряжена съ жестокимъ кашлемъ, съ частымъ чиханіемъ, и что безпрестанно у больного течетъ изъ глазъ и изъ носу водяная осипрая мокрота.

Какъ скоро сн прыпыа высыпаютъ, то выше объявленныя припадки по большей части утихаютъ, а нѣкоторыя изъ нихъ и во вся прекращаются, однако кашель еще продолжася, отъ чего больные ча-
сто

сто выхаркиваютъ великое количество склизкой мокроты съ ощущеніемъ въ себѣ облегченія.

Естьли послѣ того, какъ выступилъ на поверхность шѣла корь, больной чувствуютъ въ своихъ силахъ нѣкоторое укрѣпленіе и бодрость, при томъ сіи пузырьки краснѣютъ, кожа между ими одинаково рдѣетъ и нѣсколько крѣпнѣетъ, то сіе почитается хорошимъ знакомъ.

Въ концѣ шестаго дня пятна на лицѣ, которыя прѣжде краснѣли, начинаютъ блѣднѣть, опухоль уменьшается, и на седьмой день лихорадка и пятна почти пропадаютъ, по наступленіи же осьмаго дня не видно уже на шѣлѣ ничего, а въ девятой день, если все течетъ порядочно, не примѣчается во вся никакихъ знаковъ лихорадки и больной кажется довольно здоровъ.

Потомъ верхняя кожа присохшая лупится и сходитъ, или пузырьки трѣскаются и на подобіе цулухи или опрубей спаываютъ.

Когда сія болѣзнь въ своемъ продолженіи порядочна и спокойна, лихорадка съ стѣсненіемъ въ груди не сильная, то не рѣдко все лечение болѣзни можно оставить дѣйствию одной природы.

Только больной долженъ сколько можно остерегаться отъ холоднаго воздуха, быть спокоенъ, и днемъ чаще пить по одной либо по двѣ чашки чаю подъ № 13. 40. 88. означеннаго.

По-

Полезно для больного, есѣли онѣ въ первые дни болѣзни не станетѣ лежать въ постели, и какѣ скоро корѣ у него начнетѣ высыпаетѣ, то нужно, чѣобы онѣ спокойно лежалѣ въ постели, и содержалѣ себя всегда въ одинакой и умѣренной теплотѣ, а когда такая сыпь надлежащимѣ порядкомѣ спанетѣ подсыхаетѣ и сходитѣ, то днемѣ можетѣ онѣ опять почтѣе сходить съ постели, однако не обходимо нужно, чѣобы онѣ еще чрезѣ нѣсколько дней себя берегѣ онѣ холоднаго воздуха: ибо въ семѣ случаѣ легчайшее проснуженіе можетѣ по пренятію спаванію шѣлескому испаренію, которое, есѣли будетѣ удержано или поворошится опять въ шѣло, причинетѣ опасное стѣсненіе въ груди или долговременной кашель, а часто весьма опасной и сильной поносѣ или зажную водяную опухоль покрывающую все шѣло.

Есѣлижѣ съ самаго начала болѣзни лихорадка очень жестока вмѣстѣ съ жаждою и великимѣ жаромѣ, то одни объявленные опвары не довольны, но кромѣ сихѣ надлежитѣ давать больному холоднѣпельныя лекарства подѣ No. 1. 2. 3. 9. 32. или много опваровѣ подѣ No. 6. 7. 8. предписанныхѣ.

А когда біеніе въ жилахѣ ощущается твердое и безпрестанное въ груди стѣсненіе вмѣстѣ съ тоскою, особливо есѣли кромѣ сего больной очень сильно кашляетѣ

ляеиъ, то смотря по его силамъ надлежитъ пустить ему кровь и во время нужды оное повторить; когда больной не ходитъ на низъ, должно чаще спавить ему промывательное, и естли примѣчается у него въ желудкѣ или въ кишкахъ много нечистоты, или онъ прежде употреблялъ пищу, которой желудокъ не могъ варить, то надлежитъ все сѣ очистишь легкимъ проноснымъ.

Часто сухой и спрекoшной кашель бываетъ столь мучительнъ, что больной онъ того приходитъ въ великое безпокойство и слабость; сѣ мучительной припадокъ прогоняется лекарствами унимающими кашель, и пошому прилично употреблять, кромѣ прежнихъ опваровъ и лекарствъ, нѣ, которыя подъ №. 80. 81. 82. 188. видѣнь можно.

Острая иа жидкая манеря не только печетъ изъ глазъ и изъ носу, но иишекаетъ сверху подобно въ насморкѣ въ пище-пріемное горло, чѣмъ самымъ возбуждаетъ рвошу, а по большей части припекая къ устью дыхательнаго горла причиняетъ безпрестанное спрекoтаніе и кашель, и для того въ то время полезно давань больному въ великомъ количествѣ мягчительные опвары и лекарства особливо влажные (mucilaginosâ) также въ сѣмъ случаѣ очень пользуется тонкая, овсяная, ячная или изъ сорочинскаго пшеиа вареная кашица.

Когда сверхъ того примѣчена будетъ воспалительная жаба съ затрудненіемъ въ

глошаніи, то должно лечить такимъ образомъ, какъ прежде предписано о сей болѣзни.

Когда корь спанетъ высыпать, то надлежитъ съ вниманіемъ сморѣть, явно ли и постоянно ушихаютъ прежніе припадки, особливо свободнѣли ли пропивъ прежняго бьются жилы и совсѣмъ ли перестало стѣсненіе въ груди, или еще нѣкопторое ощущается? легко ли больной кашляетъ и можетъ ли свободно выхаркивать мокроту и проч. Если все сіе буденъ найдено въ шакомъ состояніи, то надлежитъ только продолжать прежнія лекарства.

Еслилижъ больной въ сіе время болѣзни еще мучится непрерывнымъ сухимъ кашлемъ и спавовишся очень слабъ, то къ укрощенію шакого кашля пошребно ему давать лекарства подѣ №. 50. 51. 82. 188. предписанныя.

Еслилижъ и въ то время, когда корь совсѣмъ уже высыпала наружу, не примѣчается не только никакого облегченія, но лихорадка еще нуде усиливается, больной шяжелѣ дышетъ и жалуется на стѣсненіе въ груди и на шоску, и припомъ хотя онъ весьма сильно кашляетъ съ ощущеніемъ у себя въ груди боли, однако не выплевываетъ никакой харкошины, то сіе значить, что легкіе заражены коревою матерією, (*morbillota materia*) и что въ нихъ уже есть воспаленіе.

И

И такъ въ семъ случаѣ, когда корь хорошо выступила наружу, должно пустишь больному кровь, естлижъ въ скоромъ времени не послѣдуетъ харкота съ облегченіемъ больного, или естли дыханіе у него не сдѣлаеися гораздо свободнѣе и легче, то нужно опять повторить кровопусканіе, и давать ему кромѣ прежнихъ мягчительныхъ опваровъ, много жидительныхъ и холодишельныхъ, шакже часто снавить промывательныя, которыя унявши въ больномъ жарѣ доставляющъ ему великое облегченіе, естлижъ дыханіе еще не поправляеися, голова болитъ, и больной начинаеши по немногу брѣднѣи и заговариваеши, то должно къ ножнымъ икрамъ привязать нарывной пластырь.

Въ сихъ весьма опасныхъ случаяхъ надлежиши сколько можно стараться скорѣе пособишь больному, шакое скорое вспоможеніе часто не допускаеши сдѣлаться чирьямъ или нарывамъ въ легкомъ или и самому анпотову огню.

Всегда починаеши за хорошій знакъ, когда въ шакомъ случаѣ корь порядочно высыпала и имѣеши цвѣти свѣтлоокрасной, ибо сѣ показываеши, что естесвенныя силы крѣпки и не скрываетеши въ шѣхъ ничего такого, которос бы могло приключиши опасноснѣ.

Когда шакая сыпь въ надлежащее свое время блѣднеши спанеши и спадаетъ,
боль-

больной при томъ свободно дышетъ и очень легко выплевываетъ мокроту, лихорадка явно уменьшается, то можно и должно надѣяться, что больной въ скоромъ времени выздоровѣетъ, и по тому не нужно тогда ему давать иныхъ лекарствъ, какъ только тѣ же самыя, которыя выше объявлены, и продолжая сии до тѣхъ поръ, пока утихнеть кашель и лихорадка во вся прекратится, въ сие время болѣзни больной долженъ быть спокоенъ и находится въ умѣренной теплотѣ, ибо всякое простуженіе наноситъ ему весьма великой вредъ.

Еслилижъ харкотина будучи очень густа съ трудностію выплевывается, то надлежитъ сему способствовать лекарствами подъ №. 32. 33. 34. предписанными.

Часто сія болѣзнь хотя надлежащимъ порядкомъ и благополучно продолжается, но когда верхняя кожа начинаетъ лупиться, то кашель опять возобновляется съ причиненіемъ шокки и спѣсненія въ груди, бѣшеніе въ жилахъ ощущается лихорадочное, больные жалуются на сильной жаръ съ жаждою, на нѣкоторую боль въ груди и подъ ложкою.

Въ семъ случаѣ кровопусканіе необходимо нужно, которое въ разсужденіи припадковъ надлежитъ повторить, между тѣмъ давая больному довольно смягчительныхъ и жидительныхъ отваровъ, какъ прежде

Часть I.

Ф

уже

уже о семъ сказано, и поступать съ нимъ такимъ образомъ, какъ бы онъ былъ боленъ наслоящимъ и подлиннымъ воспаленіемъ легкаго (peripneumonia vera.)

Естьли по прошествіи нѣсколькихъ дней примѣчено будетъ явное уменьшеніе лихорадки, то примѣшавъ преиму часть молока къ прежнимъ опварамъ надлежитъ больнымъ давать пить, онѣ сего они, почувствуя въ груди великое облегченіе, въ скорости выздоравливаютъ.

Нѣкоторыежъ иногда харкаютъ гноемъ чрезъ долгое время, и въ вечеру всегда жалуются на ознобъ, послѣ котораго бросающъ ихъ въ жаръ, а по томъ въ сильной потѣ, и пробудившись онѣ снова чувствуютъ въ себѣ еще большую слабость.

Сіе приключеніе благополучно проходитъ, естьли только больному давать черезъ два часа по чайной чашки лекарства подѣ №. 70. означеннаго, смѣшавъ по поламъ съ молокомъ, или начавъ его пользованъ такимъ образомъ, какой предписанъ въ своемъ надлежащемъ мѣстѣ о воспаленіи легкаго обранивашагося уже въ нагноеніе.

Коревая заразительная матерія очень часто бываетъ такъ остра, что онѣ ее вспухаютъ шейныя и околоушныя желѣзы, рождаются красные опухоли различной величины, также пупырышки и ранки, изъ коихъ часто долгое время исте-

текаетъ острая маперія съ причиненіемъ сильнаго жара. Еслили такая маперія перейдетъ въ легкія, то обыкновенно рождается жестокой, сухой и продолжительной кашель, или хоня маперія и извергается харконою, но очень водяна или жидка, остра и бдка.

Равномѣрно и въ семъ случаѣ, какъ и въ прежнемъ, должно больному давать тѣ же мягчительные опвары съ молокомъ смѣшанные; еслилижъ очень сильной и мучительной кашель не унимается, то кромѣ оныхъ опваровъ для укрощенія жестокоши такого кашля надлежитъ давать лекарство боль унимающія.

Когда корь уже совершенно высыпала, но больные ночью не спяшъ, и такое безпокойство и бессонница происходишъ единственно отъ жестокаго кашля, то въ вечеру когда время спать, должно всегда давать имъ по одному унцу сырону изъ маковыхъ головокъ, или другое какое усыпительное лекарство подъ №. 83. 84. 85. означенное, а когда сверхъ сего больные жалуются на сухость и жестокой жаръ въ груди, то надлежитъ наипаче давать лекарство подъ №. 83. означенное.

Иногда корь скоропоспѣжно сокрывшаяся внутрь ввергаетъ жизнь больного въ великую опасность, въ такомъ случаѣ должно такъ поступить, какъ сказано въ своемъ мѣстѣ о сокрывшихся внутрь гнилыхъ пятнахъ и прыщевой сыпи.

Когда корь надлежащимъ порядкомъ кончилась и верхняя кожица на пупырышкахъ начала сходить, то въ сіе время весьма полезно дать больному легкое слабительное и оное можно повторять черезъ восемь дней, особливо когда больной холодного и мокрошнаго сложенія, или когда соки его иѣла изобилуютъ многою острою.

Иногда сія болѣзнь, особливо у нѣкоторыхъ дѣшей, такъ легка бываетъ, что въ первые дни въ разсужденіи ихъ здоровья не примѣчается никакой перемѣны, корь хорошо высыпаетъ, и по прошествіи не многихъ дней благополучно съ иѣла сходитъ и такъ до всѣмъ оканчивается.

А у нѣкоторыхъ бываетъ очень злая и начинается съ многими и опасными припадками, опъ чего естественныя силы приходящъ въ крайнее изнеможеніе, и часто сіи злые припадки оказываются по высыпаніи кори на поверхность иѣла, по ещъ кожа спланившись мягкою или вялою, пятна имѣютъ цвѣтъ темнокрасной либо синей, болвной начинаютъ шоковать и безпокоиться, дыханіе у него шрудное, слабое и неровное, къ которому иногда присоединяются судорожныя движенія. Въ семъ случаѣ опъ часъ надлежитъ употреблять лекарства крѣпительныя, и сопротивляющіяся гнилости, о которыхъ упомянуто, когда говорено было о иной воспъ и о гнилыхъ лихорадкахъ.

ГЛА-

Г Л А В А XXXII.

*О красносыпной лихорадкѣ или лопухѣ
или ситникѣ.*

Сія лихорадка почпи съ шѣми же сопряжена припадками, съ какими корь; ибо на шрепій или на четверной день болѣзни показывающся по всему лицу и прочимъ часнямъ шѣла маленькіе красные во многомъ количествѣ пяшна или пупырышки, которые увеличившисъ въ своей окружности сливаюпся вмѣсто и подыавшисъ не много вверхъ представляющъ видъ какъ бы краснаго сукна, которыя покрывая всю почпи поверхность шѣла или большую онаго часть по большей части на седьмой день, когда верхняя на нихъ кожа станепъ сходить на подобіе шелухи, совсѣмъ пропадающъ.

Часто съ самаго начала сей болѣзни случается воспалительная жаба въ горлѣ, кошорая не рѣдко бываетъ такъ опасна и зла, что очень легко можетъ превратиться въ аншоновъ огонь и мершвенность.

Въ такомъ опасномъ случаѣ болѣе надлежитъ спараться о излеченіи сей послѣдней болѣзни, прочій же способъ леченія шомъ же самой долженъ быть употребляемъ, какой предписанъ о кори.

А когда съ безпрерывнымъ жаромъ на шрепій или на четвертый день по разнымъ часнямъ шѣла выступяшъ пузырьки

подобныя пѣмѣ, какія бывають въ то время, когда настрекочашъ или нажалилъ кропивою голое пѣло, такія пятна называющыяся *кропивными*. Въ сей болѣзни больные чувствующиѣ у себя на поверхности пѣла нестерпимое сженіе и свербошу.

Сіи и другія тому подобныя пятна, смооря по различію припадковъ и опасности, надлежитъ пользованъ пѣмѣ же самымъ способомъ, какой выше предписанъ.

Г Л А В А XXXIII.

О р о ж ѣ.

Рожею та называется опухоль, которая горитъ, избѣдна краснѣетъ, рдѣетъ, чешется, въ своей окружности расширяется, и по большей части бываетъ на поверхности пѣла.

Сія болѣзнь можетъ случиться на всякой части пѣла, однако гораздо чаще примѣчается на лицѣ, на лядвяхъ и на ногахъ. Она иногда долго не стоитъ на одномъ мѣстѣ, но переходитъ то на то, то на другое мѣсто.

Когда она находится на поверхности пѣла и не касается ни мало внутренностей, то не предвѣщаетъ великой опасности.

Естьлижѣ она заразитъ внутреннія части или снаружи сокроется внутрь, то больного жизнь подвергается великой
опа-

опасности, съ которою не рѣдко соединяется и самая смерть.

И такъ когда рожа коснется оболочекъ мозгъ покрывающихъ, или заразитъ самое существо мозга, то въ сихъ частяхъ приключается жестокое воспаление; въ то время больные спраждунъ неснотною головою болью, и вскорѣ впадаюнъ въ бѣшенство, къ которому часно присовокупляюнъ жестокия судороги, за которыми обыкновенно слѣдуемъ смерть.

Жизнь больного не меншеи подвергается опасности, когда рожа вдрутъ перейдетъ въ легкое, въ желудокъ или въ кишки, потому что и въ сихъ частяхъ причиняемъ весьма опасное воспаление, которое въ скорости превращаеиъ въ антоновъ огонь.

Престарѣлыя люди и нѣ, коихъ нѣло наполнено оспрыми соками, когда спраждунъ рожею, всегда бываюнъ гораздо въ большей опасности нежели нѣ, которые крѣпки и здоровы и имбюнъ въ нѣлѣ своемъ хороше соки.

Многіе находяиъ такіе, у коихъ случаетъ рожа нѣсколько разъ въ году въ извѣстное время и приномъ всегда почти на одномъ мѣстѣ, но прежде нежели она выступиитъ наружу, чувствуюиъ она во всемъ нѣлѣ великую слабость, жаръ и слѣдующій по немъ ознобъ, очень шоскуюиъ и ночью не спятъ не имбютъ очины къ бѣдѣ, но мутатъ чрезвычайною жаждою;

потомъ въ обыкновенномъ мѣстѣ ощущающѣ сверботу или жаръ, и спустя не много времени оное мѣсто начинаетъ краснѣть.

Такіе больные, когда сія красная опухоль покажется, чувствуютъ въ себѣ довольное облегченіе, и когда сія опухоль благополучно опять пройдетъ, то получающѣ прежнее свое здоровье и способностъ къ исправленію своихъ обыкновенныхъ должностей.

У шаковыхъ людей сію рожу за спасительное средство починая должно, ибо она происходишъ отъ оспроты отдѣлившейся изъ крови, которая если бы въ ней скрывалась чрезъ долгое время, то произвела бы или крайнее поврежденіе крови, или другія опасныя болѣзни.

Рожа у спариковъ по большей части бываешъ на ногахъ, и часто съ безпрерывною и сильною сверботою; когда сія рожа всегда приходишъ въ свое обыкновенное время и продолжается надлежащимъ порядкомъ, при томъ страдающіе ею получаютъ нѣкоторое облегченіе отъ своей головной или грудной болѣзни, то можно ее признать полезною, и по большей части она обѣщаетъ долговременную жизнь и здоровье.

Какъ скоро примѣчено будетъ, что сія болѣзнь не наблюдаешъ надлежащаго порядка, и что внутреннія части особливо голова и легкія не совсѣмъ здоровы,

то

то должно сіе признать за худой знакъ, ибо онъ показываеиъ, что естественныя силы начинаютъ уже ослабѣвать и соки въ шѣлѣ такъ испорчены, что отъ сей оспропы не могутъ они болѣе совершенно очиститься, или выгнать оную изъ середины на поверхность шѣла, которою наконецъ внутреннія части не обходимо должны заразиться.

Иногда рожа бываетъ отъ особливаго повѣтрія, и въ то время она въ одинъ разъ ко многимъ приспаеиъ, однако по большей части случается она часпная, которая на нѣкоторыхъ только нападаеиъ.

Когда рожа очень глубока подъ кожею и чрезмѣрно болитъ, имѣеиъ цвѣтъ шемнокрасный и, ощущается въ ней жаръ и биеіе, то она конечно соединена съ наспоящимъ воспаленіемъ, и должно всегда ожиданиъ жеспокой лихорадки.

А когда такая опухоль вся находится на поверхности шѣла, и по срединѣ, которая у нее поднялась вверхъ, имѣеиъ цвѣтъ свѣтлоокрасный, а по краямъ блѣдный и при томъ мягка, то сіе значитъ, что рожа очень легка и безопасна.

Напротивъ, когда ея цвѣтъ красный темнѣеиъ или изчерна синѣеиъ, и показываются въ великомъ числѣ пузырьки наполненные оспрою и бдкою влажноспію, съ великимъ больнаго изнеможеніемъ, то сіе показываеиъ злую рожу, которая не рѣдко превращается въ антоновъ огонь и

мертвенность или производитъ весьма дурныя раны.

Естьли такая рожа скоропостижно перейдетъ во внутренности или заразитъ внутреннія части тѣла вмѣстѣ съ наружными, особливо голову либо грудь, то всегда почти бываетъ смертельна.

Когда рожа хорошаго свойства займетъ желѣзистыя части, то такія части не рѣдко перемѣняющіяся въ затвердѣлости, (scirrhus) еслили рожа худаго свойства, то въ оныхъ желѣзистыхъ частяхъ производитъ опасныя болячки, которыя вскорѣ обращаются въ ракъ.

Сырой, мокрой и холодной воздухъ, сильное и неумѣренное движеніе тѣла и чрезмѣрные труды, нечаянное проснуженіе, жестокой гнѣвъ и проч. часто бывающіе причиною рожи.

Когда рожа продолжается въ своей жестокости, то кожа покрывающая ее всегда бываетъ суха, а какъ скоро сія спанетъ слегка пошѣвъ, то должно ожидать, что такая опухоль въ скорости разойдется.

Не рѣдко сія болѣзнь, бываетъ очень шипа, и по тому въ скоромъ времени проходитъ, а часто случается очень жестока и упорна.

На тѣхъ мѣстахъ, на которыхъ бываетъ рожа, всегда почти отдѣлившись верхняя кожа на подобіе отрубей спадываетъ.

Когда рожа показывается на какой части шѣла, не причиняя никакого особеннаго беспокойства и между шѣмъ больной шѣломъ здоровъ, то долженъ онъ содержать себя въ умѣренной теплотѣ и днемъ часто пить по чашкѣ чаю правнаго подѣ №. 13. означеннаго, а больную часть окладывать мѣсечками съ бузиновыми цвѣтками, или обвертывать байкою наперши прежде ее камфорою.

Такимъ образомъ проходитъ болѣзнь очень легко и скоро.

Еслилижѣ съ самаго начала будетъ примѣчено нѣкоторое волнованіе крови, то должно кромѣ предписаннаго способа давать больному дважды или трижды въ день порошокъ подѣ №. 1. или лекарство подѣ №. 9. показанное.

Когда сія болѣзнь совсѣмъ пройдетъ, то всегда полезно дать больному легкое пропосное подѣ №. 3. 4. 5. 14. 38. означенное, дабы можно справедливо быть увѣрену, что въ шѣлѣ не останеся болѣе никакой нечистоты, которая бы могла со временемъ опять заразить внутреннія части и произвести какую либо опасность.

Еслили больной сію болѣзнь, по причинѣ ея тихихъ припадковъ, починя маловажною, не бережетъ себя ни мало, и безпрестанно выходитъ на сырой и холодной воздухъ, или садится въ такомъ мѣстѣ, куда проходитъ сквозной вѣтеръ, то не рѣдко случается, что чрезъ такую не-

неосторожность опухоль становится весьма жестокою, продолжительною, твердою, темнокрасною, неровною и опасною.

Но для отвращенія такой опасности должно снаружи положить мягчительной зеленой пластырь (*emplastrum de melliloto*) или пластырь лабдановой, (*emplastrum de labdano*) а внутрь употреблять лекарство подъ No. 135. вмѣстѣ съ чаемъ подъ No. 13. или 116. предписаннымъ.

Когда рожа безпрестанно съ одного на другое мѣсто переходитъ, и не стоитъ въ одной части, то кромѣ объявленныхъ лекарствъ, давать больному черезъ три или четыре дни, еслии его силы позволяющъ, легкое проносное; еслии же по причинѣ слабости больного сдѣлать сего не можно, то сіе же самое лекарство должно чаще сдѣлать въ видѣ промывательныхъ, или давать по утрамъ и въ вечеру порошокъ подъ No. 3. показанный, дабы такимъ образомъ всегда было на низѣ свободно, сей способъ выгоняетъ изъ тѣла переходящую рожи маперію и предохраняетъ отъ дальнѣйшихъ несчастныхъ приключеній.

Однако часто сія болѣзнь не бываетъ столь шиха, но больные съ самаго ея начала мучатся жестокимъ продолжительнымъ ознобомъ и содроганіемъ, очень тоскуютъ, чувствуютъ стѣсненіе въ груди, имѣютъ великое отвращеніе отъ всякой пищи и безпрестанно спраждаютъ головную

ною болью, ощущающъ подъ ложкою чувствительное давленіе, не рѣдко имѣютъ понужденіе на рвоту, по томъ бросаетъ ихъ въ сильной жаръ, мучатся несносною жаждою, біеніе въ жилахъ ощущается шумное, твердое и полное, иногда они заговариваются и тяжело дышатъ, по томъ на третій а гораздо чаще на четвертый день показывается рожа, и прежніе припадки по большей часи утихаютъ, брѣженіе и тяжелое дыханіе прекращаются.

Есѣлижъ по выступленіи рожи не будетъ никакого облегченія, шрудное дыханіе продолжается и больной ни мало не переспаевъ брѣдитъ, то такой больной находящійся въ великой опасности.

Слѣдовательно когда сія болѣзнь будетъ при первомъ своемъ нападеніи сопряжена съ столь опасными припадками, то по томъ часъ надлежитъ больному давать много пить жидкихъ отваровъ подъ №. 6. 7. 8. 13. 40. означенныхъ, и есѣли біеніе въ жилахъ твердое, полное и шумное, то смотря по силамъ больного нужно ему пускить кровь, спавить прохладительныя промывательныя, также спавить въ ванну ноги и прикладыватъ къ подошвамъ спирекопныя густыя припарки, или квашеное тѣсто съ горчицею дабы отвратить сильное стремленіе крови отъ головы.

Есѣлижъ примѣчена будетъ въ желудкѣ или въ кишкахъ оспрая нечистота

или

или что нибудь такое, чего желудокъ не могъ сварить, тогда, какъ въ безпрерывной лихорадкѣ, надлежитъ дать больному легкое проносное, или вмѣсто прежнихъ опшваровъ тѣхъ, которые подѣ №. 11. 39. 141. 198. предложены.

Однако всегда должно прилѣжно смотрѣть, чтобы кровопусканіями или проносными не привести больного въ слабость, которая препятствуя порядочному теченію болѣзни легко можетъ подать поводъ болѣзненной матеріи обратиться во внутреннія части.

Еслилижъ рожа вышла уже на поверхность тѣла, но хотя и будучи прежніе опасные припадки, но больной чувствуетъ въ себѣ опѣ того нѣкоторое облегченіе, то должно одни только продолжати жидкительные и смягчительные опшвары или вмѣсто сихъ давать травной чай подѣ №. 13. и лекарства подѣ №. 12. 187. означенныя, а снаружи прикладывать къ больному мѣсту мѣшечки съ бузиновыми цвѣтками, или кусокъ байки нашерпой камфорою.

Когда сія опухоль очень жестка, пуга и какъбы горитъ, то полезно черезъ три или четыре дни давать, какъ прежде сказано, проносное.

Какъ скоро жаръ и пугость на опухоли уменьшится, то сіе мѣсто по большей части начинастъ весьма сильно зудѣть, въ такомъ случаѣ можно сдѣлавъ больному великое облегченіе, еслии черезъ три

три часа пригрѣвать больную часть грецкою губкою обмоченною въ теплое лекарство подѣ №. 208. и по томъ оперши насухо оную часть покрыть опять обьявленными мѣшечками.

А когда при находящейся опухоли больной брѣдитъ не переставя, и дышетъ тяжело, однако имѣетъ бѣшеніе въ жилахъ крѣпкое и довольныя силы, то надлежитъ ему давать въ великомъ количествѣ жидкія и мягчительныя выше упомянутыя ошвары и привязать къ подошвамъ съ горчицею мѣшечко подѣ №. 291. естлижъ сіе мало подѣиснуетъ, то положить къ замышку и къ ножнымъ икрамъ нарывныя пластыри.

Когда рожа по наружному своему виду показывается хорошею и порядочною, то ничего особливаго не должно опасаться, ибо часто случается, что когда наружная болѣзнь начинаетъ проходить, то вмѣстѣ и внутренныя припадки пропадаютъ.

Естлижъ рожа снаружи имѣетъ у себя цвѣтъ худой, или не такъ, какъ должно, вверхъ поднялась, также и многіе оказывающіяся пузырьки наполненные острою жидкостію, при томъ силы очень слабы, бѣшеніе въ жилахъ слабое и малое, больной безпрестанно брѣдитъ, и весьма тяжело дышетъ, то сіе значитъ, что онъ находится въ немалой опасности.

Въ такомъ случаѣ должно сшить мѣшечки съ травами подѣ №. 247. показан. по томъ
ошва-

опварить ихъ въ виноградномъ винѣ и приложивъ теплые къ больному мѣсту, и какъ скоро сіи начнутъ простываться, то надлежитъ новые положить. А внутрь всякой часъ давать по чашкѣ лекарсва подъ No. 70. или подъ No. 28. 117. означеннаго, или симъ подобныя крѣпительныя и прошивающія гнилоспи пакъ какъ въ гнилыхъ лихорадкахъ и гнилыхъ болѣзняхъ, и все сіе продолжать до тѣхъ поръ, пока окажется довольное поправление болѣзни.

Когда рожа хотя и хорошаго свойства, но нечаянно внутрь скроется и коснется легкихъ, то отъ того приключается очень сильное смѣшеніе въ груди, дыханіе становится тяжелое съ шоскою, и больной начинаетъ кашлять.

Въ семъ случаѣ смотря по силамъ больного должно пустить ему довольно крови, положить на зашылокъ и къ икрамъ нарывныя пластыри и давать пить много опвару подъ No. 248. отъ котораго часто въ короткое время выпустается по всему тѣлу потъ и шоска отходитъ, и по тому сіе питье надлежитъ продолжать нѣсколько времени.

Часто послѣ сихъ лекарствъ на второй, на третій или на четвертый день больной выхаркиваетъ много слизи и тноистой харкопины, чувствуя въ себѣ великое облегченіе, и на послѣдокъ освобождается отъ всей опасности.

Есть-

Естьли харкотина не свободно выхо-
дитъ, то надлежитъ пособлять лекар-
ствами подъ No 32. 33. 34. предписанными.

А когда употребивъ помянутыя ле-
карства, кашель продолжается очень же-
стокой, сухой, безпреснанной и приводитъ
больного въ разслабление, отъ чего онъ
ночью не можетъ уснуть, то такой-ка-
шель должно укрощать усыпительными
лекарствами подъ No. 80. 81. 83. означен-
ными; естьли и отъ сихъ нѣтъ никакого
облегченія или тоска и прочіе припадки
еще болѣе умножаются, то сіе должно
признать знакомъ смертельнымъ.

Такимъ же образомъ надлежитъ по-
спупать и въ то время, когда рожа ока-
зется во внутренности головы.

Иногда сверху сей опухоли случают-
ся большіе водяные пузырьки, которые не-
медлѣнно надлежитъ по правиламъ иску-
сства прорѣзать и выпустить опунда
оспрошу. Частю такіе пузырьки сами со-
бою прорвавшись испускаютъ сію
оспрую матерію; въ такомъ случаѣ дол-
жно бережно омыть сію оспрошу лекар-
ствомъ подъ No. 208. и сверху безпре-
станно прикладывавъ сухіе мѣшечки съ
мукою ржаною или бобовою, куда приба-
вить не худо нѣсколько камфоры; такое же
дѣйствіе произойдетъ естьли оную рану
посыпать сверху порошкомъ подъ No. 303.
означеннымъ.

Такого рода раны засыхая часто дѣлають темноватой и толстой спрунь; которой надлежитъ почаще днемъ примачивать теплою водою или молокомъ, дабы онъ размягчавшись скорѣе опвалился, ибо часто скрывающаяся подъ симъ спрупомъ острая манерія глубоко раздѣляетъ части, однакожъ никогда не должно прежде времени или насильно опрывать сего спрупа; а дабы сей спрунь скорѣе опсхалъ, то можно также приложить къ нему зеленой пластырь (*emplastrum de meliloto*).

Еслилижъ рожа глубока и соединена съ воспаленіемъ, то въ семъ случаѣ пакъ поступитъ какъ съ воспалишельною болѣзнію, и безпрестанно снаружи прикладывать теплые мѣшечки съ травами подъ No. 235. въ водѣ вареными, которые перемѣнять почаще должно.

Очень жестокая и упорная рожа всегда почти обращается въ жесткую окрѣплость или въ ракоподобную (*carago*); сїи зашвердѣлости благополучно иногда разводятся лекарствами подъ No. 60. 91. означенными, естли только больной сверхъ того будетъ много пить травнаго чаю подъ No. 13. 45. 116. предписаннаго. А когда изъ шакowychъ зашвердѣній сдѣлаются опасныя раны, то ихъ должно всякой день по два раза очищать и бережно омывать лекарствомъ подъ No. 59. означеннымъ, и потомъ покрывать ихъ корпією обмоченною
въ

въ сѣжѣ самое лекарство. Также оныя лекарства, естли откроются заковыя раны (sinus) или рыттики (fistula), можно съ пользою въ нихъ впускать помощію насоса.

Когда рожа начинается превращаться въ аншоновъ огонь, то можно внутрь больному давая перуанскую лихорадочную корку, которая доставляетъ великую пользу; а снаружи также хорошо прикладывая мѣшечки съ травами подъ No. 247. означенными, отваривъ ихъ первѣе въ виноградномъ винѣ.

Естлижѣ спарики, кои какъ бы привыкли уже къ обыкновенно приходящей къ нимъ рожѣ, которая всегда порядочно оканчиваясь сохраняла ихъ здоровье, но отъ старости лѣтъ спанувъ ослабѣвать въ своихъ силахъ, и по тому отъ обыкновенной рожи не чувствуютъ болѣе уже прежняго облегченія; то надлежитъ имъ дать, естли ихъ силы не препятствуютъ, легкое проносное, или легкое мочегонительное лекарство, дабы вынести изъ тѣла острошу.

Также весьма хорошее дѣйствіе производитъ искусственнымъ образомъ сдѣланная на приличномъ мѣстѣ болячка (tontanella), которую должно чрезъ долгое время держать открытою или въ шеченіи.

Часто примѣчаются еще другіе виды рожи; ибо иногда въ различныхъ мѣстахъ

на поверхности тѣла выходитъ темно-красное пятно, которое чрезвычайно бо-лишь и ощущается въ немъ весьма силь-ной жаръ какъ бы огонь жжетъ и такое пятно окружено многими маленькими пу-пырышками наполненными острою при-чиняющею несносной жаръ и свербезъ, ко-торые не рѣдко возбуждаютъ жестокое воспаление и поему подобную лихорадку. Однако иногда въ сей болѣзни и не бы-ваетъ лихорадки, но страдающіе чувстви-ютъ только въ больномъ мѣстѣ несшер-жимой зудъ и жаръ.

Сей видъ рожи называемый *священ-нымъ огнемъ* или *Святаго Антонія* (*ignis sacer sive sancti Antonii*) по большей части бы-ваетъ на груди и расходитъ по всей спинѣ, но только на одномъ боку не касаяся другаго либо очень мало, такая рожа въ видѣ опухоли поднимается не много выше прочей кожи и имѣетъ на себѣ цвѣтъ желтоокрасноватый. Также сія опухоль часто бываетъ съ одной только стороны лица, однако гораздо чаще при-мѣчается на животѣ на подобіе пояса, отъ чего она и называется *широкимъ по-ясомъ* (*zona lata*).

Такіе виды рожи часто бываютъ весь-ма упорны и не преодолеваятся никакимъ почти леченіемъ, иногда по причинѣ же-стокой лихорадки нужно пустить кровь и для приведенія ея въ умѣренность да-вать больному холодильныя лекар-ства

сива подѣ № 9. 12. 187. 148. показанныя даваемыя чрезъ долгое время; естѣлижъ отъ сихъ не будетъ довольно на низѣ, по вѣ промежуточное между ими время надлежитъ давать проносное.

Снаружи больное мѣсто должно чаще пригрѣвать лекарствомъ подѣ №. 203. отъ котораго бываеиъ великое облегченіе.

Естѣлижъ все сѣи не произведутъ никакого успѣха, то кромѣ жидишельныхъ опваровъ подѣ №. 13. 45. 116. упомянутыхъ надлежитъ употреблять лекарства подѣ № 115. 179. 180. показанныя, которыя часно совершенно прогоняютъ болѣзнь.

Г Л А В А XXXIV.

О пострѣлѣ или ударѣ,

Естѣли кто вдругъ лишившись всѣхъ своихъ чувствъ, подобно человѣку погруженному въ преглубокой сонъ, безъ чувствъ и безъ движенія лежишъ поверженъ, или, вдругъ упавши безъ чувствъ на землю, дышеиъ съ великою шрудностію и храпѣніемъ, то такого больного надлежитъ признаиъ за пораженнаго *пострѣломъ* или *ударомъ* (apoplexia).

Иногда нападеніе сей болѣзни бываеиъ такъ скоропоспѣжно и жестоко, что такіе люди въ одинъ разъ лишаются и жизни; а иногда еще нѣсколько часовъ или нѣсколько дней живуиъ, иныежъ получивъ свои силы опяиъ выздоравливаюиъ.

Когда больные дышутъ очень тяжело и неровно; когда безпрестанно храпятъ, изъ рта идетъ пѣна и лежатъ во вся безчувственны, біеніе въ жилахъ имѣютъ неровное, скорое, слабое и пріоспанавливающееся, лице надутое, синее или почернѣлое; когда выступаетъ у нихъ по всему тѣлу, особливо на составахъ, густой потъ, больной нечувствительно марається и никоимъ образомъ ничего не можетъ проглотить: по изъ сихъ обспоятельствъ можно вѣрно заключить, что больной не выдержитъ никакого жестокаго пораженія, ибо сія болѣзнь по большей части есть смертельна.

Естьлижъ припадки будутъ не очень жестоки, и по учиненіи приличныхъ и нужныхъ вспомошествованій, оказывається въ скоромъ времени нѣкоторое облегченіе, то можно надѣяться, что больной выздоровѣетъ.

Часто пораженія пострѣла очень бывають легкія, и больные, въ скоромъ времени пришедши въ чувство, ощущають только въ своемъ тѣлѣ усталость и въ членахъ расслабленіе. Иногда они хотя и не мѣшаются въ разумъ, но порядочнаго движенія языкомъ не имѣютъ, или какая нибудь другая часть ихъ тѣла отнимается и пребываетъ безъ всякаго чувствія и движенія.

Сіи легкіе припадки не рѣдко предзнаменуютъ будущій весьма жестокой пострѣлъ,

спрѣлъ, который очень часто дѣлаетъ неподвижнымъ (параличнымъ) все тѣло или одну половину всего тѣла, а иногда приноситъ и самую смерть.

Часто въ головѣ умершихъ пострѣломъ находящіяся кровные сосуды чрезмѣрно разширены отъ скопившейся въ нихъ много огустѣлой крови, или обрѣтаются истекшая кровь либо иная склизкая водяная матерія, а не рѣдко и самой гной въ мозговыхъ пуспотахъ, ямкахъ или его впадинахъ (*ventriculi cerebri*).

Всѣ таковыя причины спѣсняющъ какъ головной мозгъ, такъ и мозгъ проходящій чрезъ всю спину, и потому чувствительныя жилы, разсѣянныя по всему тѣлу имѣя свое начало отъ оныхъ частей, лишаются своихъ дѣйствій, безъ которыхъ человекъ не можетъ ни двигаться ни чувствовать. Еслили сіи причины съ самаго начала будутъ такъ жестоки, или часть отъ часу такъ умножаются, что наконецъ сожмутъ или списнутъ мозгъ и производящія отъ него чувствительныя жилы, то скоропостижную смерть неопмѣнно должна послѣдовать.

Бывающъ случаи, въ которыхъ явной причины смерти не находится ни въ мозгу ни въ иной какой части тѣла, но такой пострѣлъ происходитъ или отъ скоропостижной онѣмѣлости (*paralysis*) чувствительныхъ жилъ или отъ кровотеченія, либо отъ инаго

чрезмѣрнаго испраженія какихъ нибудь другихъ тѣла жидкостей.

Люди, которые имѣютъ въ своемъ тѣлѣ великое количество огустѣлой крови, и при томъ сія у нихъ очень стремительно протекаетъ чрезъ свои сосуды, также и тѣ, которыхъ тѣло наполнено очень густою, кленкою и водяною мокротою, суть расположены къ поснрѣлу.

Облаивъ когда они кромѣ сего имѣютъ большую голову, коронную шею, тѣла ихъ толсты и жирны, при томъ не блѣдаютъ какъ въ пищѣ шакъ и другихъ своихъ поступкахъ никакой умеренности, пьютъ много горячихъ напитковъ, дѣлаютъ нечаянныя и весьма сильныя тѣлодвиженія, проводятъ свою жизнь въ праздности и въ роскошахъ; къ таковымъ необыкновеннымъ дѣйствіямъ присоединяется жестокой и скоропостижной гнѣвъ, страхъ и проч. подають случайную причину къ сей весьма опасной болѣзни.

Еслилижъ такіе люди будутъ вести свою жизнь порядочно и согласно своему природному сложенію, и заблаговременно снѣдывая употреблять предохранительныя и приличныя въ сихъ случаяхъ средства, то могутъ совершенно избавишься отъ сего зла.

Въ сей болѣзни надлежитъ весьма рачительно и сколько возможно изыскать, зависятъ ли она отъ многокровія или отъ

склиз-

склизкой, клейкой, водяной и острой мокроты.

Ибо смотря по различію сихъ причинъ, надлежитъ избирать и различной способъ леченія.

Когда пострѣлъъ произходишь отъ многокровоія, то больные часто передъ наступленіемъ онаго чувствуютъ въ головѣ тяжесть и нѣкоторую боль, говорятъ, что у нихъ кружится голова и шумитъ въ ушахъ, глаза у нихъ краснѣютъ и горятъ, память слабѣетъ, языкъ тяжелѣетъ, шрясется и непорядочно въ произношеніи рѣчи движется, конечности иѣла какъ то руки, ноги, уши и проч. холодѣютъ, нѣмѣютъ или бываютъ нечувствительны, больные безпрестанно клоняшся ко сну, однако не могутъ спокойно спать по причинѣ страшныхъ и ужасныхъ сновидѣній, на послѣдокъ сїи больные, естли не поддерживають ихъ руками, вдругъ лишившись всѣхъ чувствъ, повергаются на землю.

Естли изъ предшедшихъ знаковъ и изъ расположенія больного, по красному или синему надутому его лицу, по бїенію жилъ полному, крѣпкому и проч. окажется, что причиною пострѣла естъ многокровоіе, то ни мало не медля должно успишь ему изъ ноги крови сполько, пока бїеніе въ жилахъ сдѣлается мягкое и слабое и лице нѣсколько поблѣднѣетъ.

Отъ сего часто случается, что при началѣ болѣзни учиненное изобильное кровоупущеніе избавляетъ больного отъ всей опасности, хотя пакіе больные послѣ того получивъ легкой обморокъ зябнутъ и напослѣдокъ блюютъ, но послѣ того приходяиъ въ чувство, глаза открываютъ, опомниваются, смолряютъ на предстоящихъ и узнаютъ каждого изъ нихъ, показываютъ нѣкоторые знаки, что ониу же чувствуютъ; чію все подаетъ хорошую надежду о больномъ; на пропивъ того, когда выпущенная во многомъ количествѣ кровь никакого не дѣлаетъ вспоможенія, то сіе показываетъ, что больной находится въ великой опасности.

По учиненіи кровоупущенія, должно помощію оспрыхъ промывательныхъ подъ No. 224. также жидипельныхъ лекарствъ и проносныхъ, привести огустѣлую кровь въ движеніе и отвлечь ея стремительное теченіе отъ головы, такіа лекарства видѣшь можно подъ No 39. 139. 141. 167. и сверхъ сего привязать къ подошвамъ горчичное тесно подъ No. 291. показанное.

Когда бѣеніе въ жилахъ послѣ всего онаго опять увеличивается и продолжается полное, крѣпкое и тугое, то спустя одинъ часъ опять надобно пустить кровь, которое должно черезъ два или три часа повторять столько разъ, сколько сего будетъ требовать бѣеніе жилъ, силы больного и прочія обстоятельсшва.

Есть-

Естьлижъ больной отъ того чувствуешь въ себѣ иѣкоторое облегченіе, біеніе въ жилахъ имѣетъ не споль полное, швердое и шугое, то съ кровопусканіемъ бережливо надлежитъ поступать, однако прежнія продолжая лекарства до ипѣхъ поръ, пока послѣдуетъ довольное поправленіе болѣзни, и въ то время должно уже давать лекарства въ меньшемъ количествѣ или избирать легчайшія.

Но когда по довольномъ выпущеніи крови, и по употребленіи средствъ способствующихъ къ испражненію изъ чело-вѣка другихъ жидкостей, не оказывается никакого поправленія, или хотя и сдѣ-лается, однако не на долго, и больной на-чинаетъ опять мѣшаться въ умъ или по-гружается въ глубокой сонъ, тяжело ды-шетъ и проч. то должно приложить на-рывной пластырь къ икрамъ и къ запыл-ку, и еслили необходимость требуетъ, то и ко многимъ мѣстамъ, оспричь у больного на головѣ волосы, мыль чаще ему лице студеною водою и къ острижен-ной головѣ прикладывать разбивающія припарки, по ниже ушей припустить пѣ-вицы, также можно испытать приставить къ запылку, къ плечамъ, или по-выше плечъ сухія либо сосательныя крове-банки (suscubitaе); однако прежнихъ ле-карствъ не должно во вся оставлять.

Но еслили всѣ сїи употребивъ сред-ства, не окажется никакого явнаго и по-сто-

стояннаго поправленія, то остается малая надежда къ выздоровленію больного.

Однако случается иногда, что въ то самое время, когда больной находится весьма близокъ къ смерти, вдругъ пойдетъ кровь изъ носу, или потечетъ изъ головы другая маперія, либо сдѣлается сильной поносъ или жестокая рвота, или помощію природы откроется текущій печечуй, отъ чего не рѣдко получаетъ больной сверхъ всякаго чаянія скорое облегченіе и часомъ приходитъ въ совершенное здравіе.

Пока жилы бьются очень крѣпко и ощущаются въ тѣлѣ великой жаръ, то до тѣхъ поръ не должно употреблять горячительныхъ лекарствъ, какъ внутреннихъ такъ и наружныхъ, остерегаться отъ крѣпительныхъ и возбуждающихъ, ибо сѣи въ такихъ случаяхъ употреблены будучи приключаютъ великой вредъ.

Еслилижъ естественныя силы ослабѣютъ и бѣненіе въ жилахъ ощущается слабое и неровное, то приличны лекарства слегка разгорячающія и укрѣпляющія, какія подъ No. 17. 18. 23. 79. означены, отъ которыхъ иногда силы умножаются, выступаетъ по всему тѣлу довольной потъ, и отъ того не рѣдко бываетъ явное приращеніе здоровья, однако никогда не должно производить такого поту содержаніемъ больного въ чрезмѣрной теплотѣ.

Естьлижѣ и сїи средства не учинятѣ никакого вспоможенїя, шо нѣтъ никакой надежды, чшобы больной выздоровѣлѣ.

Иногда случается нѣкошорой родѣ горячаго или кровнаго пострѣла (арорplexia calida) вѣ шо наипаче время, когда послѣ великаго жару и сухосши вѣ воздухѣ вдругѣ сдѣлается погода мокрая, сырая и холодная.

Часто сею болѣзнїю одержимы бывають шѣ, которые вѣ жаркое время какимѣ нибудѣ случаемѣ сильно простуживаются, или по причинѣ своихѣ обыкновенныхѣ нуждѣ принуждены обращаться долгое время на шакомѣ воздухѣ, хотя они прежде не имѣли никакого расположенїя кѣ шаковой болѣзни.

Сѣ самага начала сїи больные чувствуютѣ вѣ шѣлѣ ознобѣ, слабость и усталость, пономѣ спѣсненїе вѣ груди, тоску и шяжелое дыханїе, послѣ сего слѣдуетѣ боль вѣ головѣ и круженїе, пошомѣ жалуются, что у нихѣ какая нибудѣ часть шѣла, либо половина всего шѣла, т. е. плечо, бокѣ и ноги одной стороны теряють движенїе и чувкость, напослѣдокѣ нашедши на нихѣ сильной обморокѣ, лишаются всѣхѣ чувствѣ, и больной не имѣя памяти, чувствѣ и никакого движенїя упадаетѣ на землю.

Бїенїе жилѣ по большей части бываетѣ шугое и скорое, дыханїе шрудное и шяжелое.

Во время сихъ припадковъ должно больному пустить много крови, и смотря по обстоятельствушамъ оное повтoришь.

Также должно чаще спавить промышельныя, и давать въ довольномъ количествѣ пить мягчительныя, жидительныя и слегка холодительныя отшвары подѢ No. 6. 7. 8. 9. 11. 39. 40. показанныя и приложить къ подошвамъ кислое тѢсто съ толченою горчицею.

Такія средства производятъ скорое вспоможеніе, и больные опамятываются; но или вовсе опнимается у нихъ языкъ, или говорятъ съ трудностію и заиканіемъ, а тѢ части, на копорыя, они прежде жаловались, что не чувствуютъ и никакого движенія не имѣютъ, на всегда у нихъ остаются параличными или лишенными всей своей чувствительности и движенія.

Многіе изъ спраждушихъ въ то время начинающъ кашлять и выплевывать склизкую и клейкую харкоту, съ безпрерывнымъ біеніемъ жилъ лихорадочнымъ.

И по тому надлежитъ продолжатъ прежнія лекарства, а для споспѣшествованія выплевыванію харкотины давать еще лекарства подѢ No. 32. 33. 99. объявленныя.

Когда кашель и лихорадка больного мучитъ, то дѣлать ему наружныхъ шреній и давать возбуждающихъ лекарствъ не нужно, ибо горячительныя лекарства
внутри

внутри даваемые всегда усиливаютъ болѣзнь.

Но часто примѣчается въ больномъ не очень большая лихорадка, и бѣненіе жилъ мало различествуетъ отъ обыкновеннаго, въ то время не нужно пускать крови, а для продолженія сею зла довольно питье жидительное и слегка разтворяющее, какое подъ No. 8. 46. 72. показано.

Иногда отъ удержаннаго испаренія нечаяннымъ простуженіемъ шѣла, голова такое получаетъ поврежденіе, что люди погружаются въ глубокой сонъ, и лежатъ воя нечувствительны, однако дыханіе у нихъ во всемъ свободное, бѣненіе въ жилахъ тихое и едва скорѣйшее отъ природнаго и не видно никакихъ опасныхъ припадковъ.

Въ семъ случаѣ должно поставить промывательное и давать чаще пить отваръ подъ No. 13. 40. или подъ No. 72. означенный, по томъ слегка шереть все шѣло и покрыть его одѣялами, дабы оно нѣсколько воспѣло, такимъ способомъ сии больные вскорѣ и легко выздоравливаютъ.

Не меньше и въ семъ случаѣ должно воздерживаться отъ всѣхъ горячительныхъ лекарствъ, включая людей, которые суть холоднаго и мократнаго сложія, но вмѣсто таковыхъ могутъ употребляемы бытъ лекарства подъ No. 17. 18. 23. показанныя, елики сии не принесутъ

суть въ скоромъ времени облегченія, то положить къ икрамъ нарывные пластыри и чаще ставить промывашельныя.

Холодному или мокротному пострѣлу (*apoplexia frigida seu serofa*) тѣ только бывающіе подвержены, которые имѣютъ тѣло надутое и наполненное клейкими и густыми мокротами, или тѣ, у которыхъ въ кровныхъ сосудахъ находится слабая, разжиженная, водяная или соединенная съ острою кровью.

Часто мозговые сосуды будучи наполнены такою клейкою и вязкою маперією такъ разширяются, что прижимая чувствительныя жилы причиняющіе холодной пострѣлъ; но гораздо чаще случается, что такая тонкая мокрота испекается въ ямки мозговые, особливо когда кровь разжиженная сдѣлалась водяною или острою, произшедшій отъ того пострѣлъ рѣдко излечивается; хотя въ первомъ случаѣ, то есть, когда пострѣлъ происходитъ отъ многокровія, употребленныя средства часто производятъ желаемой успѣхъ.

Подверженные холодному пострѣлу, передъ наступленіемъ онаго обыкновенно чувствуютъ въ своемъ тѣлѣ усталость, тяжесть въ головѣ, слабость въ умѣ, и непрерывное круженіе головы, мало по малу теряютъ память и когда спанутъ что рассказывать, то забываются о чемъ они хотѣли говорить, многократно впадаютъ въ глубокой сонъ, такъ что не успѣ-

успѣютъ они сѣсть или заснуть, какъ уже и начинаютъ сильно храпѣть, при томъ будучи лишены всѣхъ своихъ чувствъ, ни мало не чувствуютъ, чѣмъ надъ ними ни происходило, часто у нихъ одна какая нибудь часть отнимается или лице необыкновеннымъ образомъ скривляется, но въ скоромъ времени опять получаетъ прежній свой видъ и движеніе.

У пораженныхъ холоднымъ пострѣломъ всегда дѣлается лице похудѣлое, блѣдное и нѣсколько синее, бѣеніе въ жилахъ слабое, малое неровное и часто прѣоснапавливается, дыханіе прудное и тяжелое.

Во время сихъ признаковъ никогда не должно крови пускать, но поснавить больному крѣпкое промывашельное подъ No. 137. 224. означенное и потѣ часъ положить на затылокъ и къ ножнымъ икрамъ нарывной пластырь, а для отвлеченія мокроты оу головы давать лекарства подъ No. 4. 5. 14. 42. 43. 110. 139. 154. 155. 156. 157. 158. предписанныя, также переть ему ноздри и виски подъ No. 104. означеннымъ лекарствомъ.

Еслили больной послѣ сего станеть приходить въ себя или показывать явные знаки чувствительности, то можно надѣяться, что онъ выздоровѣетъ.

По довольномъ и надлежащемъ очищеніи шѣла можно больному давать лекарства горячительныя, разшворяющія и

мочегонительныя, какія подъ №. 17. 18. 22. 23. 79. 113. находящіяся, и умноживъ число нарывныхъ пластырей; часпо великое пособіе дѣлаеиъ пластырь подъ №. 225. находящійся положенный на голову, на кошорой надлежишъ прежде обрѣиъ волосы.

Естли больные посредствомъ тако-го леченія начнуиъ по малу приходитъ въ чувство, то надлежитъ продолжать тѣ же самыя лекарства, однако между тѣмъ должно чаще промывашельныя спавишъ и давать иѣкоторыя изъ предписанныхъ проносныхъ.

Очень горячительныя лекарства и очень возбуждающія не меньшій причиняюиъ вредъ и въ семъ случаѣ, какъ и въ прежнихъ, однако естли и сїи никакого усиѣха не произведутъ, то не лзя надѣяиъся, что больной выздоровѣиъ.

Однако къ щастію больного часпо случаетъся, что огустѣлая мокрота въ мозгѣ растворяется и истекаетъ въ гортань во многомъ количествѣ; въ то время примѣчается, что больной безпреспанно какъ бы что глотаетъ, кошорый спусиъ не много времени выкидываетъ рвошю, либо выходитъ у него поносомъ много клейкой склизы или водяной острой маперїи.

Часпо отъ сего больной чувствуетъ въ себѣ довольное облегченіе, а не рѣдко еще и въ большую приходитъ слабость,

и

и наконецъ отъ ощущаемаго въ себѣ великаго холоду шрясается всѣми членами и умираетъ.

Когда у больного при самомъ началѣ примѣчается бѣненіе въ жилахъ очень слабое, а по принятіи объявленныхъ лекарствъ спановится крѣпче, холодныя конечности пѣла согрѣваются, блѣдной въ лицѣ цвѣтъ перемѣняется въ красной, и сверхъ всего сего больной всякое предписанное ему питье принимаетъ съ охотою, копорая показываетъ въ немъ великую жажду, то надлежитъ сіе почесть за хорошее предвѣщаніе, ибо при такихъ обстоятеляхъ захъ природныя силы возобновляются, и приходишь на больного лихорадка, копорая для него въ семъ случаѣ весьма полезна.

А худое предвѣщаніе, естли лихорадка окажется столь жестокая, что больного приведешь въ бѣшенство, въ которомъ онъ находясь, не принимаетъ никакихъ лекарствъ; въ семъ случаѣ не иначе съ нимъ должно поступать, какъ въ оспыухъ или злыхъ лихорадкахъ.

Выздорабливающіе онъ холоднаго пострѣла для возобновленія своихъ силъ и здоровья перебуишь гораздо большаго времени, нежели тѣ, копорые оправляются отъ горячаго или кровнаго.

Когда пострѣлъ поражаетъ больного, который онъ иной прежде бывшей въ немъ болѣзни уже приведенъ въ великое

изнеможеніе, или который имѣетъ въ тѣлѣ соки во вся испорченные и такъ острые, что часши тѣла и сосуды, въ коихъ они содержатся, разбѣдаютъ, слѣдовательно причиняютъ испеченіе мокроты въ мозгъ, по такой больной никогда почти не можетъ избѣжать смерти.

Многокровные люди, и которые, по природному своему сложенію расположены къ пострѣлу, могутъ отворатить сіе зло, когда будутъ употреблять пищу и питье холодительное и жидительное, содержащее себя въ теплотѣ, которая болѣе походитъ на холодъ, избѣгаютъ всякихъ горячительныхъ, возбуждающихъ крѣпкихъ напитковъ, воздерживаются отъ кушаньевъ приправленныхъ съ пряными зельями и очень пипательныхъ, уклоняться сколько возможно отъ всѣхъ сильныхъ душевныхъ и тѣлесныхъ движеній, и какъ скоро почувствуютъ въ себѣ нѣкоторое умноженіе крови или великое ея волнованіе, то и въ часъ должны употреблять лекарства холодительныя, жидительныя и проносныя. Еслилижъ отъ сихъ не уменьшится многокровіе, то надлежитъ неоптѣнно нѣсколько разъ въ году пускать имъ кровь; но никогда не должно безъ крайней нужды пріучать ихъ тѣло къ кровопусканію, также въ семъ случаѣ особливую пользу дѣлаютъ промывательныя и спавленіе ногъ по колѣна въ теплую воду.

А у которыхъ кровь въ жилахъ холодная, клейкая, склизкая, тѣмъ можно позволить умѣренно употреблять пищу съ пряными зельями или кореньями, горячія и крѣпкія напитки, принимаютъ почаще лекарства разбивающія склизкость соковъ, мочегонительныя и легкія слабительныя, при томъ всегда они должны имѣть умѣренное тѣлодвиженіе.

Если больной ощущаетъ слабость или шупость въ умѣ, тяжесть или безпрерывную нѣкоторую боль въ головѣ, то надлежитъ ему чаще давать кое-что изъ лекарствъ выше упомянутыхъ; въ семъ случаѣ также весьма пригодно иногда симъ больнымъ привязывать пониже запястка нарывной пластырь съ тѣмъ, чтобы изъ сего мѣста, къ которому оной былъ приложенъ, долго текла матерія; или открытъ по правиламъ искусства на приличномъ мѣстѣ ранку (fontanella) либо зашпунуть заволоку (letacium).

У людей умершихъ пострѣломъ часно по всему тѣлу и на лицѣ примѣчающіяся пятна или полосы изчерна синеващія: и часто также у оныхъ скоропостижно умершихъ, особливо у тѣхъ, которые прежде были многокровны и здоровы, лице и губы оспающія красными; иногда сія краска бываетъ съ нѣкоторою живо-стію, или, когда спанетъ растворяется кровь въ мертвомъ тѣлѣ, переходитъ съ одного на другое мѣсто, такъ что есть-

ли кто издали посмотритъ на сихъ мертвыхъ, то никакъ не почтетъ ихъ мертвыми; но по прошествіи нѣсколькихъ часовъ они начинаютъ помалу блѣднѣть, и напослѣдокъ такой живой цвѣтъ дѣлается мертвымъ, и тѣло начинаетъ пахнуть мертвечиною.

Все сѣи перемѣны и произшествія въ тѣхъ сущъ сходны съ законами природы, и по тому не должно никогда оныя считатьъ сверхъестественными.

Г Л А В А XXXV.

О параличѣ.

Параличъ ничто иное есть, какъ лишеніе естественныхъ силъ или крайнее разслабленіе одной либо многихъ частей тѣла, отъ чего онъ лишается способности въ движеніи и въ управленіи своихъ натуральныхъ дѣйствій.

Какъ внутреннія, такъ и внѣшнія части тѣла могутъ быть подвержены параличу.

Внутренніе параличи часто въ то самое время, въ которое они заражаютъ, наносятъ смерть и къ исцѣленію бываютъ гораздо труднѣйшими и опаснѣйшими, нежели наружные, хотя иногда и наружные не исцѣляющіяся никакимъ леченіемъ.

Часто всѣ наружныя части тѣла отнимаются параличемъ, но голова оспается во всемъ свободна и здорова.

Иногда одна только половина всего тѣла поражается сию болѣзнію, или одна только какая нибудь часть переставляет свое движеніе.

Все то, что уменьшаетъ, либо препятствуетъ печенію жизненныхъ соковъ, или все, что истребляетъ чувствительность, упругость какой нибудь части тѣла человека, можетъ быть причиною паралича.

Еслили параличемъ пораженная часть еще имѣетъ въ себѣ чувствительность, и свою естественную теплоту и наружной видъ подобной здоровой части, то исцѣляется гораздо легче и скорѣе.

Еслилижѣ не имѣя въ себѣ никакой чувствительности холодѣетъ и сохнетъ, то лечить такую часть очень трудно или совсѣмъ не возможно.

Хотя параличъ весьма часто бываетъ слѣдствіемъ прежде случившагося поспрѣла, однако иногда случается и безъ бывшаго поспрѣла.

Люди до нападенія сей болѣзни, часто чрезъ нѣсколько дней бываютъ здоровы, веселы и проворны, и когда ложатся спать, не чувствуютъ въ себѣ ни малѣйшаго безпокойства, хорошо и порядочно спятъ, а какъ пробудятся отъ сна, то находятъ у себя нѣкоторыя части пораженныя параличемъ.

А иныя нѣсколько времени прежде ощущающѣ въ головѣ безпрестанную боль, круженіе и тяжесть, не рѣдко у нихъ ротъ или губы скривляются на одну или на другую сторону; въ нѣкоторыхъ частяхъ, которыя въ скоромъ времени должны будутъ опіятыся, чувствуютъ особенное нѣкоторое расслабленіе, тяжесть и неподвижность или судорожныя содроганія и проч.

Параличъ еще не застарѣлой по болѣе-шей части удобнѣе вылечивается, нежели тотъ, который по причинѣ долговременности, уже очень усилился. Но старики и люди не совсѣмъ здоровые страдающіе параличемъ къ излеченію себя гораздо большаго времени пребываютъ, нежели молодые люди, крѣпкіе и между прочимъ довольно здоровые.

Тотъ родъ паралича всегда опаснѣе передъ прочими, который бываетъ слѣдствіемъ холоднаго поснрѣла, или происходинъ отъ склизкой, клейкой, острой, водяной и разжиженной крови, нежели тотъ, который приключается отъ много-кровія и отъ огустѣлой крови.

Послѣ жестокихъ и долговременныхъ болѣзней, или послѣ сильныхъ испражнений какихъ нибудь жидкостей случающіеся параличи и происходящіе отъ повсюдной слабости излечиваются очень скоро и легко, когда тѣлесныя силы умножаются и

помощію хорошей пищи возобновляются опять потерянные соки.

Иногда примѣчено было, что нѣкоторые часпи тѣла опнимаются, по причинѣ опягощенныхъ легкихъ склизкою мокротою, въ семъ случаѣ для излеченія паралича не нужно предпринимать особенныхъ леченій, но возбудишь харкотину одними жидишельными лекарствами, какіѣ подѣ №. 8. 32. 33. 34. 72. показаны, при томъ часто случается, что отъ того не только легкое освобождается и уменьшается кашель; но мало по малу и параличъ пропадаетъ.

Крайне несправедливое и опасное тѣхъ предразсужденіе, которые желали утвердить, что всякой параличъ зависить отъ слабости, изнеможенія и расслабленія частей, и думали что каждой параличъ необходимо должно лечить возбуждающими, горячительными и крѣпительными лекарствами.

Сей горячительной способъ леченія по большей части бываетъ вреденъ, ибо не рѣдко отъ того усиливается еще больше болѣзнь и часто возбуждается острая и опасная лихорадка.

И такъ въ томъ наипаче вся важность состоятъ, чтобы во всякомъ параличѣ рачительно и со вниманіемъ разсмотрѣвъ больнаго сложеніе тѣла и припадки какъ прежде бывшіе, такъ и настоящіе и сколько можно изслѣдовать причину.

Если больной имѣетъ бѣшеніе въ жилахъ полное и крѣпкое при томъ тѣломъ здоровъ и многокровенъ, то тотъ часъ должно пустить ему кровь и давати чрезъ долгое время смягчительныя и растворяющія лекарства подъ 7. 8. 9. 11. 39 и между тѣмъ, если у него не очень свободно на низъ, можно давати иногда проносное подъ No. 3. 5. 14. 167. предписанное. Отъ долговременнаго употребленія сихъ лекарствъ весьма часно бываетъ примѣчена въ параличныхъ частяхъ великая перемѣна, то есть ощущаеися въ нихъ иногда то въ томъ то въ другомъ мѣстѣ боль съ колющемъ, потомъ слѣдующъ чувствительность и движеніе; когда такіе знаки станутъ оказываться, то надлежитъ продолжать только прежнія лекарства, и сверхъ того по утрамъ и по вечерамъ перенъ байкою параличную часть.

Такимъ образомъ сіи люди совершенно вылечиваются.

Еслилижъ употребивъ всѣ объявленныя средства не послѣдуетъ явнаго облегченія и бѣшеніе въ жилахъ неполное и испугое, то должно приступить къ возбуждающимъ и горячительнымъ лекарствомъ, и для того таковымъ больнымъ надлежитъ давати лекарства подъ No. 73. 79. 135. 142. 150. 181. 228. находящіяся, соединя съ лекарствомъ подъ No. 17. 18. 21. предписанными, коихъ примѣшивають къ тѣмъ по одной чайной чашкѣ, а больную часть
раза

раза два въ сутки шерсть лекарствомъ подѣ №. 226. или 227. означеннымъ.

Когда послѣ шаковыхъ лекарствъ больной чувствуетъ въ груди жаръ и бѣнїе жилъ показываетъ великое волнованїе крови, то вмѣсто питья подѣ №. 17. 18. 21. показаннаго, должно употреблять предписанное подѣ №. 3. 40. 45. 88. и еслили нѣтъ въ вся на низъ, то потребно больному дать одно какое нибудь проносное изъ упомянутыхъ, и сей способъ продолжать до тѣхъ поръ, пока больной совсѣмъ выздоровѣетъ.

Когда больные не многокровнаго, но холоднаго сложенїя и имѣющъ у себя тѣло пухлое и наполненное клейкими и густыми мокротами, то во первыхъ надлежитъ нѣсколько времени употреблять лекарства подѣ №. 144. 179. 200. означенныя, также къ скорѣйшему и щасливѣйшему излеченїю болѣзни можно больному шерсть все тѣло суконками накуранными камфорою.

Иногда сїи одни средства довольно къ прогнанїю болѣзни, еслили жъ сего не случится, то надлежитъ испытывать прежде упомянутыя горячительныя лекарства и по тому подобныя.

Часто болѣзни удобнѣе вылечивается, когда положишь на больные часни нарывной пластырь или шерсть параличныя мѣста лекарствами подѣ №. 226. 227. предписанными.

Инымъ

Инымъ великую пользу доставляютъ сѣрные воды, которыя обыкновенно называютъ теплицами (thermae) а инымъ приносятъ желаемое облегченіе электрическая сила,

ГЛАВА XXXVI.

О падучей болѣзни.

Люди страдающіе падучею болѣзнію, лишившись своихъ чувствъ какъ вѣшнихъ, такъ и внутреннихъ, упадаютъ вдругъ на землю, большіе ручные пальцы корчатъ къ ладони, выпускающъ изъ рта пѣну и мучатся жестокими корчами или сильными судорогами съ безпрестаннымъ движеніемъ или дерганіемъ всего тѣла.

Сія болѣзнь безъ сомнѣнія есть ужаснѣйшая и сильнѣйшая изъ всѣхъ прочихъ, понеже по большей части съ великою трудностію излечивается, а часто и вовсе никакое леченіе не пособляетъ. Она всегда почти нападаетъ нечаяннымъ образомъ, и сіи временныя нападенія иногда мучатъ человѣка нѣсколько часовъ, а иногда въ нѣсколько минутъ оканчивающіяся.

Когда больные по окончаніи того нападенія имѣютъ у себя умъ въ надлежащемъ порядкѣ и не чувствуютъ въ головѣ никакой тяжести, то можно ожидать болѣе выздоровленія, нежели когда они, хо-

шла прошелъ шотъ припадокъ, пребывающъ еще чрезъ долгое время въ безпамятствѣ и слабы умомъ.

Младенцы по большей части скорѣе и удобнѣе оправляются отъ сей болѣзни, нежели взрослые. Однако за худой знакъ почищается, когда она въ нихъ продолжается и по прошествіи отроческихъ лѣтъ.

Инымъ въ году однажды только или дважды приключается сія болѣзнь, и то по большей части весною и осенью; а иные спржудушъ такою болѣзнію каждой мѣсяцъ около полномѣсячія; иные каждую лѣтъ, а иные черезъ одни или двое сутокъ, либо и каждой день.

Однако иногда сія болѣзнь вовсе не порядочно нападаетъ, и когда она чрезъ долгое время не приходитъ, то вдругъ нечаяннымъ образомъ напавши на больного, мучитъ его очень сильно и долгое время. Иногда поражаетъ больного нѣсколько дней сряду, или въ одинъ день приходитъ къ нему нѣсколько разъ, которая послѣдокъ чрезъ долгое время не возвращается.

Иногда больные передъ наступленіемъ сей болѣзни чувствуютъ въ себѣ нѣкоторыя безпокойства, по которымъ они всегда узнаютъ ея приходъ.

Но часто ничего въ себѣ особливаго не примѣчаютъ и кажутся быть веселы и довольно здоровы; но вдругъ начинаютъ вер-

вершѣтъ глазами или блѣднѣтъ лицемъ, и въ присутствіи многихъ людей нечаянно упавшѣ на землю, таковымъ незапнымъ дѣиспвіемъ не рѣдко присуспвующе бывающѣ приведены въ великой ужасѣ.

Многіе примѣры доказывающѣ, что люди споящіе около сихъ пораженныхъ, будучи прежде ~~сего~~ совершенно здоровы, онѣ нечаяннаго такого ужаса имѣ приключившагося, снали спрадать сеюжѣ самою болѣзнію и онѣ нее съ великою трудностію вылечивались. И по тому надлежишѣ таковымъ больнымъ, особливо, шѣмъ, на конторыхъ безъ всякихъ знаковъ нападаешѣ сія болѣзнь, сколько можно запрешшѣ имѣни обращеніе съ прочими людьми.

Дѣти произшедшіе онѣ родителей спраждающихъ падучею болѣзнію, часпо бывающѣ одержимы тою же самою болѣзнію. Падучая болѣзнь *родимую* (congenita) называется тогда, когда мать, во время своей беременности увидѣвъ нечаянно пораженнаго падучею болѣзнію, вдругѣ сильно была испугана; въ такомъ случаѣ она болѣзнь почи на всегда остаешѣ неизлечимою. Однако внутреннее расположеніе къ сей болѣзни можешѣ чрезѣ нѣсколько лѣшѣ скрыватьсѣ въ такихъ дѣтяхъ безъ всякаго вреда и дѣиспвія, а иногда кроешѣ въ ихъ шѣлѣ и не оказываешѣ во всю жизнь до шѣхъ порѣ, пска явитсѣ возбуждающѣ причина, копорѣ произведешѣ въ

въ дѣйство внутреннее сіе расположеніе и подаетъ удобнѣйшій случай явно открыться болѣзни.

Таковыми возбуждающими причинами быть могутъ: нечаянной страхъ, жестокой гнѣвъ, душевныя возмущенія, безпокойство, чрезмѣрная забота о какомъ дѣлѣ, долговременное и частое безсоніе, запальчивость, усшалость, частое упражненіе въ непозволипелной любовной забавѣ, непорядочное житіе, горячипелныя напипки и пища, пьянство и прочія симъ подобныя неумѣренности.

Но такіе одни причины не могутъ произвеси сей болѣзни, если не будетъ прежде къ ней внутренняго расположенія тѣла.

Не рѣдко сію болѣзнь причиняютъ необыкновенныя внутри головнаго черепа нарослыя горбы, разширенныя или окрѣплыя мозговые сосуды, поврежденіе самаго мозга, истекшія жидкости въ какую нибудь пущину мозговую, перешедшая сюда изъ другой части тѣла оспрая матерія, раны подѣлавшіяся въ мозгу и самыя черви не рѣдко въ немъ гнѣздящіяся; часто случается находить въ мозгу окаменѣлости, зашвердѣнія, окоспенѣлости, которыя всегда могутъ произвести сію болѣзнь.

Если болѣзнь происходитъ отъ такихъ причинъ, то никогда почти не излечивается.

А часто сей болѣзни причиною бывають многокровіе, огустѣніе крови, излішество клейкой, густой или оспрой желчи, клейкіе или оспрые соки, чрезмѣрные истеченія жидкостей изъ челоуѣка, великая во всемъ тѣлѣ слабость.

Иногда сей болѣзни бывають такія причины, которыя по видимому кажутся, что весьма далеко отстоятъ отъ головы, и мозга, но производятъ въ опдаленныхъ сихъ частяхъ необыкновенное движеніе, распрогивають ближайшія чувствєнныя жилы, которое распрогиваніе доходящъ къ мозгу и попярясаєтъ весь составъ чувствєнныхъ жилъ, производя въ ономъ безпорядки и необыкновенное движеніе, отъ чего слѣдуетъ лишеніе всѣхъ чувствъ, во многихъ частяхъ тѣла, особливо въ тѣхъ, которыя имѣють вольное движеніе, сильные судороги и корчи.

При томъ сіе случается отъ поврежденія какой нибудь внутренности лежащей въ животѣ, что часто можно видѣть у людей черножелчныхъ спраждающихъ и похондрією и малочною немочью: также приключается отъ оспроты въ желудкѣ и кишкахъ находящейся, или отъ глистовъ гнѣздящихся въ кишкахъ, отъ оспановленія шекучаго по чую или мѣсячныхъ кровоочищеній.

Кромѣ объявленныхъ причинъ падуца болѣзнь еще раждается, когда застарѣлыя раны, шолуди на головѣ, золошуха, че-

сѣшка

состка и другія закожныя болѣзни худымъ леченіемъ будупъ пользованы, или когда остропа французкой нечиспи, либо подагра коснется внушреннихъ чувствительныхъ частей, или когда вдругъ остано-вится обыкновенной потъ на ногахъ и подъ мышками; не меньше можетъ при-ключиться и отъ преждевременнаго удержа-нія истеченія бѣлой грыжи (gonorrhoea) и печенія бѣли (fluor albus).

Многіе люди находятся, копорые не могутъ сносить нѣкелпрыхъ запаховъ, происходящихъ либо отъ растѣній либо отъ живопныхъ. Ибо какъ скоро какое нибудь изъ сихъ вещей обоняніемъ почув-ствуютъ, то потъ часъ приходящъ въ обморокъ и получающъ иногда видъ паду-чей болѣзни.

Отъ сихъ и подобныхъ причинъ приключившаяся падучая болѣзнь часто совершенно излечивается.

Смотря по различію причины надле-житъ избирать различной способъ лече-нія, и узнавъ хорошо настоящую болѣзни причину, можно иногда предскаать, есть ли какая надежда лечить больного, или нѣтъ.

И такъ все леченіе въ томъ наипаче состоитъ, чтобы порядочно и со всевоз-можнымъ раченіемъ извискать причину бо-лѣзни, которая часто такъ бываетъ со-крыта, что самый искуснѣйшій и разумнѣй-

тій въ своемъ знаніи врачъ не въ силахъ прямо оную узнать.

И по тому у подверженныхъ падучей болѣзни должно со вниманіемъ разсмотрѣть, 1: то самое ихъ состояніе, когда они свободны отъ пораженія такой болѣзни и кажутся быть здоровы, 2: состояніе, въ которомъ они находясь, когда нападаетъ на нихъ болѣзнь; 3: то самое ихъ состояніе, когда болѣзнь совершенно ихъ мучитъ.

Сѣи надлежащимъ порядкомъ производимыя и безпреспанно чинимыя наблюденія могутъ показати щасливой способъ леченія, хотя бы не можно было совершенно узнать ближайшей причины сей болѣзни.

Страждущій падучею болѣзнію, пока свободенъ отъ ея нападенія, долженъ всемѣрно стараться убѣгать и воздерживаться отъ всего того, что только можетъ опять оную возбудить или ускорить.

Если примѣчается въ больномъ многокровіе или огустѣніе крови, то надлежитъ ему пустить кровь, и смотря по его силамъ и по изобилію крови, пустить ее въ другой разъ и въ третій, если окажутся около прохода почечуinyя шишки, или изъ знаковъ примѣчено будетъ, что природа силится чрезъ сѣмѣсто освободиться отъ излишности крови,

крови, то надлежитъ къ онымъ иишкамъ припустить пїявицы, и сверхъ того да-
вать больному лекарства жидишельныя,
холодишельныя и легкія проносныя, какія
подъ №. 12. 39. 45. 122. 136. 141. 187. 198.
предписаны, пока нападеніе болѣзни опять
возвратится, или по крайней мѣрѣ до шѣхъ
порѣ, пока больной будетъ приведенъ въ
такое состояніе, что болѣзнь въ рассу-
жденіи многокровія не будетъ болѣе въ
силахъ возвратиться.

Однако еслили падучая болѣзнь опять
нападетъ на больного, но съ меньшею же-
сипокостию и не будетъ столь продолжи-
тельна, то по опущеніи оной, должно
употреблять тѣ же самыя лекарства, да-
бы во время нужды опять можно было
пустить ему кровь и припустить пїяви-
цы. Но должно смотрѣть, чпобы тако-
вымъ леченіемъ не привесити больного въ
слабость, отъ которой болѣзнь можетъ
еще болѣе усиливаться.

Слѣдовательно падучая болѣзнь про-
изшедшая только отъ многокровія и го-
рячаго сгущенія крови, такимъ способомъ
часто совершенно вылечивается.

Также посредствомъ оныхъ лекарствъ
во вся прогоняется падучая болѣзнь, ко-
торая происходитъ отъ огущѣлой острой
желчи, но только въ семъ случаѣ рѣдко
бываетъ нужно кровопусканіе,

Не меньше объявленныя лекарсва и для тѣхъ полезны, у которыхъ животъ очень швердъ и шугъ, и у коихъ въ кишкахъ много находится густой, клейкой склизы и завалы (*obstruções*), хотя въ такомъ случаѣ лекарсва подѣ No. 132. 142. 144. 173. 179. часно также употребляются съ желаемымъ успѣхомъ.

Естьли больной подверженъ ипохондріи или маточной немочи, при томъ въ печени или въ селезенкѣ имѣющъ зашвердѣніе, то весьма полезны пилюли подѣ No. 73. 134. 135. предписанныя, которыя надлежитъ употреблять чрезъ долгое время.

Естьлижъ не окажется никакого зашвердѣнія, но вся болѣзнь зависитъ отъ сильной чувствительности и другихъ непорядочныхъ движеній чувственныхъ жилъ, то должно давать лекарсва, какія подѣ No. 218. 219. 220. 221. предписаны; естьлижъ отъ сихъ лекарствъ не будетъ довольно на низѣ, то надобно чаще спавитъ промывательныя, или давать легкое проносное. Симъ больнымъ великую пользу доставляютъ умѣренное тѣло движеніе, разныя и пріятныя путешествія и перемѣненіе воздуха.

А когда примѣчена будетъ въ больномъ слабость или изнеможеніе твердыхъ тѣла частей, особливо чувственныхъ жилъ, то для укрѣпленія оныхъ надлежитъ да-
вашь

вать ему лекарства подѣ №. 70. 74. 75. 253. предписанныя.

Естьлижѣ сїя слабость происходитъ отъ прежде случившихся сильныхъ тѣлесныхъ изпраженїи, какъ то отъ кровотеченїи, отъ поносу, отъ безпреспаннаго пошу, то должно во первыхъ наполнить больного тѣло легкими пищапельными кушаньями, способными къ варенїю желудка, дабы такимъ образомъ опять возобновить то, что потеряно чрезъ сильныя испеченїя изъ тѣла жидкостей; но только такую пищу надлежитъ употреблять по не многу въ день и чаще. Въ семъ случаѣ употреблять молоко вмѣсто обыкновеннаго пища весьма полезно, особливо пить молоко въ то самое время, какъ скоро оно будетъ выдоено, и для того таковымъ больнымъ нужно держать для себя кормилицу, которая часто служитъ самымъ лучшимъ и приличнѣйшимъ лекарствомъ; между тѣмъ ничто для нихъ не можетъ быть столь спасительно, какъ жить на сельскомъ воздухѣ, увеселяться прїятными и невинными предметами, имѣть тѣлесныя упражненїя, какїя имъ отъ врача будутъ предписаны. Многіе отъ сего пакъ оправляются въ своемъ здоровьѣ, что не бываетъ болѣе нужды ни въ какихъ иныхъ лекарствахъ.

Когдажъ примѣчено будетъ, что тѣло уже оная исполнено довольнымъ коли-

чествомъ хорошихъ соковъ, однако больной еще слабъ, то должно давать ему лекарства укрѣпляющія подъ №. 70. 74. 75. означенныя; но даваемые сѣи лекарства, прежде нежели тѣло получитъ хорошіе соки, всегда бывають ему во вредъ.

Весьма упорною и опаснѣйшею почитается та слабость, которая происходитъ отъ частаго упражненія въ запрещенной любовной забавѣ, особливо отъ гнуснаго рукоблудія (опанія.)

Однако и сѣи больные могутъ возвратитъ потерянные свои силы тѣмъ же самымъ способомъ, еслии только они укропятъ свирѣпствующія свои прихоти, оставяиъ непозволенное свое обыкновение, и вмѣсто праздносіи станутъ искать забавы и веселоси въ честныхъ упражненіяхъ.

Еслижъ больной не только всѣмъ тѣломъ слабъ и безсиленъ; но еще имѣетъ въ своемъ тѣлѣ острые и худаго свойства соки, то нужно первѣе исправить такіе соки, потомъ приступитъ къ укрѣпляющимъ лекарствамъ.

А что потребно дѣлать въ тѣхъ случаяхъ, когда падучая болѣзнь имѣетъ свое начало отъ непорядочнаго излеченія чесотки, или иныхъ кожныхъ болѣзней, снаружи тѣла внутри вогнанныхъ и отъ преждевременнаго залеченія ранъ, отъ
удер-

удержаннаго пошу, отъ оспановленія пекучаго почечуя или мѣсячныхъ кровей, отъ глицшовъ, отъ вогнанной внутрь оспрошты французской немочи, отъ оспрошты цынготной, подагрической и проч. то должно о семъ смотрѣть въ особенныхъ главахъ, въ которыхъ порознь о сихъ болѣзняхъ довольно сказано.

Тѣ, которые по своему природному разположенію отъ запаху нѣкоторыхъ растѣній и животныхъ получаютъ сильныя судороги, лишаются чувствъ, должны всемѣрно оберегаться отъ сихъ вещей; и по тому весьма неблагоразумно тѣмъ поступаютъ, которые таковымъ людямъ дають нарочно нюхашъ оныя пахучія вещи, ибо отъ того можетъ родиться истинная и неизлечимая паучая болѣзнь.

Сие особенное разположеніе тѣла можно часто отвратить и предохранить, помощію долговременнаго употребленія крѣпительныхъ лекарствъ подъ No. 73. 74. 75. 253. предписанныхъ. Однако часто и сама собою природа перемѣняется, такъ что мало по малу привыкаетъ къ тѣмъ вещамъ, которыхъ она прежде не могла ни коимъ образомъ терпѣть.

Во всѣхъ доселѣ объявленныхъ случаяхъ можно предохранить себя отъ сего зла и часто съ желаемымъ успѣхомъ оно отвратить, когда причина болѣзни уже извѣстна, или припадки показываютъ, какъ надлежитъ поступать.

Часто подверженные падучей болѣзни въ свободное отъ нея время находясь совершенно здоровы, и ни какихъ не оказываются знаковъ, которые бы заставляли искать средствъ для леченія болѣзни: тогда надлежитъ смотрѣть въ какомъ положеніи больные находятся во время наступающей болѣзни.

Еслили тогда больной чувствуетъ поску и безпокойство въ животѣ, особливо въ вѣтрахъ, не имѣетъ охоты къ ѣдѣ, ощущаетъ понужденіе на рвоу, и находясь нѣкоторые знаки показывающіе опятощеніе желудка или кишекъ, то попребно такую вредную матерію выгнать изъ шѣла рвонымъ или проноснымъ; можно употреблять такое лекарство каждые два или три дни сряду въ разсужденіи обстоятельствъ.

Еслилижъ за нѣсколько дней передъ нападеніемъ болѣзни больной жалуется на боль, круженіе и жаръ въ головѣ, глаза у него краснѣютъ, бленіе въ жилахъ ощущается полное и тугое, тогда надлежитъ ему или кровь пускить либо припустить къ вискамъ пиявицы, или помощію прежнихъ лекарствъ подъ No. 39. 45. 121. 136. 141. 187. показанныхъ, разжидить кровь и унимать ея стремительное теченіе въ голову; между тѣмъ весьма полезно совѣтовать ему спавишь ноги въ теплую воду,

Одна-

Однако естли не открывається никакихъ знаковъ скопившейся въ мозгу крови, но примѣчается болѣе другая острота или мокрота причиняющая сіе зло, больной блѣднѣетъ, лице у него нѣскольکو вспухло, ощущаетъ у себя въ головѣ тяжеснь и слабость ума, имѣетъ безпрестанную наклонность ко сну и проч. то должно положить къ затылку нарывной пластырь, дать ему крѣпкое проносное подѣ №. 4. 42. 43. 47. показанное, привязать къ ножнымъ икрамъ квашенное тѣсто съ иолченою горчицею и савѣщивать ему спавить ноги по колѣна въ теплую воду на одинъ или на два часа, по-впоря сіе раза два въ сутки.

По опущеніи болѣзни въ свободное оипъ нее время, естли силы не препящивуютъ, должно дать больному проносное; въ семъ случаѣ весьма полезно сдѣлать въ пристойномъ мѣстѣ искусственную ранку или и самую заволоку (setaceum) но должно допустить, чпобы изъ такихъ искусвомъ произведенныхъ ранокъ маперія исшекала нѣсколько лѣтъ.

Естлижъ больной до наступленія болѣзни чувствуетъ либо въ той либо въ другой части тѣла особливую боль, и сверхъ сего примѣчаетъ, что изъ оной части какъ бы что нибудь поднимается и восходитъ до головы, то сію часнь какъ скоро она спанетъ болѣе, надле-

житѣ перевязать и спянуть крѣпко повязкою, чѣмъ самимъ отвращается наступленіе сей болѣзни; но такое пособіе можно только удачно сдѣлать на рукѣ или на ногѣ; еслилижѣ часть подверженная шаковому дѣйствію будетъ та, которой не возможно спянуть или перевязать повязкою, то тогда часъ, какъ скоро въ такой части окажется боль или иное особенное чувствованіе, надлежитъ къ оной приставить сухія бани или положить нарывной пластырь; также можно въ необходимости испытать, смотря по положенію мѣста, еще нѣкоторое послѣднее средство, то есть, чтобы такую больную часть отрѣзать или прижечь горячимъ желѣзомъ.

Но часто случается, что ни въ свободное время отъ болѣзни, ни передъ наступленіемъ ея не оказываются никакіе знаки, по которымъ смотря, можно бы избирать способъ леченія или способъ предохраненія; въ такихъ случаяхъ можно употреблять лекарства подъ №. 142. 218. 219. 220. 221. 223. 228. 295. 309. 310. 311. 312. 313. предписанныя.

Но сіи лекарства должно употреблять чрезъ долгое время и до тѣхъ поръ, пока подлинно усмотрѣно будетъ, хорошо ли оныя дѣйствуютъ въ больномъ, или нѣтъ.

Во время каждаго пораженія сей болѣзни надлежитъ необходимо смотрѣть, чшобы больной сильными коверканіями не причинилъ себѣ раны, чшобы не ушибъ головы, или иныхъ членовъ объ твердое какое шѣло; и по шому, естли можно, то надобно, во время пораженія болѣзни, положить больного на постелю, прилѣжно примѣчать всѣ его шѣлодвиженія, расправлять его шѣло и члены такъ тихо и осторожно, что бы оныхъ какимъ нибудь образомъ не повредить; насильное же выправливаніе больныхъ ручныхъ пальцевъ болѣе бываетъ вредно нежели полезно.

Часто верхнія и нижнія зубы такъ крѣпко между собою сцепишюутъ, что на подобіе стекла вдребески ломаются, или больные прикусываютъ себѣ языкъ, и пошому должно стараться разнимать имъ слегка зубы, и положить какую нибудь вещь между оными; въ семъ случаѣ твердыя вещи не годятся, но для сего весьма пригодно пробочное дерево, или шуго свернушная чистая трепица, только надлежитъ смотрѣть, чшобъ такія вещи своею величиною не препятствовали дыханію, или когда будутъ очень малыя, то или не много пособляютъ или больными во вся проглатываются, и для того такія вещи или осторожно держать рукою или привязать къ нимъ долгую крѣпкую нитку.

Между

Между тѣмъ весьма полезно для таковыхъ больныхъ, естли безпрестанно держать ихъ на открытомъ и числомъ воздухѣ, чаще имъ мыть лице студеною водою, тереть ноздри, лобъ и виски уксусомъ подѣ No. 222. означеннымъ. Естлижѣ они слабы, то давать нюхашъ спиртъ перегнашой изъ оленьяго рога или какой нибудь иной крѣпкой лепучей, которымъ также можно мазать лобъ, виски и прочія части, и давать имъ внутрь по нѣскольку капель въ ложкѣ воды; однако сихъ больныхъ не должно приводить въ сильной жаръ очень лепучими крѣпкими вещами. Людямъ подверженнымъ илохондрическимъ и машочнымъ припадкамъ запахъ бобровой смруи или запахъ дурнаго духу часно приносить весьма скорое вспоможеніе.

Нерѣдко такіе больные, послѣ какъ пройдеиъ у нихъ нѣсколько сія болѣзнь, приходятъ опять въ память, разговариваютъ и на вопросы хорошо и ясно отвѣчаютъ, однако еще продолжается у нихъ трясеніе чувственныхъ жилъ; въ семъ случаѣ надлежитъ давать лекарства подѣ No. 37. 107. 219. означенныя.

По опущеніи болѣзни таковыя больные по большей части чувствуютъ въ головѣ и въ тѣлѣ слабость, и по шому должно имъ давать крѣпительныя подѣ No. 117. и 160. показанныя, которыя ест-

ли мало дѣйствующъ, полезно давать тѣ, какія подѣ №. 18. 22. 23. 70. предписаны.

У людей печальныхъ, задумчивыхъ, страждущихъ маточною немочью, часто вся болѣзнь происходитъ отъ глубокихъ только размышленій, шрусости, малодушія или сипранныхъ воображеній, а иногда по суевѣрнымъ и лживымъ своимъ понятіямъ доходящъ до шакого безумія, что не спыдаясь утвердительно говорить, что въ нихъ вселился злой нечистой духъ, которой ихъ мучитъ, или обворожены они какими то чародѣіями.

Въ семъ случаѣ лекарства очень мало дѣйствуютъ, однако въ подобныхъ обснотельствахъ иногда великую пользу дѣлающъ лекарства подѣ №. 218. 219. 223. предписанныя.

Естьлижъ къ великому благополучію больного можно исправить его неправильныя помышленія дѣйснвительными убѣжденіями, обѣщаніями, ласковыми увѣреніями, хипросными и забавными вымыслами, переселеніями съ одного мѣста на другое, перемененіемъ воздуха и проч. и разогнавъ его глупомысліе какими нибудь новыми и увеселительными предметами, то шакой больной не употребляя никакихъ лекарствъ можетъ излечиться и самъ собою совершенно выздороветь; однако не должно сего приписывать никакой не-

необыкновенной или чрезвѣщественной причинѣ.

Но часто находясь такіе хитрые и злые люди, которые дабы предстоящихъ привесити въ соболѣзнованіе и симъ самимъ испроситъ бы у нихъ для себя милостыни, или достигнуть другаго какого своего намѣренія, умѣютъ хитрымъ образомъ припворяться и коверкать свое тѣло на подобіе пораженныхъ падучею болѣзнію.

Естьли таковыхъ обманщиковъ начать разсмапривать во время пораженія припворной ихъ болѣзни, то можно удобно примѣнитъ, что они совсѣмъ въ совершенномъ разумѣ, ибо такъ хитро и осторожно мечутъ во всѣ стороны свое тѣло, что въ самомъ сильнѣйшемъ своемъ бѣшенствѣ не ушибаютъ больно ни головы ни другихъ членовъ, или не причиняютъ себѣ никакихъ ранъ ударяясь объ твердыя пѣла; чѣмъ болѣе стоящій около ихъ соболѣзнуетъ, тѣмъ они болѣе слятся показать свое бѣшенство, при началѣ умышленной сей болѣзни жилы бьются природнымъ порядкомъ, и естьли приспавитъ къ ихъ глазамъ горящую свѣчу, то зарочекъ сжимается и снѣсняется, который у пораженныхъ истинною падучею болѣзнію, отъ всѣхъ сему подобныхъ испытаній пребываетъ неперемѣнчивъ и неподвиженъ; сверхъ сего сіи припворные больные, естьли начать имъ какую нибудь


часъ

часъ шѣла хотя слегка жечь или колоть чѣмъ острѣмъ и царапать, то они привскакиваютъ и вздрагиваютъ, чѣмъ самѣмъ показывающъ явные своего притворства знаки, по которымъ можно легко догадаться, что они чувствуютъ боль.

Еслили подлинно примѣчено будетъ, что падучая болѣзнь есть ложная и притворная, то къ леченію ея не сыскивается способнѣйшаго средства, какъ долговременной постъ, публичное и строгое наказаніе, дабы на такое леченіе смѣля другіе не отваживались нарочно принимая на себя видъ больного.

Такимъ же образомъ должно поступать и съ шѣми, которые утверждаютъ, что ихъ или нечистой духъ мучитъ, или они околдованы какими нибудь чародѣйками либо ворожеями.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.



ОЗНАЧЕНІЕ ГЛАВЪ СОДЕРЖАЩІХСЯ

Въ Первой Части.


	Предувѣдомленіе.	Стран.
ГЛАВА 1.	О лихорадкѣ.	21.
— 2.	Острыхъ горячкахъ (<i>febris acuta continua</i>)	30
— 3.	Гнилой лихорадкѣ (<i>synochus putrida</i>)	65
— 4.	Воспаленіи (<i>inflammatio</i>)	73
— 5.	Горячкѣ по припадкѣ воспаленія мозга или его оболочекъ (<i>phlegmas</i>)	81
— 6.	Воспаленіи глазъ (<i>ophthalmia</i>)	87
— 7.	Воспаленія въ ушахъ (<i>otitis</i>)	93
— 8.	Жабы или воспаленія гортани (<i>angina</i>)	94
— 9.	Грудныхъ болѣзней	110
— 10.	Колоты въ бокухъ или въ груди.	112
— 11.	Воспаленіи легкаго (<i>pneumonitis</i>)	126
— 12.	Кровоотеченій въ гортани (<i>hemoptoe</i>)	142
— 13.	Одышкѣ (<i>asthma</i>)	153
— 14.	Воспаленіи въ груди.	162
— 15.	Необаченіемъ въ сердцѣ (<i>calentura cordis</i>)	167
— 16.	Кашель или простуда и насморкъ (<i>tussis seu catarrhus</i>)	173
— 17.	Удушливостъ кашля или коклюша (<i>tussis convulsiva</i>)	176
— 18.	Воспаленіи пресердечія грудобрюшной (<i>paraphrenitis</i>)	183
— 19.	Воспаленіи печени (<i>hepatitis</i>)	185
— 20.	Щемотъ или сосаніи сердца (<i>cardi-algia</i>)	194
— 21.	Отъращеніи отъ пищи или тошнотъ и рвотъ (<i>nausea et vomitus</i>)	201
— 22.	Рвотъ кровью.	202
	Ж	23.


Глава 23.	О Боли въ кишкахъ или коликѣ.	-	207
— 24.	Простомъ поносѣ.	- - -	220
— 25.	Поносѣ съ кровью.	- - -	228
— 26.	Воспаленіи почекъ (<i>nephritis</i>)	-	242
— 27.	Простудной лихорадкѣ (<i>febris catarrhalis</i>) о ломѣ въ суставахъ (<i>arthritus</i>) и о гризѣ или ломотѣ въ мясныхъ частяхъ. (<i>rheumatismus</i>)	- - - -	246
— 28.	Восп.	- - -	261
— 29.	Прогнѣсѣннѣи восп.	- - -	298
— 30.	Кори (<i>morbilli</i>)	- - -	315
— 31.	Красногортной лихорадкѣ или лопухѣ (<i>scarlatina</i>) и кропильницѣ (<i>urticata</i>)	- - - -	326
— 32.	Рожѣ (<i>erysipelas</i>)	- - -	327
— 33.	Пострѣлъ (<i>proplexia</i>)	- - -	343
— 34.	Параличѣ.	- - -	359
— 35.	Падушей болѣзни (<i>epilepsia</i>)	-	365

ПОГРѢШНОСТИ.

Спран.	Стр.	Напечатано.	Читай.
2.	14.	состояніи	состоянія
33.	19.	сморя	и сморя
36.	33.	чрезъ	черезъ
39.	6.	быстры	ярки
39.	14.	преспааетъ	перестааетъ
40.	16.	чудкія	чушкія
40.	26.	силы,	силы?
41.	29.	остановлены	оставлены
42.	18.	бы была	будетъ
44.	17.	размятъ	размягчить
45.	14.	въ довольномъ количествѣ	довольное количество
46.	20.	обыкновенно во- нющее	обыкновеннаго воню- чѣе
52.	24.	позже	позже
55.	32.	№. 15	№. 13
57.	1.	вдзухи	вдухи
63.	10.	слизко	слизко
68.	2.	изо	изъ
68.	24.	№. 25	№. 23
80.	18.	корка служитъ,	корка, какъ подъ №. 31. означено, служитъ
89.	8.	№. 1	№. 4
93.	10.	съ наружи	снаружи
98.	31.	чрезъ	черезъ
104.	20.	плѣвую	плѣвою
106.	20.	и	или
107.	2.	ранъ	раку
109.	31.	№. 75	№. 73
115.	11.	въ ипереход- ныя сей	и переходныя въ сей

153.	20.	чехоткою	чахоткою
156.	30.	№. 208	№. 108
179.	24.	спануть гла- тать	спануть ее глотать
205.	18.	препетаніе.	препетаніе сердца.
210.	3.	№. 149	№. 139
224.	11.	давленіе или	давленіе въ желудкѣ
226.	27.	слабительное	слабительное подѣ №. 193
226.	29.	№. 193	№. 83.
231.	27.	№. 190	№. 140
261.	13.	неизлечимую	неизлечимую.
275.	16.	febris	febris
276.	8.	оно	оное
176.	32.	кажется и не	кажется не
290.	17.	сдѣлать	сдѣлались.
298.	28.	всозрѣлую	созрѣлую.
299.	13.	боротившѣ	оборотивши
324.	32.	гнилой	злой
328.	11.	сперть	смерть
331.	9.	гнилыхъ	злыхъ.
340.	29.	fontanella	fontanella
341.	33.	холодильныя ле- карства	холодильныя. ле- карства
342.	2.	время ;	время приносятъ же- лаемую пользу ;
344.	25.	скоропостижную	скоропостижная
347.	11.	ониу же	они уже
371.	10.	fluor	fluor





Имв. 17611

С: К: М:

Монаху Иосифу 2.

Схи-тронъ Свѣдѣніи

Схи Монаху Израилю,

Схи-тронъ

